# VALIPHENAL + MANCOZEB

**Marcas comerciales**: VALIS M.

**Nomenclatura Química:**
valiphenal: metil-3-(4-clorofenil)-3-((N-(isopropilcarbonil)-L-valil)amino)propanoato
mancozeb: etilen bis ditiocarbamato de manganeso coordinado con iones de zinc.
**Clasificación Química:** acilalanina + ditiocarbamato.
**Acción:** de contacto y sistémica.

**Uso:** fungicida.

| Cultivo | Enfermedad | Dosis | TC | Momento de Aplicación |
|---|---|---|---|---|
| Cebolla | Downy mildew (*Peronospora destructor)* | 2,5 kg/ha | 7 | Intervalo de aplicaciones de 7 a 10 días, con un máximo de 4 aplicaciones/estación. Comenzar las aplicaciones cuando las condiciones sean muy favorables para el desarrollo de la enfermedad. |
| Vid | Downy mildew (*Plasmopara viticola)* | | 21 | Los tratamientos deben iniciarse cuando las condiciones sean predisponentes. En variedades sensibles se aconseja aplicar preventivamente en pre y post-floración hasta el cierre de racimos. No se deben realizar más de 4 aplicaciones sobre el mismo viñedo por campaña. Intervalo de aplicaciones de 7 a 10 días. |
| Papa | Tizón tardío de la papa (*Phytophthora infestans)* | 2,5 - 3,0 kg/ha | 14 | Para proteger el cultivo se recomiendan pulverizaciones preventivas cada 10 días. Iniciar los tratamientos cuando las condiciones ambientales sean favorables al desarrollo de Phytophtora. En condiciones muy favorables reducir el intervalo a 7 días. |
| Tomate | | 2,5 kg/ha | 7 | Intervalo de aplicaciones de 7 a 10 días, con un máximo de 4 aplicaciones/estación. Comenzar las aplicaciones cuando las condiciones sean muy favorables para el desarrollo de la enfermedad. |

**Información General:**

Es un fungicida sistémico y de contacto con acción preventiva y curativa. Actúa sobre el metabolismo de la pared celular de los hongos, interfiriendo en su síntesis. Inhibe la morfogénesis de las estructuras de infección germinales de las esporas y bloquea el crecimiento del micelio en el interior de la planta del huésped. Se moviliza en la planta de forma acropétala y tiene actividad translaminar. No interfiere en el metabolismo y la fisiología de los vegetales.

Instrucciones de uso:
Preparación:
Llenar el tanque de la máquina pulverizadora hasta la mitad de su capacidad con agua limpia. Poner en funcionamiento el sistema de agitación. Agregar la cantidad recomendada de VALIS M. Agregar agua hasta completar las ¾ partes del tanque. Agregar aditivos si se desea y completar con agua manteniendo la agitación constante.
Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:
El producto debe ser aplicado tanto con equipos de alto como bajo volumen. En el caso de cultivos de papa, es conveniente que el mismo arroje un volumen mayor que 400 l/ha y que esté provisto de agitador. En vid, debe ser aplicado con pulverizadores que tengan una uniforme distribución sobre el cultivo y que arrojen un volumen de 1000 l/ha. En caso de ser necesario, pueden realizarse aplicaciones aéreas con un caudal mayor de 20 l/ha y viento no superior a 10 Km/h. La pulverización deberá garantizar una distribución uniforme del producto sobre toda la superficie foliar del cultivo alcanzando una cobertura de 50-70 gotas por cm2.

Compatibilidad:
Es compatible con la mayoría de los plaguicidas de reacción neutra. En caso de duda, se recomienda realizar un aprueba de compatibilidad física previa al tratamiento.

Restricciones de uso: entre la última aplicación y la cosecha deberá transcurrir un intervalo mínimo de 7 días en los cultivos de tomate y cebolla. En papa: 14 días y en vid: 21 días.
En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.
El presente producto debe ser comercializado y aplicado conforme a la/s normativa/s provinciales y municipales correspondientes.

**Derrames:**
En los pequeños derrames del producto, recogerlo con una pala e introducirlo en un recipiente seco y taparlo. Para grandes derrames, hacer una barrera para contenerlo y evitar su vertido en los desagües y posterior eliminación asegurándose de no contaminar el medio ambiente.

**Clasificación (modo o sitio de acción):** 40 (FRAC) + M3 (FRAC).

**Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:**

Utilizar ropa protectora adecuada.
Usar máscara con filtros combinados para partículas finas y vapores orgánicos.
Usar guantes y botas de goma.
Usar gafas o anteojos de seguridad.

**Información Toxicológica:**

Del producto formulado:

| | |
|---|---|
| Toxicidad oral aguda: | DL50: >5000 mg/Kg |
| Toxicidad dermal aguda: | DL50: >5000 mg/Kg |
| Toxicidad inhalatoria aguda (rata): | CL50: > 3,18 mg/l |
| | |
| Irritación dermal: | Leve irritante |
| Irritación ocular: | Moderado irritante |

Primeros auxilios:
En caso de ingestión, NO INDUCIR EL VOMITO ni tratar de impedirlo si se produce espontáneamente. No dar de beber leche ni otras bebidas. Solo si existen síntomas de irritación local (ardor de garganta o náuseas) y el paciente está consciente, dar de beber unos sorbos de agua fría sin gas. En caso de exposición cutánea, retirar la ropa y lavar cuidadosamente la piel, incluyendo el cuero cabelludo, con abundante agua y jabón. Guardar la ropa en una bolsa impermeable y cerrarla herméticamente. Si se produce inhalación, llevar al paciente a un lugar bien ventilado. Despejar la vía aérea y verificar si respira espontáneamente. Administrar oxígeno si la respiración es dificultosa. No realizar maniobras como la respiración boca a boca, a fin de evitar la contaminación del rescatista. Si se produce contacto con los ojos, lavar los ojos con abundante agua, manteniendo los párpados bien abiertos durante 10 a 15 minutos. En todos los casos se debe consultar a un médico, suministrando la mayor cantidad de datos sobre el producto y sobre las circunstancias de la exposición.

Advertencia para el médico: Producto que normalmente no ofrece peligro (Clase IV)

Riesgos ambientales:

| | |
|---|---|
| Toxicidad para abejas: | Virtualmente no tóxico |
| Toxicidad para aves: | Prácticamente no tóxico |
| Toxicidad para peces: | Prácticamente no tóxico |

No contaminar fuentes ni cursos de agua.

| Marca | Empresa | N° Inscrip. | Form. | Conc. | C.T. |
|---|---|---|---|---|---|
| VALIS M | FMC | 37528 | WG | 6% + 60% | IV |