Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE
ISBN: 978-987-1563-08-1

COMPUESTO NITROGENADO DE LIBERACION CONTROLADA

Marcas comerciales: COTE N 2 - COTE N 4.

Nomenclatura Química:
Urea recubierta con resinas de polímeros
Clasificación Química: compuesto inorgánico.
Acción: aporte de nitrógeno.

Uso: fertilizante.

Cultivo	Dosis	Momento de Aplicación
Cultivos a campo abierto (caña de azúcar, maní y papa)	Suelo liviano Cote N 2 y Cote N 4: 60-70 como % de nitrógeno convencional o 60-70 como % de nitrógeno recubierto. Suelo pesado Cote N 2 y Cote N 4: 70-80 como % de nitrógeno convencional o 50 - 60 como % de nitrógeno recubierto.	Cote N 2 meses y Cote N 4 meses debe ser aplicado al momento de la siembra o transplante, en bandas localizadas a 2 cm de la línea de plantas y a una profundidad de 5 a 15 cm.
Cultivos extensivos (maíz, sorgo, cebada, centeno, trigo, soja y pasturas)	Suelo liviano Cote N 2: 60 como % de nitrógeno convencional o 60 como % de nitrógeno recubierto. Suelo pesado Cote N 2: 70 como % de nitrógeno convencional o 40-50 como % de nitrógeno recubierto.	
Cultivos extensivos (maíz, sorgo, caña de azúcar y pasturas)	Suelo liviano Cote N 4: 60 como % de nitrógeno convencional o 60 como % de nitrógeno recubierto. Suelo pesado Cote N 4: 70 como % de nitrógeno convencional o 40-50 como % de nitrógeno recubierto.	

Ejemplos de dosificación:
Cote N 2:
Dosis convencional de nitrógeno (kg/ha): 200
Tipo de cultivo: Trigo
Tipo de suelo: Liviano
Dosis ajustada de nitrógeno por hectárea (kg/ha): 140
Dosis de nitrógeno recubierto (kg/ha): 84
Dosis de Cote N 2 (kg/ha): 105

Cote N 2:
Dosis convencional de nitrógeno (kg/ha): 300
Tipo de cultivo: Cebada
Tipo de suelo: Pesado
Dosis ajustada de nitrógeno por hectárea (kg/ha): 210
Dosis de nitrógeno recubierto (kg/ha): 105
Dosis de Cote N 2 (kg/ha): 150

Cote N 4:
Dosis convencional de nitrógeno (kg/ha): 192 (**)
Tipo de cultivo: Papa
Tipo de suelo: Liviano
Dosis ajustada de nitrógeno por hectárea (kg/ha): 134
Dosis de nitrógeno recubierto (kg/ha): 94
Dosis de Cote N (kg/ha): 225

Cote N 4:
Dosis convencional de nitrógeno (kg/ha): 149 (**)
Tipo de cultivo: Cebolla
Tipo de suelo: Pesado
Dosis ajustada de nitrógeno por hectárea (kg/ha): 119
Dosis de nitrógeno recubierto (kg/ha): 60
Dosis de Cote N (kg/ha): 142

(**) Para rendimientos de 60 ton/ha

Las dosis exactas, momentos y formas de aplicación, deben ser determinadas por un profesional idóneo, de acuerdo a las necesidades específicas del cultivo, condiciones de suelo y clima y la experiencia del agricultor.

Recomendaciones de aplicación
1. Debido a la mejora en la eficiencia del uso de nutriente, se requieren menores dosis de aplicación respecto de los fertilizantes convencionales, sean granulados o líquidos. Las se reducen 30% a 50% de las recomendadas.
2. Para cubrir la dosis total de nitrógeno, pueden realizarse mezclas con fertilizantes convencionales para tener una disponibilidad inmediata, si las condiciones de suelo, clima y/o cultivo lo requieren. En estos casos la proporción de nutriente sin recubrimiento (convencional) puede variar entre un 20 % y un 50 %.

Información General:

Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE
ISBN: 978-987-1563-08-1

ComposiciónCote N 2:
Nitrógeno Total (N): 43,0%
Reacción en el suelo: Ácido
Índice: - 80
Grado: 43 - 0 - 0

ComposiciónCote N 4:
Nitrógeno Total (N): 42,0%
Reacción en el suelo: Ácido
Índice: - 65
Grado: 42 - 0 - 0

Cote N 2 meses y Cote N 4 meses, son fertilizantes granulados de liberación controlada, de aplicación al suelo, en base a urea recubierta con resinas de polímeros, diseñado para liberar nitrógeno disponible a la solución del suelo lenta y continuamente a lo largo de dos y cuatro meses. Luego de su aplicación al suelo, los gránulos recubiertos comienzan a adsorber la humedad del suelo, la cual disuelve la urea dentro del gránulo. Esta urea disuelta difunde (se libera) hacia la rizósfera por diferencias de concentración de urea disuelta entre el interior del gránulo y el suelo, en una tasa que depende únicamente de la temperatura del suelo. La tasa de liberación se incrementa a medida que aumenta la temperatura del suelo, de igual forma que se incrementa la absorción de nutrientes por parte de las plantas. Otros factores, como la humedad del suelo, pH, actividad microbiana y textura de suelo, no afectan la tasa de liberación de nutrientes.

Tiempo de liberación (*) en función de la temperatura media del suelo

	8° C	15° C	21° C	27° C	32° C
Cote N 2	4 - 5 meses	3 - 4 meses	2 meses	1 mes	0,5 meses
Cote N 4	6 - 7 meses	5 meses	4 meses	3 meses	2 meses

(*) El tiempo para liberar el 80 % del total del nutriente contenido.

Almacenamiento:
No dejar los envases abiertos porque éste producto se humedece en contacto con el aire. Guardar las bolsas en lugar seco, sobre tarimas sin entrar en contacto con el suelo.
Asegurar ventilación adecuada del depósito.
No almacenar con combustibles, productos corrosivos, o materiales orgánicos.
No almacenar a temperaturas mayores de 32º C por peligro de ignición e incendio.
Se recomienda no fumar.

Derrames:
Contener el derrame de producto. Prevenir que los derrames ingresen en desagües, cursos de agua, piletas, etc.
Recoger con material adsorbente y colocar en recipientes adecuados para su reciclado, reutilización o desecho.

Clasificación (modo o sitio de acción): no aplica.

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Para evitar el contacto con la piel o los ojos, use mangas largas, mameluco, guantes de cuero y anteojos de seguridad con defensas laterales, protección respiratoria.

Información Toxicológica:

Ante cualquier accidente químico consultar con Centros de Atención de Emergencias Toxicológicas.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Grado/Conc.
COTE N 2	BROMETAN	15493	GRANULADO	43 - 0 - 0
COTE N 4	BROMETAN	16038	GRANULADO	42 - 0 -0