DICLOSULAM + SULFENTRAZONE

Marcas comerciales: SPIDER XTRA PACK.

Nomenclatura Química:
diclosulam: N-(2,6-diclorofenil)-5-etoxi--fluoro-1,2,4-triazolo [1,5 c] pirimidina-2-sulfonamida.
sulfentrazone: N-[2,4-dicloro-5-[4-difluorometil)-4,5-ihidro-metil-5- oxo-1 H-1,2,4-triazol-1-yl]fenil] metanesulfonamida
Clasificación Química: triazolpirimidina + triazolinona.
Acción: sistémica.

Uso: herbicida.

Cultivo	Maleza	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Soja	Borraja o borraja pampeana (*Lycopsis arvensis)* Bowlesia (*Bowlesia incana)* Capín (*Echinochloa crus-galli)* Cardo ruso (*Salsola kali)* Cerraja (*Sonchus oleraceus)* Chamico (*Datura ferox)* Chinchilla (*Tagetes minuta)* Cola de zorro (*Setaria spp.)* Eleusine o Pie de gallina (*Eleusine indica)* Enredadera o Porotillo (*Ipomoea spp)* Malva (*Anoda cristata)* Moco de pavo (*Polygonum persicaria)* Morenita (*Kochia scoparia)* Pasto de cuaresma (*Digitaria sanguinalis)* Peludilla (*Gamochaeta subfalcata)* Quínoa, Quínoa blanca (*Chenopodium album)* Rama negra (*Conyza o erigeron bonariensis)* Saetilla o Amor seco (*Bidens pilosa)* Sanguinaria (*Polygonum aviculare)* Verdolaga (*Portulaca oleracea)* Vinagrillo (*Oxalis cordobensis)* Yuyo colorado (*Amaranthus spp.)*	Según tipo de suelo Suelos sueltos (arenosos - franco arenosos) glifosato 2,5 l/ha + Parte sólida A: 22 g/ha + Parte líquida B: 333 cm3/ha Suelos medios (franco limosos - arcillosos) glifosato 2,5 l/ha + Parte sólida A: 25 g/ha + Parte líquida B: 379 cm3/ha Suelos pesados (arcillosos) glifosato 2,5 l/ha + Parte sólida A: 33 g/ha + Parte líquida B: 500 cm3/ha		Pre-siembra - Pre-emergencia del cultivo de soja. En caso de que al momento de la aplicación estén presentes Conyza bonariensis y/o Amaranthus spp., se recomienda el agregado de 2,4-D en mezcla de tanque y de ésteres metílicos de ácidos grasos de aceites vegetales al 0.5% v/v.

Para la aplicación del producto en suelos sueltos, utilizar de manera completa el contenido de ambos compartimentos de 1 (un) bidón en 15 (quince) hectáreas.
- Para la aplicación del producto en suelos medios, utilizar de manera completa el contenido de ambos compartimentos de 1 (un) bidón en 13 (trece) hectáreas.
- Para la aplicación del producto en suelos pesados, utilizar de manera completa el contenido de ambos compartimentos de 1 (un) bidón en 10 (diez) hectáreas.

Información General:

Es un herbicida sistémico de amplio espectro (graminicida y latifolicida), selectivo en pre-siembra y pre-emergencia para el cultivo de soja que controla rama negra (Conyza spp.), yuyo colorado (Amaranthus spp.), bejucos (Ipomoea spp.), cardo ruso (Salsola kali) entre otras, así como también gramíneas anuales.
Se recomienda para aplicaciones pre-siembra y pre-emergencia.
Para lograr controles eficientes deben producirse lluvias después de la aplicación, independientemente de la humedad del suelo.
Contiene diclosulam que se absorbe tanto en forma foliar como por raíces. Dentro de la planta es translocado por xilema y floema y actúa sobre los tejidos meristemáticos en zonas de activo crecimiento de la planta.
Diclosulam es un inhibidor de la enzima acetatolactato sintetasa (ALS), responsable de la reacción que permite la biosíntesis de aminoácidos esenciales para el desarrollo y el normal crecimiento de la planta.
También contiene sulfentrazone, que es un herbicida del grupo de las "aril triazolinonas", que se absorbe por las raíces de las plantas tratadas. Controla las malezas mediante un proceso de "disrupción" de membrana, el cual se inicia por la inhibición de la enzima protoporfirinogena oxidasa (PPO), interfiriendo de ese modo en la biosíntesis de la clorofila, y con la consiguiente

formación de intermediarios tóxicos. Las plantas que emergen del suelo tratado, se tornan necróticas y mueren al poco tiempo de exponerse a la luz.

Equipos, volumen y técnicas de aplicación:
El producto debe aplicarse con el volumen necesario para cubrir uniforme y satisfactoriamente el área a tratar.
Aplicar con pulverizadora terrestre de barra. El equipo debe contar con sistema de agitación.
Rango de volumen: 80-150 litros/ha. Presión: 30-60 lb/pulg2. Pastillas: abanico plano (8002, 8003, 11003 y 11004). En esquemas de siembra directa se recomienda la aplicación conjunta del formulado y glifosato (60,8%) cuando la cobertura no sea excesiva.
Para controlar satisfactoriamente Conyza bonariensis, o Amaranthus spp. en post-emergencia de las malezas, se recomienda el agregado en mezcla de tanque de de 2,4-D.
En el caso que se encuentren coberturas verdes que impidan ver el suelo, se recomienda efectuar primero el quemado con glifosato (60,8%) y posteriormente la aplicación del formulado.
En esquemas de labranza convencional aplicar sobre el suelo libre de malezas y preparado para la siembra. No debe haber terrones grandes que impidan una distribución uniforme del producto sobre la superficie del suelo
Número de gotas: aplicar 20 a 30 gotas/cm2.
Evitar que la deriva de la neblina de la pulverización entre en contacto con cultivos susceptibles. No aplicar con vientos superiores a 8-10 km/hora.

Compatibilidad:
No mezclar con otros productos sin realizar previamente una prueba en pequeña escala de compatibilidad física y biológica de los componentes y de fitotoxicidad para el cultivo.

Derrames:
En cualquier caso crear una barrera de contención para el derrame; evitar que el material tome contacto con desagües, cloacas, cuerpos o cursos de agua. Parte sólida A: barrer lentamente y recoger con pala, evitando generar polvo. No usar agua.
En ambos casos, el material recogido se colocará en tambores y se enviará para su incineración a sitios autorizados. No incinerar a cielo abierto.
Parte líquida B; coadyuvante y caldo de pulverización: cubrir el producto con un material adsorbente (arena o tierra), y luego recogerlo con pala. Si el derrame se produce en cercanías de plantas o árboles, después de la limpieza inicial, remover 5 cm de tierra superficial.

Clasificación (modo o sitio de acción): B (HRAC) + E (HRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Guantes de nitrilo reforzado, botas de goma, camisa de mangas largas y pantalón largo para cubrir totalmente brazos y piernas, delantal, antiparras y/o protector facial.

Información Toxicológica:

Del principio activo diclosulam:

Toxicidad oral aguda (rata):	DL50: > 5000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata):	DL50: > 2000 mg/kg

Del producto formulado (parte sólida A) diclosulam:

Toxicidad oral aguda (rata):	DL50: > 5000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata):	DL50: > 2000 mg/kg
Irritación dermal:	Leve irritante
Irritación ocular:	Moderado irritante

Del producto formulado (parte líquida B) sulfentrazone:

Toxicidad oral aguda (rata):	DL50: > 2500 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata):	DL50: > 4000 mg/kg
Irritación dermal:	No irritante
Irritación ocular:	Moderado irritante

En caso de ingestión, consultar las maniobras de descontaminación a un Centro de Intoxicaciones, suministrando los datos de la composición del producto y el estado del paciente y/o llevarlo al lugar de atención más cercano. Nunca administrar nada por boca, ni inducir el vómito a una persona inconsciente. Inhalación: una vez retirado el paciente del lugar, despejarle las vías aéreas y nebulizar con oxígeno humidificado. Luego de la descontaminación, colocar al paciente en un lugar abrigado y en posición lateral si está inconsciente, para evitar la posible aspiración del vómito.

Riesgos ambientales:

Parte sólida A (diclosulam):

Toxicidad para abejas:	Ligeramente tóxico
Toxicidad para aves:	Prácticamente no tóxico
Toxicidad para peces:	Prácticamente no tóxico

Parte líquida B (sulfrentrazone):
Toxicidad para abejas: Ligeramente tóxico
Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico
Toxicidad para peces y artrop acuáticos: Ligeramente tóxico

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
SPIDER XTRA PACK	CORTEVA AGRISCIENCE ARGENTINA SRL	PACK 232	WG + SC	84% + 50%	III