PICOXYSTROBIN + CYPROCONAZOLE + FOSFITOS DE COBRE Y BORO

Marcas comerciales: STINGER DUO PACK (*).

Nomenclatura Química:
picoxistrobin: metil (E)-2-[2-(6-trifluorometilpirydin-2-yloxymetil)-fenil]-3-metoxyacrilato.
cyproconazole: 2-(4-clorofenil)-3-ciclopropil-1-(IH-1,2,4-triazol-1-il)-butano-2-ol.
Fosfitos de cobre y boro
Clasificación Química: estrobilurina + triazol + compuesto inorgánico.
Acción: sistémica, residual, preventiva y curativa y fitoestimulante con Cu, B, P, N y aminoácidos.

Uso: fungicida.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Trigo	Mancha amarilla (*Drechslera tritici-repentis)* Mancha de la hoja del trigo (*Septoria tritici)* Roya anaranjada del trigo (*Puccina recondita)*	Stinger® 300 a 400 cm3/ha (1) + Cubo® 120 - 200 cm3/ha	30	El desarrollo de enfermedades normalmente ocurre desde principio de encañazón hasta hoja bandera completamente desplegada (última hoja que se despliega). Aplicar durante este período cuando aparezcan los primeros síntomas o tan pronto como las condiciones climáticas sean favorables para el desarrollo de enfermedades. Dentro del período señalado es muy importante proteger la hoja bandera y la inmediata inferior, dada la importancia de las mismas en el llenado de granos y definición del rendimiento.
Soja	Mancha marrón o Septoriosis (*Septoria glycines)* Mancha ojo de rana (*Cercospora sojina)* Mancha púrpura de la semilla, Tizón de la hoja (*Cercospora kikuchii)*	Stinger® 250 - 300 cm3/ha (2) + Cubo® 120 - 200 cm3/ha	30	A partir de R3 hasta R5.5 cuando se observen los primeros síntomas en la planta.
	Roya asiática de la soja (*Phakopsora pachyrhizi)*	Stinger® 300 cm3/ha + Cubo® 120 - 200 cm3/ha		Aplicar al observar los primeros síntomas (con el cultivo en el estado de R3 a R5). En caso de persistir condiciones favorables y aparecer nuevas pústulas, realizar una segunda aplicación.
Maíz	Roya del maíz (*Puccinia sorghi)*	Stinger® 500 - 600 cm3/ha + Cubo® 120 - 200 cm3/ha	80	Aplicar a partir de V6, cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad.
	Tizón de la hoja, Tizón del Norte (*Exserohilum turcicum)*	Stinger® 600 cm3/ha + Cubo® 120 - 200 cm3/ha		

(1) Nota: Utilizar la dosis mayor en las regiones trigueras IV y V Sur, o en caso de aplicaciones en cultivares de ciclo largo. También utilizar la dosis mayor en aquellas variedades caracterizadas como susceptibles, según calificación de cultivares o información zonal o regional del INTA.
(2) Utilizar la dosis mayor cuando las condiciones sean favorables al desarrollo de enfermedad. Caso contrario utilizar las dosis menores.

Información General:

Stinger® Duo Pack contiene Stinger® que es un fungicida de uso agrícola con propiedades sistémicas, acción preventiva, y curativa post infectiva (en las primeras fases luego de la infección) y efecto residual, para el control de las enfermedades detalladas en su etiqueta en los cultivos de trigo, maíz y soja. Stinger® combina la acción de dos principios activos, picoxystrobin y cyproconazole, los cuales en conjunto poseen acción preventiva, porque inhibe la germinación de esporas, y efecto curativo porque inhibe el crecimiento micelial de los hongos patógenos.
Stinger® Duo Pack contiene además Cubo®. Cubo® es un fitoestimulante de última generación que contiene una fórmula equilibrada de aminoquelatos con fosfitos de cobre, boro, potasio, azufre, fósforo y nitrógeno. Por ser un producto sistémico es ideal para complementarla acción de fungicidas e insecticidas. Induce el aumento de defensas de las plantas contra los patógenos. Los fosfitos son inductores de la síntesis de fitoalexinas, sustancias naturales responsables del mecanismo de autodefensa de las plantas.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación
Debe aplicarse al cultivo con el volumen necesario para lograr una buena cobertura. Se recomienda utilizar la cantidad de agua necesaria de acuerdo al estado de desarrollo del cultivo, a fin de lograr una excelente cobertura del mismo; evitar que se produzca escurrimiento del mismo por exceso de agua.
Puede ser aplicado con equipos terrestres o aéreos:
-En aplicaciones terrestres se deben utilizar caudales no inferiores a 100 litros de agua por hectárea, trabajando con una presión de 50-80 libras/pulg2 (5,5 - 7 bar) para lograr una buena penetración del producto y mojado del cultivo.
Es recomendable una aplicación que logre una distribución uniforme de gotas en la superficie foliar y cuyo tamaño sea lo más homogéneo posible. Los picos más aptos para tal fin son los de cono hueco y doble abanico plano, que producen gotas de entre 100 y 250 micrones. Se deben lograr entre 40 y 60 impactos/cm2 de la superficie foliar.
Antes de aplicar es necesaria la calibración del equipo con agua, a velocidad y presión constantes, en un terreno de iguales características al sitio de aplicación.
-Con equipos aéreos se debe utilizar un caudal no menor de 30-40 l/ha, calibrando el equipo para asperjar entre 30-40 gotas/cm2. No aplicar utilizando gas oil. No exceder nunca el ancho efectivo de trabajo de la aeronave.

Suspender las aplicaciones con vientos superiores a los 10 km/h.

Preparación
Para la preparación se aconseja seguir los siguientes pasos:
1. Agitar ambos productos antes de usar
2. Verificar que el equipo esté perfectamente limpio.
3. Cargar el tanque de la pulverizadora con agua limpia y filtrada, hasta la mitad de su capacidad y poner el agitador en marcha.
4. Agregar luego el volumen necesario de Stinger® según superficie a tratar y dosis a aplicar; incorporar el producto lentamente al tanque del equipo, sin disolución previa, evitando salpicaduras.
5. Agitar bien la vejiga del producto Cubo® y agregar el volumen necesario. Agitar mediante el retorno de la bomba hasta lograr una suspensión homogénea.

Siempre agregar los productos individualmente esperando que se disuelva o suspenda cada uno totalmente antes de agregar el siguiente.
Cuando se realicen mezclas de tanque, los polvos mojables y granulados dispersables deben agregarse al tanque antes que Stinger®; productos con otras formulaciones deben agregarse luego de Stinger® y solo después que éste se haya suspendido completamente.
6. Completar la carga de agua del tanque y agitar mediante el retorno de la bomba hasta lograr una suspensión homogénea.

Preparar únicamente lo estimado para aplicar en el día. No es conveniente dejar producto preparado de un día para el otro.

Advertencias
No utilizar en cultivos ornamentales, hidropónicos o cualquier otro uso distinto de lo específicamente indicado en esta etiqueta.
No aplicar en cultivos sometidos a estrés producto de sequías, bajas temperaturas, ataque de insectos, deficiencias minerales, etc.
No debe aplicarse si se prevén lluvias dentro de las tres horas luego de la aplicación.

Compatibilidad
Stinger® Duo Pack es compatible con la mayoría de los compuestos fitosanitarios excepto los de reacción alcalina como el caldo bordelés y polisulfuro de calcio. No aplicar en mezcla con ningún producto sin realizar previamente una prueba en pequeña escala, de compatibilidad física y biológica de los componentes, y de fitotoxicidad para el cultivo.

Fitotoxicidad
Stinger® Duo Pack no es fitotóxico para los cultivos recomendados y en las condiciones de uso detalladas en esta etiqueta.
No aplicar en días calurosos o de gran insolación.

Derrames:
Contener y adsorber el derrame con un material inerte (arena, tierra) y recogerlo con pala conjuntamente con la capa superficial de suelo afectado. En ambos casos colocar el material recogido en tambores rotulados y cubrirlo totalmente con una solución al 1% de agua amoniacal (1 litro cada 100 litros de agua) para su posterior destrucción por empresas autorizadas.

Clasificación (modo o sitio de acción): 11 (FRAC) + 3 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Debe utilizarse el siguiente equipo: protector facial y gorra con protección para la nuca, camisa de mangas largas y pantalones largos -o enterizo de Tyvek®-, botas de goma y guantes con barreras laminadas o de goma de nitrilo o butilo.
En aplicaciones prolongadas y sin la debida protección, el producto puede irritar la piel. Utilizar siempre los equipos de protección recomendados.

Información Toxicológica:

Toxicidad oral aguda (rata):	DL 50: > 2000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (conejo):	DL 50: > 4000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata):	CL 50: poco peligroso (ingredientes activos).
Irritación dermal:	Levemente irritante
Irritación ocular:	Levemente irritante
Sensibilización cutánea:	No sensibilizante

Tratamiento: No existe antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.

Riesgos ambientales

Toxicidad para abejas:	Virtualmente no tóxico.
Toxicidad para aves:	Ligeramente tóxico.
Toxicidad para peces y organismos acuáticos:	Muy tóxico

Precauciones ambientales:
Deben extremarse los cuidados para evitar la contaminación directa de los cuerpos de agua ya sea durante la aplicación y uso del producto, o durante las operaciones de carga y limpieza del equipo, enjuague de envases vacíos, etc. Evitar la deriva de la pulverización.
En todos los usos del producto debe dejarse una franja sin aplicar (zona buffer) de al menos 5 metros sobre las riberas de cuerpos o cursos de agua.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
STINGER DUO PACK (*)	DUPONT ARGENTINA SRL	Pack N° 241	SC - L	20% + 8% + 6,2-13-0	III

(*) Pack está constituído por Stinger® + fertilizante Cubo® (fertilizante de FULLTEC S.R.L.)