DIMETENAMIDA - P

Marcas comerciales: FRONTIER-P.

Nomenclatura Química:
dimetenamida -P: S-2-cloro-N-(2,4-dimetil-3-tienil)-N-(2-metoxi-1-metiletil) acetamida
Clasificación Química: cloroacetamida.
Acción: sistémica y residual.

Uso: herbicida.

Cultivo	Maleza	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Maíz	Digitaria o Pasto cuaresma (*Digitaria sanguinalis)* Echinochloa o Capín (*Echinochloa colonum)*	1000 cm3/ha		Presiembra. Preemergencia Nunca deberá haber nacimientos de malezas

Información General:

Es un herbicida para usar en aplicaciones de pre-siembra, pre-emergencia en maíz. Controla gramíneas anuales y algunas latifoliadas. El principio activo dimetenamida-P penetra dentro de la planta a través de los coleoptiles en desarrollo de las gramíneas en germinación, o los hipocótiles de las latifoliadas. Las malezas mueren antes de emerger o bien inmediatamente después de salir a la superficie. Su residualidad en el suelo depende de las características del mismo y de las condiciones climáticas, y las labores realizadas en el cultivo.

INSTRUCCIONES DE USO
Preparación: para la preparación del producto se deberá cargar el tanque de la pulverizadora hasta la mitad, poner el retorno en marcha, agregar el producto en la cantidad dosificada previamente, y luego completar el resto con agua. En caso de realizar mezclas de tanque con otros herbicidas de formulación floable o dispersables en agua, recomendamos agregar al tanque de la pulverizadora primero dichos productos, esperar su total disolución y posteriormente agregar la dimetenamida -P.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: puede ser aplicado con equipos terrestres provistos de boquillas de abanico plano para herbicidas, con volumen de 150 a 200 l. agua/ha, para lograr una buena distribución sobre el suelo desnudo. Para ello los abanicos de los picos deberán tener una superposición para no dejar franjas sin tratar. Los mejores resultados se lograran cuando el suelo este bien desmenuzado, sin cascotes grandes, y sin malezas nacidas, arraigadas o grandes. Evitar su aplicación con vientos mayores a 10 km/h que provoquen deriva a los cultivos vecinos sensibles e impida una distribución uniforme en el suelo.

RECOMENDACIONES DE USO
Deberá ser aplicado con equipos correctamente calibrados y en buenas condiciones, para lograr una cobertura uniforme sobre el suelo. De esta forma se creará una zona tratada con el herbicida que controlara las malezas cuando germinen. Por ello se recomienda que la aplicación se realice lo más cercano posible a la siembra, de manera tal que no haya malezas nacidas o emergiendo. Asimismo el suelo no deberá tener terrones grandes que actúen como paraguas de la aplicación.
El herbicida necesita de la humedad para su activación.
En caso de aplicarse el producto en cultivos de labranzas cero y con abundante cantidad de residuos en superficie, se recomienda utilizar el caudal máximo de agua recomendado y también aumentar la presión de trabajo a valores que aseguren un tamaño de gota pequeño, para penetrar la cobertura de residuos.

RESTRICCIONES DE USO
Período de carencia: uso posicionado. No requiere fijación de una tolerancia en aplicación preemergente del cultivo de maíz. En el caso de que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Fitotoxicidad: No se ha observado fitotoxicidad a las dosis recomendadas.

Compatibilidad: es compatible con la mayoría de los herbicidas de uso común en los cultivos recomendados (ejemplo: atrazina, metribuzin, flumetsulam, linuron, imazetapir, fluorocloridona, prometrina, diflufenican, diurón, fluometuron). De todos modos se recomienda una prueba a escala reducida o consultar previamente.

Derrames:
Recoger el líquido derramado con un material adsorbente como arena, aserrín o tierra y recolectar el material en contenedores cerrados e identificados para su posterior incinerado. Luego manguerear el área de derrame por un período prolongado evitando contaminar aguas superficiales y/o profundas.

Clasificación (modo o sitio de acción): K3 (HRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:

Carga del equipo: protector facial, guantes de goma de neoprene o nitrilo y botas de goma, camisa de mangas largas y pantalones largos o enterizos de Tyvek®.
Aplicación: protector facial con filtro combinado para gases orgánicos, inorgánicos, ácidos inorgánicos y alcalinos/vapor, gafas protectoras con protección lateral (gafas con montura), guantes de goma de nitrilo, camisa de mangas largas y pantalones largos o enterizo de Tyvek® o delantal, gorra con protección para la nuca y calzado con medias o botas de protección.

Información Toxicológica:

Del producto formulado:

Toxicidad oral aguda (rata):	DL 50: > 5.000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata):	DL 50: > 2.000 mg/kg
Inhalación (rata):	CL 50: > 2,3 mg/l
Irritación dermal:	Ligeramente irritante
Irritación ocular:	Ligeramente irritante
Sensibilización dermal:	Sensibilizante

Después de una ingestión oral prácticamente no es tóxico. Prácticamente no tóxico por un único contacto cutáneo. Prácticamente no tóxico, después de una única inhalación. No es irritante para la piel. No es irritante para los ojos. Sensibilizante en cobayas.

Riesgos ambientales:

Toxicidad para abejas:	Virtualmente no tóxico
Toxicidad para aves:	Ligeramente tóxico
Toxicidad para peces:	Moderadamente tóxico

Evitar contaminar los cursos de agua durante el manipuleo, aplicación o en la limpieza del equipo.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
FRONTIER-P	BASF ARGENTINA	38870	EC	72%	II