# FLUXAPYROXAD

**Marcas comerciales**: SISTIVA.

**Nomenclatura Química:**
fluxapyroxad: 3-(difluorometil)-1-metil-N-(3',4',5'-trifluorobifenil-2- il)pirazol-4-carboxamida.
**Clasificación Química:** carboxamida.
**Acción:** curativa y erradicante.

**Uso:** fungicida y terápico para el tratamiento de semillas.

| Cultivo | Enfermedad | Dosis | TC | Momento de Aplicación |
|---|---|---|---|---|
| Avena | Roya de la hoja *(Puccinia coronata)* | Sistiva 75 ml/100 kg + Premis 25 ml/100 kg | | Tratamiento de semillas. |
| Cebada | Escaldadura (*Rhynchosporium secalis)* Mancha en red (*Drechslera teres)* | Tratamiento AgCelence 75 cm3/100 kg | | |
| Trigo | Mancha amarilla *(Drechslera tritici repentis)* Roya de la hoja *(Puccinia triticina)* | Tratamiento AgCelence 75 ml/100 kg semilla | | |

**Información General:**

Es un fungicida sistémico para el tratamiento de semillas con una alta actividad específica en el control de patógenos y muy buena acción de persistencia. Está compuesto por fluxapyroxad que protege la semilla y favorece la germinación junto con el desarrollo inicial del cultivo, promoviendo el establecimiento de un mejor stand de plantas. Pertenece al grupo de las Carboxamidas y es un eficiente inhibidor de la SDH (succinato dehidrogenasa) enzima fundamental en el proceso de la respiración mitocondrial de las células de los hongos produciendo la interrupción del abastecimiento de energía en los procesos metabólicos de los hongos. Lo cual da como resultado la detención del crecimiento de micelios y desarrollo de esporas. Presenta también una acción prolongada, curativa y erradicante. Protege las semillas y los primeros estadios de las plántulas de enfermedades producidas por hongos de semilla y presentes en los rastrojos como Mancha en red (Drechslera teres) y Escaldadura (Rynchosporium secalis) en cebada. A la dosis recomendada de 75 ml/100kg brinda un efecto AgCelence de protección prolongada contra las enfermedades mencionadas retrasando su incidencia en el cultivo hasta los 45 días y disminuyendo su severidad a los 60 días en comparación con los testigos no tratados. Este beneficio brinda cierta flexibilidad a la hora de realizar la primer aplicación de fungicidas foliares para el control de manchas. Se observa también una menor cantidad de hojas senescentes en la base de la planta permaneciendo verdes por más tiempo.
SISTIVA, en mezcla con el producto PREMIS (triticonazole 10%, SC), se recomienda en el cultivo de avena para el control de roya de la hoja, Puccinia coronata, brindando un efecto residual hasta los 60 días de emergidas las plantas.

INSTRUCCIONES DE USO
Preparación: importante: agitar bien el envase antes de usar. Es una suspensión concentrada para ser aplicada sobre las semillas de cebada. El producto debe aplicarse diluido por medio de un equipo apropiado para el tratamiento de semillas. La dilución se prepara agregando la dosis recomendada de producto y agua. Es compatible con la aplicación de inoculantes y productos usualmente utilizados en tratamiento de semillas. El presente producto debe ser comercializado y aplicado conforme a la/s normativa/s provinciales y municipales correspondientes.

Restricciones de uso:
Utilizar conforme a las recomendaciones de uso.
No tratar semilla con un contenido de humedad por encima de 16% y evitar que el contenido de humedad de la semilla tratada exceda el 16%.
No aplicar a semilla que posea daños físicos, rajadoras o grietas.
Al cambiar de tratamiento y/o especie de semilla a ser tratada y verifique de limpiar y enjuagar con abundante agua las bombas, cañerías, filtros y elementos de aplicación.
Mantener los envases bien cerrados y almacenados en lugar seco y fresco.

Compatibilidad: puede ser aplicado de manera secuencial o en mezcla con insecticidas como imidacloprid y clothianidin.

Fitotoxicidad: bajo las condiciones de uso recomendadas, el producto no es fitotóxico para los cultivos indicados. Puede ocasionar una leve demora en la emergencia la cual se revierte sin dejar efectos nocivos.

**Derrames:**
Hacer un dique con material inerte (arena, tierra, arcilla) y transferir el material líquido y sólido impregnado a envases para su destrucción. Evitar que el derrame se dirija a alcantarillas o depósitos abiertos de agua o cursos de agua.

**Clasificación (modo o sitio de acción):** 7 (FRAC).

**Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:**

Usar máscara, guantes de vinilo, botas de goma, mameluco o delantal extra-largo durante la preparación y aplicación.

**Información Toxicológica:**

| | |
|---|---|
| Toxicidad oral aguda (rata): | DL50: > 2.000 mg/kg |
| Toxicidad dermal aguda (rata): | DL50: > 5.000 mg/kg |
| Inhalación (rata): | CL50: > 5,2 mg/l (4 h) |
| Irritación dermal: | Leve irritante dermal |
| Irritación ocular: | Leve irritante ocular |
| Sensibilización dermal: | No sensibilizante. |

Después de una ingestión oral prácticamente no es tóxico. Prácticamente no tóxico por un único contacto cutáneo. Prácticamente no tóxico, después de una única inhalación. No es irritante para la piel. No es irritante para los ojos. No existen evidencias de un potencial efecto de sensibilización de la piel. El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias o productos de una estructura o composición similar.

Riesgos ambientales
Producto prácticamente no tóxico para aves y virtualmente no tóxico para abejas. Moderadamente tóxico para peces. La semilla aplicada con este curasemilla deberá sembrarse a una distancia mínima de 10 metros de distancia de lagos, ríos, corrientes de agua permanentes, lagunas naturales, estuarios, pantanos y criaderos comerciales de peces.

| Marca | Empresa | N° Inscrip. | Form. | Conc. | C.T. |
|---|---|---|---|---|---|
| SISTIVA | BASF ARGENTINA | 38698 | SC | 33,3% | III |