HALAUXIFEN METIL + DICLOSULAM

Marcas comerciales: CLEANTIUM FUSION - PAXEO FUSION - PORTRAX - TEXARO.

Nomenclatura Química:
halauxifen metil: 4-amino-3-cloro-6-(4-cloro-2-fluoro-3-3-metoxifenil)piridin-2-carboxilato de metilo
diclosulam: : N-(2,6-diclorofenil)-5-etoxi-7-fluoro-1,2,4-triazolo[1,5 c] pirimidina-2-sulfonamida.
Clasificación Química: triazolpirimidina + arilpicolinato.
Acción: sistémica.

Uso: herbicida (preemergente).

Cultivo	Maleza	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Soja - Presiembra	Bejuco (*Ipomoea nil)* Campanilla (*Ipomoea purpurea)* Capín (*Echinochloa colona)* Capín (*) (*Echinochloa crus-galli)* Chamico (*Datura ferox)* Chinchilla (*Tagetes minuta)* Malva (*Anoda cristata)* Pasto bandera (*) (*Urochloa panicoides)* Pasto de cuaresma (*) (*Digitaria sanguinalis)* Pata de ganso (*) (*Eleusine indica)* Quínoa, Quínoa blanca (*Chenopodium album)* Rama negra (*Conyza spp.)* Saetilla o Amor seco (*Bidens pilosa)* Verdolaga (*Portulaca oleracea)* Yuyo colorado (**) (*Amaranthus spp.)*	36 g/ha (suelos arenosos) 43 g/ha (suelos franco arenosos/franco arcillosos) 50 g/ha (suelos arcillosos) + glifosato (60,8 %) 2 l/ha + ésteres metílicos de ácidos grasos de aceite vegetal (76,6 %)		Pre-siembra: del cultivo de soja. Es importante respetar un intervalo de 7 días entre la aplicación y la siembra del cultivo de soja.

(*) DIclosulam, como herbicida de suelo, otorga un control residual de 40-50 días sobre estas gramíneas anuales. Los biotipos de las mismas que presenten resistencia al modo de acción EPSPS no serán controladas por el herbicida glifosato.
(**) Los biotipos de Amaranthus resistentes a los modos de acción EPSPS o EPSPS + ALS no son controlados.

Información General:

Es un herbicida sistémico residual que combina dos modos de acción diferentes, recomendado para el control de malezas de hoja ancha y gramíneas anuales de semilla en pre-siembra del cultivo de soja. Para lograr controles residuales eficientes deben producirse lluvias después de la aplicación, independientemente de la humedad del suelo.

Preparación:
1) Colocar agua en el tanque de la pulverizadora hasta la mitad de su capacidad y hacer funcionar el retorno.
2) Agregar la cantidad de la formulación necesaria para la superficie que se va a tratar.
3) Agregar glifosato (60,8%) a la mezcla, según dosis recomendada.
4) Agregar Aceite metilado de soja (76,6%) en el caldo a razón de 0,5 % v/v (0.5 litros de aceite cada 100 litros de caldo).
5) Completar el llenado del tanque con agua.

Técnica de aplicación:
Puede ser aplicado hasta siete días antes de la siembra y hasta 7 días antes del cultivo de soja. Se recomienda rotar los lotes que han sido tratados únicamente a los cultivos de soja, maíz, maní y trigo.
En labranza convencional, preparar primero la cama de siembra y luego aplicar en pre-siembra o pre-emergencia (no requiere incorporación debido a que es un producto estable que no es degradado por la luz solar ni se volatiliza). Se recomienda la mezcla con glifosato (60,8%) si hay malezas nacidas en el momento de la aplicación del formulado.

Restricciones de uso:
- El herbicida debe ser aplicado en el suelo, en pre-siembra del cultivo de soja. Debe respetarse un intervalo de 7 días previo a la siembra.
- En general, para todos los casos, las malezas deben estar en activo crecimiento y debe haber buena humedad en el suelo.
- No aplicar con vientos superiores a 10 km/hora.
- Para lograr controles residuales eficientes deben producirse lluvias después de la aplicación, independientemente de la humedad del suelo.
No aplicar en suelos clasificados como arenosos, con contenido de Materia Orgánica menor al 1%.

Tiempo de reingreso al área tratada: Dejar transcurrir 12 horas después de la aplicación para ingresar al área tratada. En caso de necesitar hacerlo con anticipación, realizar el ingreso con el equipo de protección personal adecuado.
En caso de que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.
El presente producto debe ser comercializado y aplicado dando cumplimiento a las normativas provinciales y municipales correspondientes.

Compatibilidad:
Es compatible con los herbicidas recomendados para la mezcla de tanque. No se espera potenciación, sinergismo ni aditividad con los productos con los que se recomienda su mezcla.

Derrames:
Contener y absorber el producto derramado con material inerte (tierra, arena o aserrín). A continuación, barrer y recoger el mismo en bolsas o recipientes correctamente rotulados para su posterior destrucción (por empresas autorizadas para tal fin). Lavar con abundante agua y jabón el área contaminada. Evitar que el material tome contacto con desagües, cloacas, cuerpos o cursos de agua, o contamine aguas de riego y/o de uso doméstico. En caso de que esto ocurra, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal.
Producto sin preparar:
Barrer lentamente y recoger con pala, evitando generar polvo. No usar agua. Enviar para su incineración a instalaciones autorizadas, o disponer en sitios autorizados.
Caldo de pulverización:
Cubrir el producto con un material adsorbente (arena o tierra), y luego recogerlo con pala. Si el derrame se produce en cercanías de plantas o árboles, después de la limpieza inicial, remover 5 cm de tierra superficial.
En todos los casos, el material recogido se colocará en tambores y se enviará para su incineración a sitios autorizados. No incinerar a cielo abierto.

Clasificación (modo o sitio de acción): 2 (WSSA) + 4 (WSSA).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Guantes de nitrilo reforzado; botas de goma; camisa de mangas largas y pantalón largo para cubrir totalmente brazos y piernas; delantal; barbijo y antiparras y/o protector facial.

Información Toxicológica:

Del producto formulado:

Toxicidad oral aguda (rata hembra):	DL50: > 5000 mg/kg
Toxicidad dermal (ratas):	DL50: > 5000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata):	CL50: > 5.47 mg/l
Irritación dermal:	Leve irritante
Irritación ocular:	Moderado irritante
Sensibilización dermal:	No sensibilizante

Antídoto: no posee. En caso de ingestión no provocar el vómito. El lavaje gástrico debe ser supervisado por personal entrenado. Consultar a un médico. Nunca suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente.

Riesgos ambientales:
Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico.
Toxicidad para peces: Ligeramente tóxico. Altamente tóxico para algas.
Toxicidad para abejas: Virtualmente no tóxico.
Evitar la deriva de la aplicación, o la llegada del producto a cursos o cuerpos de agua. Se recomienda establecer severas medidas de mitigación como ser la aplicación del compuesto a una distancia mayor a 10 metros de todo curso de agua. El producto no presenta riesgos para el medio ambiente si se usa siguiendo las recomendaciones de este marbete.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
CLEANTIUM FUSION	CORTEVA AGRISCIENCE ARGENTINA SRL	40702	WG	11,5% + 58%	IV
PAXEO FUSION	CORTEVA AGRISCIENCE ARGENTINA SRL	39078	WG	11,5% + 58%	IV
PORTRAX	CORTEVA AGRISCIENCE ARGENTINA SRL	41407	WG	11,5% + 58%	IV
TEXARO	CORTEVA AGRISCIENCE ARGENTINA SRL	38495	WG	11,5% + 58%	IV