SULFOXAFLOR

Marcas comerciales: CLOSER - TRANSFORM.

Nomenclatura Química:
sulfoxaflor: N-[metiloxido[1-[6-(trifluorometil)-3-pyridinil]etil]-lamda 4-sulfanilidina] cyanamida
Tipo de producto: químico
Clasificación Química: sulfoximina.
Acción: de contacto y sistémica.

Uso: insecticida.

Cultivo	Plaga	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Duraznero Nectarina	Pulgon verde (*Myzus persicae)*	PC 24%: 10 - 20 cm3/hl	7	Aplicar cuando se detecte la presencia de colonias en los brotes de la planta. Ante presiones altas, aplique la dosis mayor.
Manzano Peral	Pulgón lanígero (*Eriosoma lanigerum)*			Aplicar cuando se detecta presencia de colonias en la parte aérea de la planta.
	Cochinillas harinosas (*Pseudococcus spp.)*	PC 24%: 20 - 30 cm3/hl		Aplicar sobre ninfas móviles, según el Servicio de Alarma o monitoreo de las poblaciones. Realizar las aplicaciones con aceite coadyuvante (0,25% v/v) o tensioactivo siliconado (0,02%v/v)
	Piojo de San José (*Quadraspidiotus perniciosus)*			Aplicar cuando se observe movimiento de ninfas. Realizar las aplicaciones con tensioactivo siliconado (0,02 %v/v) o aceite coadyuvante (0,25% v/v)
Trigo	Pulgón amarillo de los cereales (*Metopolophium dirhodum)*	PC 24%: 75 - 100 cm3/ha PC 50%: 30 - 40 gr/ha	10	Umbrales: macollaje: 10 pulgones por planta. Encañazón: 15-20 pulgones por planta. Hoja bandera-espigazón: 40-50 pulgones por tallo. Se recomienda trabajar con altos volúmenes que aseguren una buena penetración en el canopeo, logrando una buena cobertura en la parte media de la planta.
	Pulgón de la espiga (*Sitobion avenae)*			Umbrales: de espigazón a floración: 5 pulgones por espiga. Grano lechoso: 20-30 pulgones por espiga. Se recomienda trabajar con altos volúmenes que aseguren una buena penetración en el canopeo, logrando una buena cobertura en la parte media de la planta
	Pulgón verde de los cereales (*Schizaphis graminum)*			Umbrales: desde emergencia hasta 15 días: 3-5 pulgones por planta. Luego de 15 días de emergido el cultivo: 15 pulgones por planta. Se recomienda trabajar con altos volúmenes que aseguren una buena penetración en el canopeo, logrando una buena cobertura en la parte media de la planta.
Alfalfa	Pulgon manchado *(Therioaphis trifolii*) Pulgon verde (*Acyrthosiphon pisum*)	PC 50%: 30 gr/ha	7	Realizar monitoreos semanales del cultivo, incluso en épocas invernales. Umbrales: Para cultivos en etapa de implantación (promedio de pulgones por plántula): 2 a 5 individuos de pulgón verde; 1 a 3 individuos de pulgón azul o negro; 1 individuo de pulgón moteado. Para cultivos en activo crecimiento y hasta 30 cm de altura: 20 a 25 individuos de pulgón verde por tallo; 15 a 20 individuos de pulgón azul o negro por tallo. Para cultivos de más de 30 cm de altura: 30 a 40 individuos de pulgón verde y 20 a 25 individuos de pulgón azul o negro por tallo. En primavera y otoño: 40 individuos de pulgón manchado por tallo y en verano, 20 individuos de la misma especie por tallo.
	Pulgón azul (*Acyrtosiphon kondoi*) Pulgon negro (*Aphis craccivora*)	PC 50%: 50 gr/ha		
Algodon	Pulgón del algodonero (Aphis gossypii)	PC 50%: 30 gr/ha	14	Umbrales: 15 a 20 pulgones por hoja en promedio, para plantaciones en estadios vegetativos; 20 a 40 pulgones por hoja en promedio para plantaciones atravesando estadios reproductivos, hasta aproximadamente 80 días después de la emergencia.
Arveja o Alverja	Pulgon verde (Acyrthosiphon pisum)			Umbrales: Aplicar cuando se observe el establecimiento de colonias de pulgones en el cultivo, habiendo realizado monitoreos frecuentes (por lo menos una vez por semana).
Kiwi	Escama blanca (*Hemiberlesia lataniae*)	PC 24%: 400-600 ml/ha	7	Aplicación dirigida al follaje del cultivo. Se recomienda utilizar volúmenes de aplicación en un rango de 500 a 1500 L/ha Determinar el volumen de aplicación en función del tamaño de la planta. Aplicar procurando asegurar un correcto cubrimiento sobre el follaje del árbol. Aplicar en estadíos móviles de la plaga. Utilizar dosis mayor en condiciones de alta prevalencia de la plaga. Numero de máximo de aplicaciones: 2 con intervalo de 30 días.

Lenteja	Pulgones (Acyrthosiphon pisum) Pulgones (Myzus persicae)	PC 50%: 30 gr/ha		Umbrales: Aplicar cuando se observe el establecimiento de colonias de pulgones en el cultivo, habiendo realizado monitoreos frecuentes (por lo menos una vez por semana).
Papa	Pulgón verde del duraznero *(Myzus persicae)*	PC 50%: 30 - 40 gr/ha		Aplicación dirigida al follaje del cultivo. Comenzar la aplicación cuando la población supere el umbral de daño económico. Aplicar la dosis mayor en casos de alta presiones de la plaga
Sorgo	Pulgon de la caña de azúcar o pulgón amarillo del sorgo *(Melanaphis sacchari)*	PC 50%: 40 gr/ha	28	Aplicación dirigida al follaje del cultivo. Comenzar la aplicación cuando la población supere el umbral de daño económico. En caso de cultivos estresados, altas temperaturas y baja humedad relativa, se recomienda el agregado de aceite vegetal (a la dosis especificada por cada producto) para mejorar la eficacia del producto.

Nota: Entre aplicación del producto y el pastoreo de la alfalfa y sorgo o del corte del forraje dejar transcurrir 7 días.

Información General:

Sulfoxaflor está recomendado para control de insectos chupadores en los cultivos de trigo, manzano, peral, durazno y nectarina según se indica en las recomendaciones de uso.
Sulfoxaflor causa excitación del sistema nervioso (temblores, parálisis y mortalidad) del insecto alterando la función nicotínica. Presenta una única interacción con los receptores nicotínicos de acetilcolina, distinta de aquella observada en los neonicotinoides. No interactúa en los mismos sitios de acción de insecticidas neonicotinoides, fenilpirazoles y abamectinas, por lo que no se espera la aparición de resistencia cruzada con insecticidas de estos grupos químicos.

Equipos, volumen y técnicas de aplicación:
Aplicaciones terrestres:
Pulverizar con 80 - 120 litros de agua/ha, utilizando pastillas de cono hueco. Presión: 40 lb/pulg2. No aplicar con vientos mayores a 10 km/h.
Para frutales de pepita (manzano y peral), se recomienda la utilización de equipos nebulizadores, trabajando a una presión de 200-300 lb/pulg2.
Aplicaciones aéreas:
Pulverizar con no menos de 10 litros de agua/ha. No mezclar con gasoil como vehículo en aplicaciones aéreas.
Número de gotas: aplicar 50-70 gotas/cm2.

Manejo de resistencia
Para prevenir la selección de poblaciones naturalmente resistentes a un insecticida, deben respetarse las recomendaciones de uso (dosis y momento de aplicación, número máximo de aplicaciones por ciclo) detalladas en el marbete, y no aplicar insecticidas antes que los niveles poblacionales de la plaga alcancen los umbrales de daño.
Así mismo debe evitarse el uso reiterado de insecticidas con un único sitio de acción a lo largo de todo el ciclo del cultivo y no debe aplicarse el mismo insecticida o a dos generaciones sucesivas de una misma plaga.
Para controlar una población resistente a un insecticida determinado se deben realizar aplicaciones efectivas de insecticidas constituidos por activos con un sitio de acción distinto y adoptar todas las medidas necesarias para evitar la propagación de dicha población a áreas libres de la misma.
Para alfalfa, arveja, lenteja y sorgo se recomienda no realizar más de 2 aplicaciones por campaña.
Para algodón y papa, no realizar más de 3 aplicaciones por campaña.

Compatibilidad:
No presenta problemas de compatibilidad. Puede ser aplicado en mezcla con surfactantes no iónicos y productos fitosanitarios de uso común. No mezclar con productos fuertemente alcalinos

Derrames:
Contener el líquido derramado con tierra o arena. No usar agua. Evitar la llegada del producto a cursos o cuerpos de agua. Colocar el material de adsorción contaminado en tambores y enviar para su incineración a sitios autorizados. No incinerar a cielo abierto.

Clasificación (modo o sitio de acción): 4C (IRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Guantes de nitrilo reforzado; botas de goma; camisa de mangas largas y pantalón largo para cubrir totalmente brazos y piernas; delantal y antiparras y/o protector facial.

Información Toxicológica:

Del producto formulado 24%:
DL 50 oral aguda en rata: > 5000 mg/kg.
DL 50 dermal aguda en rata: > 5000 mg/kg.
CL 50 inhalatoria aguda en rata: > 2,21 mg/l.

Moderado irritante ocular y leve irritante dermal. No sensibilizante dermal.

Del producto formulado 50%:
DL 50 oral aguda: > 5000 mg/kg.
DL 50 dermal aguda: > 5000 mg/kg.
CL 50 inhalatoria aguda: > 5,35 mg/l.

Severo irritante ocular y leve irritante dermal. No sensibilizante.

En caso de ingestión, consultar las maniobras de descontaminación a un Centro de Intoxicaciones, suministrando los datos de la composición del producto y el estado del paciente y/o llevarlo al lugar de atención más cercano. Nunca administrar nada por boca, ni inducir el vómito a una persona inconsciente. Inhalación: una vez retirado el paciente del lugar, despejarle las vías aéreas y nebulizar con oxígeno humidificado. Luego de la descontaminación, colocar al paciente en un lugar abrigado y en posición lateral si está inconsciente, para evitar la posible aspiración del vómito.

Antídoto: no posee antídoto específico

Riesgos ambientales (24%):
Prácticamente no tóxico para peces. Evitar la deriva de la aplicación o la llegada del producto a cursos o cuerpos de agua. Prácticamente no tóxico para aves. Altamente tóxico para abejas. No aplicar con abejas presentes. Antes de la aplicación avisar a los apicultores para el cierre de colmenas. Si las abejas entran en el lote cuando la pulverización se ha secado en el follaje, no existen riesgos.

Riesgos ambientales (50%):
Ligeramente toxico para peces.
Ligeramente toxico para aves.
Altamente toxico para abejas.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
CLOSER	CORTEVA AGRISCIENCE ARGENTINA SRL	38112	SC	24%	IV
TRANSFORM	CORTEVA AGRISCIENCE ARGENTINA SRL	39259	WG	50%	IV

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.