2,4 D ÉSTER

Marcas comerciales: ADAMA ESSENTIALS 2,4 D ESTER.

Nomenclatura Química:
2,4 D: éster butílico del ácido 2,4-diclorofenoxiacético
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: ácido fenoxi-carboxílico.
Acción: sistémica.

Uso: herbicida (post-emergente).

Cultivo	Maleza	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Alpiste Avena Mijo	Abrepuños (*Centaurea calcitrapa, c.solstitialis, c.melitensis)* Abrojo (*Xanthium cavanillesii)* Alfilerillo (*Erodium cicutarium)* Camelina (*Camelina sariva)* Cardo asnal (*Silybum marianum)* Cardo chileno (*Carduus acanthoides, carthamus lanatus)* Cardo crespo (*Carduus pycnocephalus)* Cardo negro (*Cirsium vulgare)* Cardo pendiente (*Carduus nutans)* Cardo ruso (*Salsola kali)* Cepa caballo (*Xanthium spinosum)* Cerraja (*Sonchus oleraceus)* Chamico (*Datura ferox)* Diente de león (*Taraxacum officinale)* Girasolillo (*Verbesina encelioides)* Lengua de vaca (*Rumex crispus)* Llantén (*Plantago lanceolata)* Lupulina (*Medicago lupulina)* Morenita (*Kochia scoparia)* Mostacilla (*Rapistrum rugosum)* Mostaza negra (*Brassica nigra)* Nabo (*Brassica campestris; brassica napus)* Nabón (*Raphanus sativus)* Paragüita (*Hydrocotyle bonariensis)* Quínoa (*Chenopodium spp)* Yuyo colorado (*Amaranthus spp.)*	(*) PC éster butílico 100% y 97%: 0,3 - 0,4 l/ha	20	Pulverizar desde el comienzo de macollaje hasta el inicio de encañazón. En caso de uso forrajero el tiempo de carencia será de 7 días. Mezclas de 2,4-D éster (80%) + picloram (24%): 0,30 - 0,40 l/ha + 0,08 - 0,12 l/ha. Mezclas de 2,4-D éster (80%) + dicamba (57%): 0,30 - 0,40 l/ha + 0,1 - 0,12 l/ha.
Áreas sin cultivo (Caminos, alambrados, vías férreas, áreas sin cultivo)	(*) PC éster butílico 100% y 97%: 1,2 - 2,0 l/ha	-	Aplicar con malezas pequeñas, en activo crecimiento. Si hiciera falta un segundo tratamiento, aplicar sobre los rebrotes en pleno crecimiento.
Arroz	(*) PC éster butílico 100% y 97%: 0,6 - 1,0 l/ha	20	Desde el comienzo del macollaje, hasta que se inicie el encañado, preferentemente con poca o sin agua de riego.
Campos naturales de gramíneas	(*) PC éster butílico 100% y 97%: 0,6 - 1,2 l/ha	7	Con las malezas en activo crecimiento, a principios de su desarrollo vegetativo.
Caña de azúcar	(*) PC éster butílico 100% y 97%: 0,8 - 1,6 l/ha (post emergencia)		Post-emergencia: cuando el follaje haya desarrollado 60-80 cm. de altura.
	(*) PC éster butílico 100% y 97%: 1,2 - 2,0 l/ha/ha o 25 a 40 cm3/100m lineal de surco	-	Pre-emergencia: después de la siembra de la caña planta. En post emergencia cuando la caña supere los 20 cm de altura.
Cebada Centeno Trigo	(*) PC éster butílico 100% y 97%: 0,3 - 0,4 l/ha	20	Desde pleno macollaje hasta primer nudo de encañazón.
	PC éster butílico 100% y 97%: 0,4 - 0,6 l/ha		Trigo, cebada, centeno: pulverizar desde el comienzo de macollaje hasta que se inicie el encañado. En caso de uso forrajero el tiempo de carencia será de 7 días. Mezclas de 2,4-D éster (80%) + picloram (24%): 0,30 - 0,40 l/ha + 0,08 - 0,12 l/ha. Mezclas de 2,4-D éster (80%) + dicamba (57%): 0,30 - 0,40 l/ha + 0,1 - 0,12 l/ha.
Maíz Sorgo	(*) PC éster butílico 100% y 97%: 0,4 - 0,5 l/ha		Cobertura total: maíz: 2 a 8 hojas, sorgo: 4 a 8 hojas. Con más de 8 hojas realizar aplicación dirigida con caños de bajada. Para plantas de 10 - 15 cm. aplicar en cobertura total. Para plantas más desarrolladas utilizar pulverizadora con barras provistas de prolongadores. No pulverizar durante la época de floración. Para el caso de uso forrajero el tiempo de carencia de 7 días. Mezclas de 2,4-D éster (80%) + picloram (24%): 0,20 - 0,30 l/ha + 0,1 - 0,12 l/ha. Mezclas de 2,4-D éster (80%) + dicamba (57%): 0,20 - 0,30 l/ha + 0,15 - 0,2 l/ha.
	(*) PC éster butílico 100% y 97%: 0,4 - 0,5 l/ha.		Cultivo con más de 8 hojas. Aplicación dirigida con caños de bajada.
Praderas o pasturas cultivadas de gramíneas	(*) PC éster butílico 100% y 97%: 0,4 - 0,6 l/ha	7	Sólo en praderas artificiales de gramíneas forrajeras: Aplicar cuando las forrajeras se encuentren en macollaje y las malezas en estado vegetativo y en activo crecimiento. Mezclas de 2,4-D éster (80%) + picloram (24%): 0,3 - 0,4 l/ha + 0,08 - 0,12 l/ha. Mezclas de 2,4-D éster (80%) + dicamba (57%): 0,3 - 0,4 l/ha + 0,1 - 0,12 l/ha.
Tratamiento precosecha (cereales de grano fino, maíz, sorgo, arroz y lino)	(*) PC éster butílico 100% y 97%: 0,8 - 1,2 l/ha	-	Aplicar en cereales finos, lino, maíz, sorgo y arroz, para facilitar la cosecha mecánica. Aplicar en grano pastoso, con malezas en estado vegetativo temprano.

(*) Son dosis de PC (producto comercial) para las formulaciones de 2,4-D éster butílico al 100% que contienen 79,8 % de equivalente ácido y para las de 97% que contienen 77,4 de equivalente ácido.

Información General:

Herbicida selectivo y sistémico, de acción hormonal. Está recomendado para el control selectivo de malezas de hoja ancha en los cultivos de cereales (trigo, avena, cebada, centeno, maíz, sorgo, alpiste, mijo, arroz), caña de azúcar, pasturas de gramíneas, campos naturales y áreas sin cultivo. También se recomienda su uso en tratamientos pre-cosecha para control de las malezas que puedan interferir con la cosecha mecánica de los cultivos.

Se deben utilizar las dosis inferiores para el control de malezas susceptibles, con pocas semanas de nacidas y creciendo activamente. Emplear las dosis mayores cuando las malezas estén muy desarrolladas o cuando en el cultivo predominen malezas de mediana susceptibilidad.

Se recomienda en aplicaciones terrestres, utilizando pastillas de abanico plano. Utilizar caudales entre 60-80 l/ha con una velocidad de 7-10 km/h y presión de bomba constante. Antes de la aplicación, verificar la distribución uniforme del líquido pulverizado y calibrar el equipo. Aplicar: 20 a 30 gotas por cm2.

Las aplicaciones no deben realizarse cuando exista riesgo de que la aspersión sea llevada por el viento (deriva) sobre plantas o cultivos susceptibles tales como soja, poroto, girasol, alfalfa y otras leguminosas forrajeras, cucurbitáceas, algodón, coles y hortalizas, tréboles, tabaco, vid, maní, pimiento, papa, rabanito, tomate, frutales, árboles forestales y ornamentales o sobre tierras preparadas para la siembra de estos cultivos.

En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

NOTA:
Según la resolución 466/19 y su rectificativa 875/19, ambas de SENASA, a partir del mes de mayo de 2021 se prohíbe la comercialización y uso de los productos formulados con ésteres butílicos e isobutílicos de la sustancia activa 2,4-D.
A partir de esa fecha, se producirá la baja automática de dichos productos en el Registro Nacional de Terapéutica Vegetal a cargo de la Dirección de Agroquímicos y Biológicos dependiente de la Dirección Nacional de Protección Vegetal del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.

Derrames:
Contener el líquido derramado con algún material adsorbente inerte (tierra o arena). No usar agua. Evitar la llegada del producto a cursos o cuerpos de agua. Colocar el material de adsorción contaminado en tambores y enviar para su incineración a sitios autorizados. No incinerar a cielo abierto.

Clasificación (modo o sitio de acción): 4 (HRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Se recomienda utilizar guantes de nitrilo reforzado, botas de goma, camisa de mangas largas y pantalón largo para cubrir totalmente brazos y piernas, delantal resistente a solventes orgánicos, antiparras y/o protector facial.

Información Toxicológica:

Del producto éster butílico al 100%:

Toxicidad oral aguda:	DL50: 1.000 - 2000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda:	DL50: > 4000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda:	CL50: > 2,88 mg/l
Irritación dermal:	Moderado irritante
Irritación ocular:	Leve irritante
Sensibilización dermal:	No sensibilizante

En caso de ingestión: no inducir el vómito. Consultar a un médico llevando el envase o la etiqueta del producto.
Antídoto: no posee antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.
Evitar contaminar fuentes de agua. Mantener una distancia mínima de 20 metros entre el área tratada y cursos o cuerpos de agua.

Riesgos ambientales (éster butílico 100%):

Toxicidad para abejas:	Virtualmente no tóxico
Toxicidad para aves:	Ligeramente no tóxico
Toxicidad para organismos acuáticos:	Moderadamente tóxico

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
ADAMA ESSENTIALS 2,4 D ESTER	ADAMA ARGENTINA SA	36264	EC	100%	II

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.