2,4 D + AMINOPYRALID

Marcas comerciales: PRADO EXTRA.

Nomenclatura Química:
aminopyralid: sal N,N dimetilamina del ácido 4-amino-3,6-dichloropiridin-2-carboxílico
2,4-D: sal dimetilamina del ácido 2,4-diclorfenoxiacético
Clasificación Química: ácido fenoxi-carboxílico + ácido piridincarboxílico.
Acción: sistémica de acción hormonal.

Uso: herbicida.

Cultivo	Maleza	Dosis	Momento de Aplicación
Áreas de Pastura	Senecio (*Senecio grisebachii)*	1,2 - 1,6 l/ha	Para plantas en estado vegetativo.
		2,0 - 2,4 l/ha	Para plantas en estado reproductivo.
	Chilca (Baccharis salicifolia)	2,5 – 3,0	
	Veronica (Vernonia chamaedrys		Para plantas en estado vegetativo.
	Malva (Sida rhombifolia)		
	Rama negra (Erigeron bonariensis)	0,5	Para plantas en estado vegetativo.
		2,0	Para plantas en estado reproductivo.
	Cabra Yuyo (Solanum argentinum)	2,5	Estados inciales de la estación de crecimiento
		3,0	Estados tardíos de la estación de crecimiento.
	Verdolaga (*Portulaca oleracea)*	0,8 l/ha	

Información General:

Es un herbicida sistémico, selectivo de acción hormonal (grupo de auxinas sintéticas) que controla fundamentalmente malezas latifoliadas herbáceas en el mantenimiento de pasturas de gramíneas implantadas y naturales.
Debe ser utilizado en aplicaciones post-emergentes de las malezas.
El herbicida penetra fundamentalmente a través del follaje de las malezas, siendo escasa o nula la cantidad que ingresa a través de las raíces. Posee acción residual.

Restricciones de uso:
Evitar la aplicación del producto en pasturas en estado de plántula, o recién implantadas, por la susceptibilidad que puedan tener éstas al producto. Evitar aplicaciones en suelos encharcados o con estrés en las malezas. Evitar que la deriva de la aplicación alcance a cultivos susceptibles al herbicida. Después de la aplicación se recomienda restringir el ingreso de animales hasta que la pastura recupere su volumen.

NOTA:
Según la resolución 466/19 y su rectificativa 875/19, ambas de SENASA, a partir del mes de mayo de 2021 se prohíbe la comercialización y uso de los productos formulados con ésteres butílicos e isobutílicos de la sustancia activa 2,4-D.
A partir de esa fecha, se producirá la baja automática de dichos productos en el Registro Nacional de Terapéutica Vegetal a cargo de la Dirección de Agroquímicos y Biológicos dependiente de la Dirección Nacional de Protección Vegetal del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.

Derrames:
Contener el líquido derramado con tierra o arena. No usar agua. Evitar la llegada del producto a cursos o cuerpos de agua. Colocar el material de adsorción contaminado en tambores y enviar para su incineración a sitios autorizados. No incinerar a cielo abierto.

Clasificación (modo o sitio de acción): O (HRAC) o 4 (WSSA).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Guantes de nitrilo reforzado, botas de goma, camisa de mangas largas y pantalón largo para cubrir totalmente brazos y piernas, delantal, antiparras y/o protector facial.

Información Toxicológica:

Del producto formulado:

Toxicidad oral aguda (rata):	DL50: 1700 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata):	DL50: > 5000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda(rata):	CL50: 5,03 mg/l
Irritación dermal:	Leve irritante

Irritación ocular: Severo irritante
Sensibilización dermal: No sensibilizante

Riesgos ambientales:
Toxicidad para abejas: Virtualmente no tóxico
Toxicidad para aves: Moderadamente tóxico
Toxicidad para org acuáticos y peces: Prácticamente no tóxico

Evitar contaminar fuentes de agua.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
PRADO EXTRA	CORTEVA AGRISCIENCE ARGENTINA SRL	38957	SC	6,1% + 48,2%	II