SULFENTRAZONE + S-METOLACLORO

Marcas comerciales: CAPAZ ELITE.

Nomenclatura Química:
sulfentrazone: N-[2,4-dicloro-5-[(4-difluorometil)-4,5-dihidro-3-metil-5-oxo-1,2,4-triazol-1-y1]fenil] metanesulfonamida.
S-Metolacloro :(S)-2-cloro-N-(2-etil-6-metil-fenil)-N-(2-metoxi-1-metil-etil)-acetamida
Clasificación Química: triazolinona + cloroacetamida.
Acción: sistémica y residual.

Uso: herbicida (pre-emergente).

Cultivo	Adversidad	Dosis	Momento de Aplicación
Girasol	Bejuco (*Ipomoea spp.)* Bolsa del pastor (*Capsella bursa pastoris)* Borraja o borraja pampeana (*Lycopsis arvensis)* Bowlesia (*Bowlesia incana)* Capín (*Echinochloa crus-galli)* Cardo ruso (*Salsola kali)* Cola de zorro (*Setaria spp.)* Grama carraspera (*Eleusine indica)* Gramilla (*Eragrostis virescens)* Moco de pavo (*Polygonum persicaria)* Morenita (*Kochia scoparia)* Pasto de cuaresma (*Digitaria sanguinalis)* Peludilla (*Gamochaeta subfalcata)* Quínoa, Quínoa blanca (*Chenopodium album)* Sanguinaria (*Polygonum aviculare)* Verdolaga (*Portulaca oleracea)* Vinagrillo (*Oxalis cordobensis)* Yuyo colorado (*Amaranthus hybridus)* Yuyo colorado (*Amaranthus palmeri)*	SUELOS LIVIANOS (Arenosos-francos y francos- arenosos) M.O. 1 a 2% 1.500 cm3/ha SUELOS MEDIANOS (francos y francos-limosos) M.O. 2% 2.000 cm3/ha M.O. mayor 2% 2.500 cm3/ha SUELOS PESADOS M.O. mayor 2% 2.500 cm3/ha	Hasta 10 días antes de la siembra
Soja	Bolsa del pastor (*Capsella bursa pastoris)* Borraja o borraja pampeana (*Lycopsis arvensis)* Capín (*Echinochloa crus-galli)* Cardo ruso (*Salsola kali)* Cola de zorro (*Setaria spp.)* Echinocloa (*Echinochloa colona)* Grama carraspera (*Eleusine indica)* Gramilla (*Eragrostis virescens)* Moco de pavo (*Polygonum persicaria)* Morenita (*Kochia scoparia)* Pasto de cuaresma (*Digitaria sanguinalis)* Peludilla (*Gamochaeta subfalcata)* Quínoa, Quínoa blanca	SUELOS LIVIANOS (Arenosos-francos y francos- arenosos) M.O. 1 a 2% 1.800 cm3/ha SUELOS MEDIANOS (francos y francos-limosos) M.O. 2% 2.000 cm3/ha M.O. mayor 2% 2.500 cm3/ha SUELOS PESADOS M.O. mayor 2% 2.500 cm3/ha	Pre-siembra

	(*Chenopodium album)* Sanguinaria (*Polygonum aviculare)* Verdolaga (*Portulaca oleracea)* Vinagrillo (*Oxalis cordobensis)* Yuyo colorado (*Amaranthus hybridus)* Yuyo colorado (*Amaranthus palmeri)*		
Maní	Bolsa del pastor (*Capsella bursa pastoris)* Capín (*Echinochloa crus-galli)* Cardo ruso (*Salsola kali)* Cola de zorro (*Setaria spp.)* Grama carraspera (*Eleusine indica)* Gramilla (*Eragrostis virescens)* Pasto de cuaresma (*Digitaria sanguinalis)* Quínoa, Quínoa blanca (*Chenopodium album)* Verdolaga (*Portulaca oleracea)* Yuyo colorado (*Amaranthus hybridus)* Yuyo colorado (*Amaranthus palmeri)*	SUELOS LIVIANOS (Arenosos-francos y francos- arenosos) M.O. 1 a 2% 1.500 cm3/ha SUELOS MEDIANOS (francos y francos-limosos) M.O. 2% 2.000 cm3/ha	Hasta 10 días antes de la siembra

Información General:

Herbicida de acción sistémica y residual que combina la acción del sulfentrazone (aril triazolinona) y del S-Metolacloro (cloroacetamida). El sulfentrazone se absorbe por las raíces de las plantas tratadas, y genera un proceso de "disrupción" de membrana, que interfiriere en la biosíntesis de la clorofila y provoca la formación de intermediarios tóxicos. El S-metolacloro es absorbido por el coleóptile y radícula en gramíneas anuales y por hipocótile y radícula en malezas de hoja ancha en germinación. Posee efecto residual sobre malezas aún no germinadas o pequeñas, actúa inhibiendo la división celular a través de la inhibición de la síntesis de ácidos grasos de cadena muy larga.

Preparación:
Verificar el correcto funcionamiento del equipo y su calibración, antes de comenzar la aplicación.
Preparación: llenar el tanque de la pulverizadora hasta las 2/3 de su capacidad con agua y, poniendo en marcha los agitadores, incorporar la cantidad de producto según dosis. Completar el volumen total de agua. Mantener el sistema de agitación en movimiento durante toda la aplicación. Evitar la superposición de franjas y la deriva hacia cultivos linderos.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: el producto debe ser aplicado con pulverizadoras terrestres con una presión de 30 - 45 lb/pulg2, provistas de una barra o botalón con picos para herbicidas. Densidad de gotas recomendada: 20-30 gotas/cm2 con gotas de 300 a 500 micrones. El volumen de aplicación debe ser de 80 - 100 litros de agua.
Limpiar el tanque de la pulverizadora al finalizar toda tarea de aplicación. Luego drenar la pulverizadora hasta vaciarla. Posteriormente llenar el tanque con agua limpia hasta el 10% de su capacidad y circular la solución por todo el sistema durante 15 minutos para luego drenar la pulverizadora y realizar este procese de tres veces. En lo posible remover y limpiar picos y filtros separadamente. Se recomienda el uso de agua para la limpieza de tanque de la pulverizadora. En el caso de utilizar agentes limpiadores (ej: lavandina; solución amoniacal), hacerlo durante el segundo enjuague.

MOMENTO DE APLICACIÓN:
Al momento de la aplicación el lote debe presentarse libre de malezas, el blanco de aplicación de este producto es el suelo.
Para asegurar la incorporación del herbicida a la matriz del suelo y garantizar su efectividad, es necesaria la ocurrencia de precipitaciones de 15-20 mm dentro de los 7 días posteriores a la aplicación del mismo.
En suelos con más de 65% de arena y lluvias torrenciales en un corto periodo de tiempo, el producto puede estar expuesto a lixiviación disminuyendo su capacidad de control

RESTRICCIONES DE USO:
Debido a que el producto se aplica en barbecho, está exento del período de carencia.
Se recomienda dejar transcurrir un mínimo de 4 meses luego de la aplicación del producto para la siembra de cereales de invierno y 6 meses para maíz.
En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.
Tiempo de reingreso al área tratada: 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

El producto es compatible con otros herbicidas de uso corriente. De todos modos se recomienda realizar una prueba de compatibilidad previa, antes de utilizar cualquier tipo de mezcla.

FITOTOXICIDAD:
A las dosis recomendadas no se presenta fitotoxicidad.

Derrames:
Inactivar el producto derramado con cal o soda cáustica y luego recogerlo haciendo uso de un material adsorbente (aserrín de madera, arena, tierra, etc.) el que una vez impregnado deberá disponerse en un lugar seguro y que no contamine el medio ambiente. Seguidamente, proceda a lavar con abundante agua y solución de amoníaco el área contaminada, evitando que el agua del lavado se escurra por las alcantarillas. Recurra a empresas especializadas en eliminación de residuos peligrosos.

Clasificación (modo o sitio de acción): E (HRAC) + K3 (HRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Ventilación: se deben usar extractores en todos los procesos donde se emita vapor o polvo. Se deben ventilar los vehículos de transporte antes de proceder a descargarlos.
Ropa de trabajo:
De acuerdo a las concentraciones encontradas vestir overol o uniformes de mangas largas y cobertura para la cabeza. Para mayores exposiciones, como en el caso de derrames, usar un traje que actúe como barrera total, del tipo impermeable de goma. Todos los artículos de cuero que puedan haber sido contaminados, tal como zapatos, cinturones y correas de relojes, deben ser retirados y destruidos. Se debe lavar toda la ropa de trabajo antes de volver a usarla; esto debe hacerse por separado de la ropa de hogar.
Protección ocular: se debe usar antiparras o una máscara de cara en el caso de exposición a vapor, salpicaduras o polvo.
Protección respiratoria: en caso de exposición a vapor, salpicaduras o polvo, usar como mínimo un respirador-purificador de media cara o cara completa aprobado para pesticidas por una organización de certificación como U.S. NIOSH/MSHA, EU CEN o similar. La selección del respirador debe basarse en las concentraciones encontradas en el aire.
Guantes: usar guantes protectores para productos químicos, confeccionados en materiales del tipo del neopreno, goma de butilo o nitrilo. Debe lavarse cuidadosamente el exterior de los guantes con agua y jabón antes de quitárselos. Se los debe inspeccionar regularmente para detectar rajaduras.
Higiene personal: debe haber disponible agua limpia para lavado en caso de contaminación de piel u ojos. Lavar la piel antes de comer, beber o fumar. Bañarse al finalizar el día de trabajo.

Información Toxicológica:

Toxicidad oral aguda:	DL50: > 3129 mg/kg.
Toxicidad dermal aguda:	DL50: > 5000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda:	CL50: > 2.02 mg /l
Irritación dermal:	Moderado irritante dermal
Irritación ocular:	Moderado irritante ocular.
Sensibilización dermal:	Sensibilizante dermal.

Primeros auxilios:
En todos los casos, procurar asistencia médica y mostrar la etiqueta del producto. Mientras tanto, tomar las siguientes medidas:
Contacto con la piel: quitar la ropa y calzado contaminados. Lavar la piel y cabellos con abundante agua y jabón neutro o agua bicarbonatada (diluir una cucharada sopera de bicarbonato de sodio en un litro de agua).
Contacto ocular: inmediatamente lavar los ojos con suero fisiológico o agua limpia en forma continuada durante por lo menos 15 minutos.
En caso de ingestión: no provocar el vómito. Dar a beber abundante agua. No suministrar leche, aceite ni sustancia grasa alguna. No administrar nada por boca a una persona inconsciente. Procurar atención médica inmediata.
En caso de inhalación: trasladar a la persona afectada al aire libre y fuera del área contaminada. Aflojar las ropas ajustadas (cinturón, cuello) para que pueda respirar sin dificultad. Mantener a la persona quieta y acostada, cuidando que la boca y nariz estén libres de obstáculos. Mantener el cuello en forma extendida para dejar libre el tracto respiratorio.

Riesgos ambientales:

Toxicidad para abejas:	Virtualmente no tóxico.
Toxicidad para aves:	Prácticamente no tóxico.
Toxicidad para peces:	Ligeramente tóxico.

No contaminar fuentes ni cursos de agua.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
CAPAZ ELITE	FMC	39177	EC	10% + 60 % P/V	III