BIXAFEN + PROTHIOCONAZOLE + TRIFLOXISTROBIN

Marcas comerciales: CRIPTON XPRO.

Nomenclatura Química:
Bixafen: N-(3´,4´-dicloro-5-fluoro [1,1´-bifenil]-2-il)- 3-(difluorometil)-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida
prothioconazole: 3H-1,2,4-Triazol-3-thiona, 2-(2-(1-clorociclopropil)-3-(2-clorofenil)-2-hidroxipropil)-1,2-dihidro
trifloxistrobin: metoximino -{2-[1(3-trifluorometil-fenil-)-etilidenamino- oximetil]-fenil}-metil éster del ácido acético
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: pirazol - carboxamida – SDHIs + triazol + estrobilurina.
Acción: sistémica y mesostémica.

Uso: fungicida.

Cultivo	Adversidad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Cebada (***)	Escaldadura (*Rhynchosporium secalis)* Mancha borrosa (*Bipolaris sorokiniana)* Mancha en red (*Drechslera teres)* Ramularia o salpicado necrotico de la cebada (*Ramularia collo-cygnis)* Roya de la hoja (*Puccinia hordei)*	500 a 700 ml/ ha (*)	35	Utilizar la dosis de 500 cc/ha, en aquellos casos en que se presenten condiciones de presiones menores de enfermedades, aplicaciones ante la aparición de los primeros síntomas, cultivares más tolerantes y condiciones climáticas no tan favorables para el desarrollo de las enfermedades. Utilizar la dosis de 600 cc/ ha, en aquellos casos en que se presenten condiciones de presiones intermedias de enfermedades, aplicaciones ante la aparición de los primeros síntomas, cultivares moderadamente susceptibles y condiciones climáticas favorables para el desarrollo de las enfermedades. Utilizar la dosis de 700 cc/ ha, en aquellos casos en que se presenten condiciones de presiones altas de enfermedades, aplicaciones ante la aparición de los primeros síntomas con condiciones de alto potencial de rendimiento, cultivares altamente susceptibles y condiciones climáticas muy favorables para el desarrollo de las enfermedades.
Trigo (**)	Mancha amarilla (*Drechslera tritici-repentis)* Roya amarilla (*Puccinia striiformis)* Roya anaranjada (*Puccinia recondita)* *Roya del tallo (Puccinia graminis)* Septoriosis de la hoja (*Septoria tritici)*			
Maíz (*****)	Roya común (*Puccinia sorghi*) Tizón foliar (*Exserohilum turcicum*)	600 a 700 ml/ ha		El momento de aplicación depende de la aparición de cada una de las enfermedades y la ventana de aplicación en promedio es desde V8 a R1.

(*) Aplicar con 0.3 L/ha de Coadyuvante Optimizer en aplicaciones de caudales entre 100 y 150 litros/ha. En caso de utilizar caudales de aplicación menores, utilizar el Coadyuvante Optimizer a razón del 0,2% en volumen.
(**) Se recomienda aplicar en roya de la hoja a partir de 10% de incidencia y para manchas a partir de 30% de incidencia. Intensificar el monitoreo a partir de encañazon.
(***) No se recomienda aplicar en ausencia de síntomas y se aconseja utilizar el 30% de incidencia foliar a partir de fin de macollaje-encañazon como umbral.
(****) Aplicar con Coadyuvante Optimizer: 0,5 L/ha en aplicaciones aéreas de caudales entre 20 y 25 litros/ ha, y 0,3 L/ha en aplicaciones terrestres de caudales entre 100 y 120 litros/ha.

Información General:

Generalidades: El producto formulado es un fungicida a base de Bixafen, Trifloxistrobin y prothioconazole.

Preparación: Agregar agua al tanque de la máquina pulverizadora hasta aproximadamente la mitad de su capacidad y poner en marcha el sistema de agitación. Incorporar la cantidad requerida del producto al tanque y continuar la agitación, completando el llenado del tanque con agua.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: El producto puede ser aplicado con las pulverizadoras convencionales de bajo volumen ya sean de arrastre o autopropulsadas siempre que estén provistas de un agitador mecánico adecuado o una bomba capaz de producir un exceso de flujo tal, de modo de mantener una remoción constante a través del retorno.
Es importante provocar un buen mojado de las plantas; para ello, se deben lograr aplicar entre 50 y 70 gotas /cm2; utilizando un volumen de agua orientativo que no debe ser menor a 150 litros de agua por hectárea en aplicaciones terrestres.
Es conveniente verificar el correcto funcionamiento del equipo previo a la aplicación y calibrarlo con agua sobre el mismo terreno en que se va a utilizar. Suspender las aplicaciones con vientos superiores a 15 km/h.

Restricciones de uso: No reingresar al área hasta que la aplicación este completamente seca. No aplicar cuando el cultivo esté bajo situaciones de estrés tales como sequía prolongada, baja fertilidad, bajas temperaturas ó heladas, porque el control puede ser deficiente y el cultivo resultará afectado.
No realizar las aplicaciones en las horas de mayor calor del día; tampoco si el follaje se encuentra mojado o existe la posibilidad de una lluvia inminente.
"En caso de que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el periodo de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia".
El presente producto debe ser comercializado y aplicado dando cumplimiento a la/s normativa/s provinciales y municipales correspondientes.
Teniendo en cuenta la tasa de degradación del producto en el suelo, se recomienda rotar el modo de acción de los ingredientes activos.

Compatibilidad: es recomendable realizar pequeñas pruebas de compatibilidad física y biológica previamente a proceder a incorporar las diferentes combinaciones en el tanque del equipo de aplicación.

Fitotoxicidad: El producto no es fitotóxico a las dosis y en las condiciones de aplicación recomendadas.

Derrames:
Recoger el producto previa ligazón con material absorbente (ej: tierra, aserrín, turba, aglutinantes de productos químicos) e introducirlo en recipientes cerrados e identificados para su posterior destrucción.

Clasificación (modo o sitio de acción): 7 (FRAC) + 3 (FRAC) + 11 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Bixafen: N-(3´,4´-dicloro-5-fluoro [1,1´-bifenil]-2-il)- 3-(difluorometil)-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida
prothioconazole: 3H-1,2,4-Triazol-3-thiona, 2-(2-(1-clorociclopropil)-3-(2-clorofenil)-2-hidroxipropil)-1,2-dihidro
trifloxistrobin: metoximino -{2-[1(3-trifluorometil-fenil-)-etilidenamino- oximetil]-fenil}-metil éster del ácido acético.

Información Toxicológica:

Toxicidad oral aguda(rata):	DL50 > 2000 mg/kg para hembras
Toxicidad dermal aguda(rata):	DL50 > 2000 mg/kg peso corporal para ambos sexos
Toxicidad inhalatoria aguda (rata):	CL50 > 2.31 mg/L
Irritación dermal:	No irritante
Irritación ocular:	No irritante
Sensibilización dermal:	Potencial sensibilizante

Riesgos ambientales

Toxicidad para abejas:	Virtualmente no tóxico
Toxicidad para aves:	Prácticamente no tóxico
Toxicidad para peces:	Muy tóxico.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
CRIPTON XPRO	BAYER	39181	SC	12,5% + 17,5% + 15%	III

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.