PIROXASULFONE

Marcas comerciales: ADAMA PARAMER – AKURIA – CHIKARA – CRISEB – MOBARA – PYROXASULFONE – YAMATO TOP – YAMATO WG – ZIDUA

Nomenclatura Química:
piroxasulfone: 3-[[5-(difluorometoxi)-1-metil-3-(trifluorometil)pirazol-4-yl]metilsulfonil]-5,5-dimetil-4H-1,2-oxazole
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: isoxazolina
Acción: sistémica.

Uso: herbicida.

Cultivo	Adversidad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Trigo	Avena (*Avena spp.)* Raigrás (*Lolium spp.)*	PC SC 48%: 180 - 210 cm3/ha PC WG 85%: 100 - 120 g/ha PC WG 85%: 100 g/ha + 100 cm3/ha Flumioxazin 48 % SC a 120 g/ha + 120 cm3/ha Flumioxazin 48% SC (*)(***)	N/C	Previo a la emergencia del cultivo y de las malezas (**)
Cebada				15 días previo a la siembra del cultivo y previo a la emergencia de las malezas (**)
Soja Maiz	Capín (*Echinocloa colonna*) Chloris (*Chloris virgata*) Pasto bandera (*Digitaria insularis*) Pasto cuaresma (*Digitaria sanguinalis*) Pasto morado (*Leptochloa mucronata*) Pie de gallina (*Eleusine indica*) Yuyo colorado (*Amaranthus hybridus; Amaranthus palmeri*)	PC SC 48%: 280 cm3/ha piroxasulfone 48% SC + 120 cm3/ha flumioxazin 48% SC a 355 cm3/ha piroxasulfone 48% SC + 150 cm3/ha flumioxazin 48% SC (*) PC WG 85%: 160 g/ha piroxasulfone 85 % WG + 120 cm3/ha flumioxazin 48 % SC a 200 g/ha piroxasulfone 85 % WG + 150 cm3/ha flumioxazin 48 % SC (*)		Aplicar 15 días previo a la siembra del cultivo y previo a la emergencia de las malezas (**)

(*) La dosis mayor debería aplicarse en el caso de alta presión de maleza debido a la presencia de gran cantidad de semillas en el banco de semillas de suelo o cuando se quiera prolongar el período de acción residual del producto.
(**) Piroxasulfone 48% SC y 85% WG requiere de una lluvia de, al menos, 20 mm dentro de los 15 días posteriores a la aplicación para ser activado.
(***) Recomendación SUMMIT AGRO ARGENTINA SA

Información General:

Es un herbicida pre-emergente para el control de malezas gramíneas y de hoja ancha, incluidas las que presentan resistencia a inhibidores de ALS, inhibidores de ACCasa y glifosato que infestan los cultivos de trigo, cebada, soja y maíz.
Requiere de una lluvia de, al menos, 20 mm dentro de los 15 días posteriores a la aplicación para ser activado. Los períodos de sequía posteriores a la aplicación del producto resultan en una disminución de la eficacia.

Modo de acción:
Piroxasulfone forma parte de la familia de las isoxazolinas, actúa sobre la síntesis de ácidos grasos de cadena larga (VLCFAs) inhibiendo la división celular. Controla la germinación impidiendo la división celular de la raíz. Las malezas mueren antes de emerger o bien inmediatamente después de salir a la superficie. Su residualidad en el suelo depende de las características del mismo y de las condiciones climáticas, y las labores realizadas en el cultivo.

Instrucciones para el Uso:
Preparación
PC SC 48%:
Agitar el envase antes de usar. Cargar con agua el tanque de la pulverizadora hasta la mitad de su capacidad. Luego poner el agitador en marcha y agregar la cantidad requerida calculada según el cuadro de dosis. Finalmente completar la carga de agua en el tanque, y continuar agitando hasta lograr la homogeneización del caldo. Mantener el agitador y retorno en marcha durante toda la tarea de aplicación.

PC WG 85%:
Realizar una dilución previa del producto antes de agregarlo al tanque de la pulverizadora.
Llenar el tanque de la máquina pulverizadora hasta la mitad de agua agregando la pre-dilución del producto. Luego con los agitadores en movimiento, agregar la cantidad necesaria de flumioxazin 48 SC, si estuviera recomendado, y completar el faltante del tanque con agua. En caso de utilizar aceites emulsionables, minerales o vegetales, adicionarlos al tanque del pulverizador en último lugar.

Equipos, Volúmenes y Técnicas de Aplicación
Aplicar con equipos terrestres o aéreos respetando los siguientes parámetros en cuanto a calidad de aplicación:
Volumen de aplicación para equipos terrestres: 80-100 l/ha
Cobertura: 30 – 40 gotas /cm2
Tamaño de gota: 200 – 400 micrones
Uniformidad: 20-30 % Coeficiente de Variación

NO APLICAR EN CONDICIONES DE ALTA TEMPERATURA (>30ºC), BAJA HUMEDAD RELATIVA (>50%) Y/O VIENTOS FUERTES (>15 KM/H).

Limpieza de la pulverizadora (PC SC 48%):
Es importante limpiar el equipo utilizado inmediatamente luego de la aplicación. Las siguientes recomendaciones deben respetarse en forma estricta: vaciar completamente el equipo. Enjuagar el tanque, mangueras y picos con agua limpia (en caso de utilizar agentes limpiadores, hacerlo siguiendo las indicaciones de su respectiva etiqueta). De ser posible, utilizar una lavadora a presión con agua para limpiar el interior del tanque. Poner en marcha el sistema de agitación y hacer recircular el agua por al menos 15 minutos. Todos los remanentes visibles deben ser eliminados del equipo de aplicación. Retirar los picos y pastillas y lavarlos separadamente, después de realizar los pasos precedentes. Eliminar el líquido utilizado en sitios donde no exista riesgo de contaminación de aguas superficiales ni subterráneas.

Instrucciones para la limpieza de equipos de pulverización (PC WG 85%):
El equipo pulverizador debe encontrarse limpio, sin residuos de productos anteriormente utilizados.
Utilizar un detergente o producto de limpieza recomendado para equipos pulverizadores, siguiendo las recomendaciones del fabricante. Debe hacerse un triple lavado de la totalidad el equipo luego de la aplicación de piroxasulfone 85% WG.
Si luego de la aplicación de piroxasulfone 85% WG está prevista la utilización del equipo para realizar pulverizaciones foliares selectivas (post emergencia), independientemente del cultivo y/o producto que se utilice, debe procurarse una completa limpieza del equipo.

Procedimiento para la limpieza de equipos de pulverización:
Vacíe completamente el tanque y enjuague a fondo el equipo, incluyendo el interior y el exterior del tanque, mangueras, boquillas y filtros. Llene el tanque con agua limpia y añada amoniaco común. Use un litro de amoníaco al 3% por cada 100 litros de agua. Déjelo circular por el equipo durante 5 minutos. Luego enjuague todas las mangueras, tuberías, filtros y boquillas durante 15 minutos como mínimo. Afloje los diafragmas antes de vaciar el equipo de aspersión para que la solución limpiadora pase por el diafragma abierto. Remueva todos los filtros y boquillas y enjuáguelas en agua limpia. Nunca deje producto (caldo) en la pulverizadora, si el mismo no va a ser utilizado en las próximas horas.

Tratamiento de remanentes y caldos de aplicación:
A fin de evitar tener caldo remanente, deberá calcular la cantidad justa de producto a utilizar para la superficie a tratar. En caso de sobrar no se debe eliminar en cursos de agua (canales, acequias, arroyos, etc). Los envases deben ser Triple Lavados o Lavados a Presión, inutilizados por perforación o compactación, y posteriormente entregar los envases en un "Centro de Almacenamiento Transitorio". Los envases luego serán eliminados mediante empresas habilitadas para tal fin. Seguir normas locales, asegurando no contaminar el ambiente.

Restricciones de Uso:
Periodo de carencia: No se establece período de carencia por su uso posicionado como herbicida.

La aplicación debe realizarse siempre previo a la emergencia de malezas. En caso de haber malezas nacidas se recomienda realizar una aplicación con un herbicida post-emergente para controlarlas. Luego, con el lote sin cobertura verde puede realizarse la aplicación bajo las condiciones recomendadas.
Para aplicaciones en trigo bajo sistema de labranza convencional la aplicación debe realizarse 15 días antes de la siembra.

Tiempo de reingreso al área tratada: 24 horas después de la aplicación. Corroborar que el producto se haya secado en la superficie de aplicación.(*) 12 horas (**)

En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia

(*) Productos de SUMMIT AGRO
(**) Producto de BASF

Compatibilidad: es compatible con otros herbicidas. No obstante, debido a la gran variedad de formulaciones de los productos fitosanitarios, se recomienda realizar previamente una prueba de compatibilidad física a pequeña escala. Antes de realizar una mezcla consulte con un ingeniero agrónomo.

Fitotoxicidad: no se ha observado a las dosis recomendadas.

Derrames:
Aislar el área y negar la entrada a personas que no sean necesarias, manteniéndolas fuera. Utilizar los elementos de protección personal recomendados para este producto. Evitar que el producto alcance corrientes o fuentes de agua. Hacer endicamientos de manera de confinar el derrame y proceder a adsorberlo con una sustancia adsorbente no combustible, como arcilla, arena o tierra. Recoger los desperdicios en un tambor e identificarlo adecuadamente para su disposición final.
Recurra a empresas especializadas en disposición final de residuos peligrosos.

Clasificación (modo o sitio de acción): 2 (HRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Carga del equipo: usar protector facial, guantes de nitrilo, camisa de mangas largas, pantalones largos y botas de goma.
Aplicación: usar guantes de nitrilo, botas de goma, camisa de mangas largas y pantalones largos con delantal descartable.

Información Toxicológica:

PC SC 48%:
Toxicidad oral aguda (rata): DL50 > 5000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata): DL50 > 5000 mg/ kg
Toxicidad inhalatoria aguda: CL50 > 2,01 mg/l

Irritación dermal: No irritante
Irritación ocular: Leve irritante
Sensibilización dermal: No sensibilizante

PC WG 85%:
Toxicidad oral aguda (rata): DL50 > 2000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata): DL50 > 2000 mg/ kg
Toxicidad inhalatoria aguda: CL50 > 5,8 mg/l

Irritación dermal: Leve irritante
Irritación ocular: Moderado irritante
Sensibilización dermal: No sensibilizante

Riesgos ambientales:
Virtualmente no tóxico para abejas.
Prácticamente no tóxico para aves.
Prácticamente no tóxico para peces y organismos acuáticos.
No verter producto ni lavar envases en cursos de agua naturales ni artificiales. Dejar una distancia desde la aplicación hasta un curso de agua de 5 metros.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
ADAMA PARAMER	ADAMA ARGENTINA SA	41649	WG	85%	III
AKURIA	SUMMIT AGRO ARGENTINA SA	41201	SC	48%	IV
CHIKARA	SUMMIT AGRO ARGENTINA SA	40794	SC	48%	IV
CRISEB	SUMMIT AGRO ARGENTINA SA	41256	SC	48%	IV
MOBARA	SUMMIT AGRO ARGENTINA SA	41268	SC	48%	IV
PYROXASULFONE	SUMMIT AGRO ARGENTINA SA	41564	SC	48%	IV
YAMATO TOP	SUMMIT AGRO ARGENTINA SA	40658	SC	48%	IV
YAMATO WG	SUMMIT AGRO ARGENTINA SA	40926	WG	85%	III
ZIDUA	BASF ARGENTINA	39490	WG	85%	III

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.