AMINOPYRALID + CLOPYRALID

Marcas comerciales: SENDERO

Nomenclatura Química:
aminopyralid: sal N,N dimetilamina del ácido 4-amino-3,6-dichloropiridin-2-carboxilico.
clopyralid-olamina: 3,6-dicloro-2-ácido piridinecarboxilico compuesto con 2-aminoetanol.
Clasificación Química: ácido carboxílico + ácido piridincarboxílico
Acción: sistémica.

Recomendaciones de Uso: herbicida.

Cultivo	Adverdsidad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Pasturas de gramíneas y Pastizales naturales	Aromita *(Acacia caven)*	2,0 - 2,5 l/ha 1,0 (*)	7	
	Viñal *(Prosopis ruscifolia)*	3,0 l/ha 1,5 - 2,0(*) (**)		

* Dosis recomendada para aplicación con mochila (%)
** 2,0%: mezclar 2,0 litros de producto en 98 litros de agua. Dosis recomendada para aplicación con mochila (%)
Importante: Adicionar al caldo Aceite Metilado de Soja a dosis de 0,5-1,0 litros en 100 litros de agua (equivalente a 0,5 - 1 % v/v de caldo), para posibilitar su mejor distribución sobre la superficie foliar, mejor absorción y mejor penetración del producto en las malezas.

Informacion general:
Herbicida sistémico de acción hormonal para el control de renovales de vinal y aromita en mantenimiento de pasturas de gramíneas y pastizales naturales.

Preparación:
1) Llenar el tanque del equipo pulverizador con agua limpia hasta la mitad de su capacidad. Se debe tener en cuenta que el agua a utilizar debe estar limpia y su dureza debe haber sido previamente corregida con adyuvantes que no modifiquen el pH de la misma.
2) Agregar el herbicida Sendero, haciendo funcionar el sistema de retorno.
3) Completar el llenado del tanque con agua.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:
Método de aplicación:
a) Aplicación foliar dirigida:
Aplicar el producto directamente sobre las hojas de la maleza, cubriendo la planta en su totalidad hasta llegar al punto de escurrimiento.
b) Aplicación foliar en área total:
Utilizar equipamientos de pulverización tanto tractorizados (de turbina de flujo de aire o de barra) como aéreos, aplicando el caldo sobre el follaje de las malezas de manera uniforme.
- Pulverizadores de barra:
Usar picos tipo abanico XT10 o XT20
Presión: 30 a 45 libras /pulg2
Volumen: 120 a 300 litros/ha. (según tamaño del renoval e historia de intervenciones mecánicas: a mayor tamaño y/o ramificaciones, mayor volumen)
DVM: cercano a 400 micrones
- Aplicación aérea:
Utilizar boquillas para apliación aérea tipo CP.
Presión: 30-40 libras /pulg2
Volumen: 30 - 50 litros/ha dependiendo de la altura de vuelo, tipo y densidad de malezas.
DVM: cercano a 400 micrones.

Momento de aplicación:
La aplicación de Sendero debe ser realizada cuando las plantas estén en activo crecimiento y con abundante follaje, evitando situaciones de estrés (hídrico, por insectos o por excesivo calor).

Restricciones de uso:

Período de carencia: 7 días.

- Evitar la aplicación y/o deriva del producto sobre cultivos sensibles como algodón, tomate, batata, girasol, alfalfa, poroto, soja, eucalipto, hortalizas, flores y otras especies útiles sensibles a herbicidas hormonales.
- En caso de utilizar Sendero en área total, evitar la siembra de especies sensibles al producto hasta transcurridos 3 años después de la última aplicación del mismo. Si se quisiera sembrar una especie sensible antes del periodo indicado, siga los siguientes pasos: siembre hileras cortas de la especie sensible que se pretende sembrar, siguiendo la dirección de la aplicación y de manera tal que se muestreen todas las condiciones del lote. Observe si el cultivo de prueba presenta síntomas de actividad herbicida. Si no presenta síntomas, el cultivo de prueba puede ser sembrado. Si hay rastros aparentes de actividad herbicida, espere una año más antes de repetir el ensayo y siembre un cultivo no sensible
- De existir plantas tóxicas para el ganado en el lote a tratar, impedir el ingreso de la hacienda a dicho lote hasta que la oferta de forraje se haya reestablecido. Dichas plantas tóxicas pueden tornarse más atractivas para los herbívoros en los días posteriores a ser tratadas con herbicidas hormonales
- No utilizar el equipamiento empleado para aplicar Sendero en aplicaciones sobre cultivos sensibles sin antes haberlo lavado adecuadamente.
- No utilizar estiércol de animales que hayan pastado en área tratada con el producto después del tratamiento de área total, para abonar plantas o cultivos útiles sensibles al producto.
- No mover animales desde áreas tratadas (o consumiendo forraje tratado) a áreas con especies latifoliadas sensibles sin antes dejarlos consumir por un mínimo de 3 días un recurso forrajero no tratado.
- Se sugiere pastorear el lote previo al tratamiento, a los fines de facilitar la llegada de producto a las hojas inferiores del renoval de vinal durante la aspersión

Compatibilidad:
No se conocen casos de incompatibilidad con el producto. En caso de mezclar con otros productos verificar que los mismos estén autorizados para ese uso particular. En caso de desconocer o tener dudas sobre el comportamiento físico, sobre la efectividad agronómica o sobre la fitotoxicidad de la mezcla, consultar al equipo técnico de DAS.

Fitotoxicidad:
Sendero no es fitotóxico para las pasturas de gramíneas puras si se aplica de acuerdo con las recomendaciones de uso de la etiqueta

Derrames:
Contener el líquido derramado con algún material adsorbente inerte (tierra o arena). No usar agua. Evitar la llegada del producto a cursos o cuerpos de agua. Colocar el material de adsorción contaminado en tambores y enviar para su incineración a sitios autorizados. No incinerar a cielo abierto.

Clasificación (modo o sitio de acción): O (HRAC) o 4 (WSSA) + O (HRAC) o 4 (WSSA).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Se recomienda usar guantes de nitrilo reforzado, botas de goma, camisa de mangas largas y pantalón largo para cubrir totalmente brazos y piernas, delantal, antiparras y/o protector facial.

Información Toxicológica:

Toxicidad oral aguda (rata): DL50 > 5000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata): DL50 > 5000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda: CL50 > 5,1 mg/l

Irritación dermal: Leve irritante dermal.
Irritación ocular: Leve irritante ocular.
Sensibilización dermal: No sensibilizante.

Riesgos ambientales: Prácticamente no tóxico para aves. Prácticamente no tóxico para peces. Virtualmente no tóxico para abejas.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
SENDERO	CORTEVA AGRISCIENCE ARGENTINA SRL	39228	SL	7,1% + 36.3%	IV