ACEITE DE ÁRBOL DEL TÉ + DIFENOCONAZOLE

Marcas comerciales: STK REGEV S

Nomenclatura Química:
aceite de árbol del té: extracto de Melaleuca alternifolia
difenoconazole: 3-chloro-4-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-2-yl]phenyl 4-chlorophenyl ether
Clasificación Química: triazol.
Acción: sistémica y traslaminar.

Uso: fungicida (preventiva, curativa y supresiva).

Cultivo	Adversidad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Maní	Viruela tardía del maní (Cercosporidium personatum) Viruela temprana del maní (Cercospora arachidicola)	300 cm3/ha + 500 cm3/ha de coadyuvante sucroglicérido 80% (*)	30	Aplicar con la aparición de los primeros síntomas. Repetir cada 15 a 21 días, hasta un máximo de 2 aplicaciones por campaña.

(*) Se recomienda el uso de un coadyuvante para mejorar la aplicación y evitar la evaporación de la gota.

Información General:

STK REGEV S es un fungicida compuesto por aceite del árbol del té y difenoconazole (del grupo de los triazoles).
El aceite del árbol del té posee actividad preventiva (por inhibir la germinación de las esporas), curativa (por controlar el crecimiento del micelio impidiendo el desarrollo y la expansión de las lesiones) y supresiva (por eliminar las colonias ya instaladas). Su actividad terapéutica se manifiesta principalmente sobre las membranas, paredes celulares y mitocondrias generando la expansión de las membranas e incrementando su fluidez, desregulando la capacidad selectiva de permeabilidad e inhibiendo la respiración.
El difenoconazole es un fungicida sistémico residual que provee acción preventiva duradera y acción curativa contra las enfermedades indicadas en esta etiqueta. Posee propiedades sistémicas locales y gran capacidad traslaminar, y actúa inhibiendo la biosíntesis del ergosterol del hongo parásito impidiendo su multiplicación.

INSTRUCCIONES PARA EL USO:
Preparación:
Concentrado emulsionable en agua. Para una correcta preparación respetar las siguientes instrucciones:
-Agregar agua al tanque de la pulverizadora hasta la mitad de su volumen.
-Poner en funcionamiento el sistema de agitación.
-Agregar la cantidad necesaria de formulado, de acuerdo a la calibración realizada, directamente en el tanque y sin disolución previa.
-Verificar que el producto se emulsione correctamente.
-Terminar de llenar el tanque con agua, hasta el volumen final.
-Verificar que el sistema de agitación funcione en todo momento.
-Usar el producto dentro de las 24 horas de haber realizado la mezcla de tanque, ya que la efectividad puede reducirse debido a la degradación del producto.
-Agitar nuevamente el caldo antes de reanudar la aplicación.
-Utilizar siempre agua limpia.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:
Debe ser aplicado en el cultivo en el volumen necesario para cubrir uniforme y satisfactoriamente el área a tratar. Se deben lograr al menos 50 gotas/cm2 sobre las hojas del cultivo a proteger.
Aplicaciones terrestres:
En maní utilizar un volumen de 150 l/ha con picos de cono hueco preferiblemente y una presión de 60 – 80 lb/pulg^2.
Aplicaciones aéreas:
Utilizar un volumen de aplicación mínimo de 20 l/ha. No aplicar con humedad relativa menor al 60 % y altas velocidades de viento.
Antes de iniciar cualquier tratamiento, es imprescindible verificar el correcto calibrado del equipo y el buen funcionamiento de picos (filtros y pastillas), reemplazando las partes defectuosas. Mantener el sistema de agitación en movimiento en todo momento. Evitar la superposición de franjas durante la pulverización. Evitar la deriva hacia cultivos linderos. No realizar aplicaciones con altas temperaturas, baja humedad, vientos fuertes, presencia de rocío o ante probabilidades de lluvia. Suspender las aplicaciones con vientos superiores a los 10 km/h. Aplicar lejos de manantiales, cursos o fuentes de agua.

RESTRICCIONES DE USO
No realizar aplicaciones con altas temperaturas, baja humedad, vientos fuertes, presencia de rocío o ante probabilidades de lluvia. Suspender las aplicaciones con vientos superiores a los 10 km/hora.
Se recomienda que la aplicación se realice a la aparición de los primeros síntomas de enfermedad, para evitar que el progreso del patógeno cause daños importantes sobre el rendimiento.

En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.
Tiempo de reingreso al área tratada: hasta que el producto se haya secado en la superficie de las hojas.

COMPATIBILIDAD:
Este producto se utiliza sólo. Antes de utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos.

FITOTOXICIDAD

No ha manifestado síntomas de fitotoxicidad en los cultivos registrados, siguiendo las dosis y recomendaciones que figuran en esta etiqueta.

Tratamiento de remanentes y caldos de aplicación:
A fin de evitar tener caldo remanente, deberá calcular la cantidad justa de producto a utilizar para la superficie a tratar. En caso de sobrar no se debe eliminar en cursos de agua (canales, acequias, arroyos, etc). Se deberán eliminar sobre alambrados y caminos internos a una mayor dilución.
Los envases deben ser Triple Lavados o Lavados a Presión, inutilizados por perforación o compactación, y posteriormente entregar los envases en un "Centro de Almacenamiento Transitorio". Los envases luego serán eliminados mediante empresas habilitadas para tal fin. Seguir normas locales, asegurando no contaminar el ambiente.

Derrames:
Aislar el área y negar la entrada a personas que no sean necesarias, manteniéndolas fuera. Utilizar los elementos de protección personal recomendados para este producto. Evitar que el producto alcance corrientes o fuentes de agua. Hacer endicamientos de manera de confinar el derrame y proceder a adsorberlo con una sustancia adsorbente no combustible, como arcilla, arena o tierra. Recoger los desperdicios en un tambor e identificarlo adecuadamente para su disposición final.
Recurra a empresas especializadas en disposición final de residuos peligrosos.

Clasificación (modo o sitio de acción): 3 (FRAC) + 46 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Carga del equipo: usar protector facial, guantes de nitrilo, camisa de mangas largas, pantalones largos y botas de goma.
Aplicación: usar guantes de nitrilo, botas de goma, camisa de mangas largas y pantalones largos con delantal descartable.

Información Toxicológica:

Del producto formulado 40% + 20%

Toxicidad oral aguda (rata): DL50 > 3129 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata): DL50 > 5000 mg/ kg
Toxicidad inhalatoria aguda: CL50 > 1,09 mg/l

Irritación dermal: No irritante
Irritación ocular: Moderado irritante
Sensibilización dermal: No sensibilizante

Riesgos ambientales:
Aves: Prácticamente no tóxico.
Abejas: Virtualmente no tóxico.
Peces y organismos acuáticos: Moderadamente tóxico.
No aplicar con fuertes vientos para evitar la deriva a fuentes de agua. No aplicar directamente donde exista agua en la superficie. En aplicaciones (aéreas/terrestres) dejar una franja de seguridad de 50 metros. Asperjar el agua de lavado remanente sobre campo arado o camino de tierra.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
STK REGEV S	SUMMIT AGRO ARGENTINA SA	40005	EC	40% + 20%	III