AMINOPYRALID + TRICLOPYR BUTOEXIL ÉSTER

Marcas comerciales: TOCON XTRA

Nomenclatura Química:
aminopyralid: ácido 4-amino-3,6-dichloropiridin-2-carboxilico.
triclopyr butoexil éster: 2-butoxietil 3,5,6-tricoloro-2-piridil oxiacetato.
Clasificación Química: ácido carboxílico + ácido piridincarboxílico
Acción: selectivo.

Uso:

Cultivo	Adveridad	Dosis	Momento de Aplicación
Área de Pastura	Acacia negra (*Gleditsia triacanthos*) Chañar (*Geoffroea decorticans*) Ñandubay (*Prosopis affinis var. ñandubay*) Tusca (*Acacia aroma*) Vinal (*Prosopis ruscifolia*)	1,5 l /98,5 l de agua (equivalente al 1,5%) (*)	Toconeo
		150 cm3 / 9,85 litros de agua (equivalente al 1,5%) (**)	
	Eucaliptos (*Eucalyptus saligna*)	2-3 l /98-97 l de agua (equivalente al 2-3 % v/v) (*)	
		200 - 300 cm3 / 9.8 litros de agua. (equivalente al 2- 3 % v/v) (**)	
	Palo blanco, romerillo (*Aloysia gratissima*)	2 litros / 98 l de agua (equivalente al 2 % v/v) (*)	
		200 cm3 / 9,8 litros de agua (equivalente al 2% v/v) (**)	
	Aromita (*Acacia cavens*) Chañar (*Geoffroea decorticans*) Tusca (*Acacia aroma*)	1,5 l / 98,5 de diesel (equivalente al 1,5%) (*)	Basal
		150 cm3 / 9,85 litros de diesel (equivalente al 1,5%) (**)	

Eventualmente, un repaso podrá ser necesario en áreas de malezas muy resistentes.
(*) Dosis recomendada cada 100 litros de caldo.
(**) Dosis recomendada para una mochila de 10 litros de capacidad.

Información General:
Herbicida selectivo, destinado al control de malezas dicotiledóneas de porte leñoso y semi-leñoso, en áreas de pasturas, específico para aplicaciones al tocón (inmediatamente después del corte de la planta) y basal (a la base del tronco o tallo). El producto incluye un colorante que permite reconocer los tocones tratados.

Instrucciones para el uso
Preparación para aplicación al tocón:
Cargar con agua limpia el tanque de la mochila de aplicación hasta la mitad de su capacidad.
Para una mochila de 10 litros de capacidad, agregar 150 cm3 de (dosis equivalente al 1,5 %).

Completar con agua hasta el volumen total y mezclar bien**.**

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:
Utilizar pulverizador costal manual con pico tipo cónico (retirando la pieza interna).

Método de aplicación:

Aplicación en tocón: cortar la maleza leñosa con hacha, machete o motosierra a 10-20 cm del suelo. Pulverizar el tocón (porción inferior del tallo una vez cortado), cualquiera sea su diámetro, inmediatamente después del corte en la zona contigua a la corteza en todo el perímetro del tocón. Efectuar un buen mojado de la parte superior y de la corteza del tocón.
a) Corte de las malezas:
- Cortar con motosierra, hacha o machete la planta a ser controlada lo más próximo posible al suelo.
- En plantas con cortes anteriores, hacer un nuevo corte debajo del anterior, evitando el tejido muerto, asegurar siempre que todos los tallos estén tratados. .
- En tallos muy gruesos, rajar en cruz el tocón cortado, para una mejor absorción del producto.

b) Aplicación:

Aplicar el producto inmediatamente después del corte, mojando bien todo el tocón incluyendo la corteza, hasta llegar al punto de escurrimiento.
Para realizar una aplicación más eficiente, se recomienda:
- Hacer el trabajo en parejas, un hombre cortando las plantas, y otro aplicando el producto inmediatamente por detrás.
- Acercar el pico del pulverizador costal lo más próximo posible al tocón.
- No dar mucha presión al equipamiento costal, evitando desperdicio de producto.

c) Otras orientaciones:
- Plantas con tallos muy finos (menos de 3 cm de diámetro)
  Cortar la planta y pulverizar sobre el tocón hasta punto de escurrimiento. Acercar el pico del pulverizador hasta el cuello de la planta y mojar esta región y el suelo alrededor del tocón para que el producto entre en contacto con las raíces.

- Áreas donde se tuvo fuego y las plantas están secas:
  Esperar un nuevo rebrote de hojas, cortar y después aplicar Tocon Extra. En áreas ya tratadas con Tocon Extra evitar utilizar fuego por 30 días como mínimo.

- Áreas encharcadas en ciertos periodos del año:
  Esperar a que baje el agua para efectuar el tratamiento (periodo más seco del año).

Aplicación basal: pulverizar el tallo, rociando todo su perímetro desde el suelo hasta 30-40 cm de altura. Se recomienda este tipo de aplicación mientras el tallo tenga un diámetro menor o igual a 15 cm, y en especies que presenten corteza lisa (evitando especies de corteza rugosa).

Número de gotas: aplicar 50-70 gotas /cm2

Manejo del área antes de la aplicación:
Si la gramínea forrajera está muy alta en la época de aplicación, permitir al ganado consumir la pastura hasta que el remanente de esta permita la correcta visualización de las plantas leñosas a ser tratadas.

Manejo después de la aplicación:
Si la gramínea forrajera está muy pastoreada (baja) o degradada, dejar descansar la pastura por 60 a 90 días para facilitar así su recuperación.

Momento de aplicación:
Puede ser aplicado en cualquier época del año, ya que se aplica directamente en la planta cortada. No se recomiendan las aplicaciones en momentos de sequía o encharcamiento.

Restricciones de uso:
Cultivos sensibles: son sensibles a este herbicida los cultivos de hoja ancha como: algodón, tomate, batata, poroto, soja, girasol, pasturas de leguminosas, alfalfa, eucaliptus, hortalizas, flores y otras especies sensibles a herbicidas hormonales.
Evitar que el producto sea aplicado o que la deriva de la aplicación alcance a cultivos susceptibles al herbicida.
Período de carencia: no corresponde debido a que se realizan aplicaciones dirigidas a la maleza.

Compatibilidad: dadas las características especiales de la aplicación de, en caso de necesitar mezclar con otros productos fitosanitarios, se sugiere una mezcla de prueba, previa consulta a Corteva Agriscience Argentina S.R.L.

Período de carencia: no corresponde debido a que se realizan aplicaciones dirigidas a la maleza.

Fitotoxicidad:
No ocasiona daños a los cultivos en los que se recomienda su uso, si se aplica de acuerdo con las recomendaciones de la etiqueta.

Derrames:
Contener el líquido derramado con tierra o arena. No usar agua. Evitar la llegada del producto a cursos o cuerpos de agua. Colocar el material de adsorción contaminado en tambores y enviar para su incineración a sitios autorizados. No incinerar a cielo abierto.

Clasificación (modo o sitio de acción): O (HRAC) o 4 (WSSA).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Se recomienda usar guantes de nitrilo reforzado, botas de goma, camisa de mangas largas y pantalón largo para cubrir totalmente brazos y piernas, delantal, antiparras y/o protector facial.

Información Toxicológica:

Toxicidad oral aguda (rata): DL50 = 760 (434,3 - 1550) mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata): DL50: > 2000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria hembras: CL50 > 5,53 mg/l
Toxicidad inhalatoria machos: CL50 > 4,15 mg/l

Irritación dermal: Leve irritante dermal.
Irritación ocular: Severo irritante ocular.
Sensibilización dermal: No sensibilizante.

Riesgos ambientales:
Toxicidad para aves: Ligeramente tóxico
Toxicidad para peces: Moderadamente tóxico
Toxicidad para abejas: Virtualmente no tóxico

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
TOCON EXTRA	CORTEVA AGRISCIENCE ARGENTINA SRL	39321	EC	4% + 16,7%	II