AMISULBROM

Marcas comerciales: LEIMAY

Nomenclatura Química:
amisulbrom: 3-[(3-bromo-6-fluoro-2-metil-1H-indol-1-yl)sulfonil]-N,N-dimetil-1H-1,2,4-triazol-1-sulfonamida
Clasificación Química: sulfonamida.
Acción: de contacto, translaminar.

Uso: fungicida (acción preventiva y antiesporulante).

Cultivo	Adversidad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Papa	*Tizón tardío de la papa (Phytophthora infestans)*	500 cm3/ha	30	Realizar aplicaciones preventivas antes de la aparición de la enfermedad, o al iniciar el riego; repitiendo el tratamiento cada 7-10 días mientras las condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad persistan (*).

(*) No realizar más de 6 aplicaciones por ciclo de cultivo.

Información General:

LEIMAY es una sustancia fungicida con acción preventiva y antiesporulante sobre Oomicetos, con excelente control sobre diversas enfermedades del grupo de los mildius.
Pertenece a la familia química de las sulfonamidas (inhibidores de la cadena respiratoria mitocondrial-QII)
El efecto protector de LEIMAY se produce sobre diferentes puntos del ciclo del hongo, inhibiendo la formación de zoosporas, su germinación, liberación y movilidad, así como la germinación de citosporas y el crecimiento de la hifa.
La sustancia activa amisulbrom ha demostrado ser eficaz en la inhibición de la germinación de zooesporas y zooesporangios incluso a concentraciones muy bajas, lo que confiere una excelente persistencia a lo largo del tiempo. Además, su fijación a las ceras cuticulares le proporciona una elevada resistencia al lavado por lluvia.
Una vez aplicado sobre la superficie vegetal, el producto queda retenido en la cutícula y por tanto resiste al lavado por lluvia.
En condiciones de humedad, las esporas del hongo se activan, al mismo tiempo que el producto adsorbido en la cutícula se libera y ejerce su acción preventiva.
Ha demostrado una excelente eficacia en aplicaciones preventivas en papa, tanto en la protección de hojas como de frutos y tubérculos. Ha demostrado tener una excelente actividad protectora, que permite mantener la eficacia entre dos aplicaciones consecutivas.
Posee un cierto efecto translaminar lo que permite obtener una buena eficacia incluso en aplicaciones irregulares.
Gracias a su efecto antiesporulante, inhibe las infecciones secundarias que puedan producirse en el campo.

INSTRUCCIONES PARA EL USO:
PREPARACIÓN:
Suspender la dosis indicada en agua, agitar hasta obtener una suspensión homogénea, agregarla al tanque del equipo lleno con agua hasta la mitad de su capacidad, completar con agua el volumen total a pulverizar agitando continuamente.

EQUIPOS, VOLÚMENES Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN:
El volumen de aplicación debe ser 30-40 litros/ha en aplicaciones aéreas y 100-150 litros/ha en aplicaciones terrestres, en este último caso utilizar preferentemente pastillas tipo cono hueco con una presión de 3 bares.
No aplicar con vientos superiores a 10 km/h. Se deben lograr al menos 50 impactos por cm2 con gotas de 200 a 250 micrones.

RESTRICCIONES DE USO
No se recomienda hacer tratamientos a menos de 10 metros de distancia de cursos de agua.
No se recomienda la aplicación sobre suelos ácidos.
No se recomienda la realización de aplicaciones aéreas
En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

COMPATIBILIDAD:
No muestra resistencia cruzada contra las distintas familias de fungicidas actualmente utilizados para el control del tizón tardío (y otros mildius).

FITOTOXICIDAD
No se producen casos de fitotoxicidad a las dosis recomendadas. No se producen efectos sobre los cultivos subsiguientes.

Tratamiento de remanentes y caldos de aplicación:
A fin de evitar tener caldo remanente, deberá calcular la cantidad justa de producto a utilizar para la superficie a tratar. En caso de sobrar no se debe eliminar en cursos de agua (canales, acequias, arroyos, etc). Se deberán eliminar sobre alambrados y caminos internos a una mayor dilución, lejos de la circulación de personas y animales.
Los envases deben ser Triple Lavados o Lavados a Presión, inutilizados por perforación o compactación, y posteriormente entregar los envases en un "Centro de Almacenamiento Transitorio". Los envases luego serán eliminados mediante empresas habilitadas para tal fin. Seguir normas locales, asegurando no contaminar el ambiente.

Derrames:
Aislar el área y negar la entrada a personas que no sean necesarias, manteniéndolas fuera. Utilizar los elementos de protección personal recomendados para este producto. Evitar que el producto alcance corrientes o fuentes de agua. Hacer endicamientos

de manera de confinar el derrame y proceder a adsorberlo con una sustancia adsorbente no combustible, como arcilla, arena o tierra. Recoger los desperdicios en un tambor e identificarlo adecuadamente para su disposición final.
Recurra a empresas especializadas en disposición final de residuos peligrosos.

Clasificación (modo o sitio de acción): 21 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Carga del equipo: usar protector facial, guantes de nitrilo, camisa de mangas largas, pantalones largos y botas de goma.
Aplicación: usar guantes de nitrilo, botas de goma, camisa de mangas largas y pantalones largos con delantal descartable.

Información Toxicológica:

Del producto formulado 20%
Toxicidad oral aguda (rata): DL50 > 5000 mg/kg.
Toxicidad dermal aguda (rata): DL50 > 5000 mg/ kg.
Toxicidad inhalatoria aguda: CL50 > 6.43 mg/l

Irritación dermal: Leve irritante
Irritación ocular: Moderado irritante
Sensibilización dermal: No sensibilizante

Riesgos ambientales:
Virtualmente no tóxico para abejas.
Prácticamente no tóxico para aves.
Muy tóxico para peces y organismos acuáticos.
No aplicar en fuentes de agua natural ni artificial. Dejar una distancia entre la aplicación y el curso de agua de 10 metros.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
LEIMAY	SUMMIT AGRO ARGENTINA SA	39702	SC	20%	IV