CLOPYRALID + MCPA

Marcas comerciales: CURTAIL M.

Nomenclatura Química:
clopyralid: ácido 3,6- dicloropiridino - 2 carboxílico
MCPA: éster 2-etilhexílico del ácido 2-metil-4-clorofenoxiacético
Clasificación Química: ácido piridincarboxílico y ácido fenoxi-carboxílico.
Acción: sistémico y selectivo.

Uso: herbicida (post-emergente).

Cultivo	Adversidad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Cebada Trigo	Cardo asnal *(Sylibum marianum)* Cardo pendiente *(Carduus nutans)* Cepa caballo *(Xanthium spinosum)* Sanguinaria, cien nudos *(Polygonum aviculare)* Quínoa, Quinoa blanca *(Chenopodium album)* Cardo negro *(Cirsium vulgare)* Cardo ruso *(Salsola kali)* Diente de león *(Taraxacum officinale)* Girasol *(Helianthus annus)* Girasolillo *(Verbesina encelioides)* Lengua de vaca *(Rumex crispus)* Mostacilla *(Rapistrum rugosum)* Enredadera anual *(Polygonum convolvulus)* Nabo *(Brassica campestris)* Nabón *(Raphanus sativus)*	1,25 (*) - 1,35 l/ha	20	Aplicar desde macollaje hasta hoja bandera totalmente desplegada.

(*) Dosis recomendada para el control de Enredadera anual (Polygonum convolvulus), Nabo (Brassica campestris), Nabón (Raphanus sativus)

Información General:

Herbicida post-emergente sistémico y selectivo de acción hormonal (grupo de las auxinas sintéticas), que se absorbe por vía foliar y radicular de las malezas sensibles, indicado para el control de malezas de hoja ancha en cultivos de trigo y cebada. Puede utilizarse durante todo el período de macollaje en trigo y cebada hasta hoja bandera totalmente desplegada.

Instrucciones para el uso:
Calibrar el equipo y verificar la distribución uniforme del líquido pulverizado antes de la aplicación. Utilizar siempre agua limpia.
Preparación:
1°) Llenar el tanque del equipo pulverizador con agua limpia hasta la mitad.
2°) Agregar el producto en cantidad suficiente de acuerdo a la dosis y área a tratar. En caso de mezclar con otros productos, seguir el orden de mezcla adecuado.
3°) Completar el llenado del tanque con agua.
Mantener el sistema de agitación o retorno en todo momento.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:
Equipos terrestres:
deberán estar equipados con pastillas adecuadas para la aplicación de herbicidas y que aseguren un gasto de agua por hectárea de 100 a 150 litros (8002, 8003, 11002, 11003).
Presión: 30-60 lb/pulg2.
Volumen: entre 80-120 litros/ha.
No aplicar durante las horas de mayor insolación y temperatura.
Tratamientos aéreos
Volumen total no menor a 15-25 litros de agua/ha. Se recomienda operar en forma perpendicular a la dirección del viento. Suspender los tratamientos cuando la velocidad del viento supere los 10-12 km/hora.
Número de gotas: aplicar 20-30 gotas/cm2
Importante:
En el caso de agregar adyuvantes o aceites minerales o vegetales, consulte al servicio técnico de Corteva Agriscience Argentina S.R.L

Restricciones de uso:
Período de carencia: deberán transcurrir 20 días entre aplicación y la cosecha. Período previo a la siembra: no presenta restricciones para la siembra inmediata de gramíneas después de la aplicación.

Manejo de resistencia: herbicida que pertenece al grupo de sitio de acción O y a las familias químicas de ácidos fenoxi-carboxílicos (MCPA) y ácido piridin carboxílico (clopyralid).
Para prevenir la selección de plantas naturalmente resistentes se recomienda:
Llegar a siembra con lotes limpios, respetar las recomendaciones de uso (dosis y momento de aplicación, número máximo de aplicaciones por ciclo) detalladas en el marbete, realizar rotación de herbicidas con diferentes sitios de acción, durante el barbecho y a lo largo del ciclo del cultivo, realizar rotación de cultivos, limpiar adecuadamente las herramientas, maquinarias y vehículos, limpiar las áreas no cultivadas y monitorear periódicamente la evolución de las malezas en los lotes. Sembrar semillas de buena calidad, de origen conocido y libre de propágulos de malezas.

Compatibilidad: es compatible con picloram, 2,4-D y fluroxypyr. Antes de utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala, para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos. Los productos compatibles a ser utilizados deben estar registrados para ese uso particular.

Fitotoxicidad: a las dosis recomendadas, no es fitotóxico para los cultivos recomendados. Es importante respetar el estado fenológico en el cual se recomienda realizar la aplicación. No aplicar cuando exista riesgo de que la aspersión sea llevada por el viento hacia cultivos susceptibles como soja, papa, girasol, frutales, ornamentales, hortalizas o sobre tierras preparadas para ser sembradas con estos cultivos.

Derrames:
Contener el líquido derramado con algún material adsorbente inerte (tierra o arena). No usar agua. Evitar la llegada del producto a cursos o cuerpos de agua. Colocar el material de adsorción contaminado en tambores y enviar para su incineración a sitios autorizados. No incinerar a cielo abierto.

Clasificación (modo o sitio de acción): O (HRAC) o 4 (WSSA).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Guantes de nitrilo reforzado. Botas de goma. Camisa de mangas largas y pantalón largo para cubrir totalmente brazos y piernas. Delantal. Antiparras y/o protector facial.

Información Toxicológica:

Toxicidad oral aguda (rata macho): DL50 >2243 mg/kg
Toxicidad oral aguda (rata hembra): DL50 1478 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (conejo): DL50 >2000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria: CL50 > 1,3 mg/l

Irritación cutánea: Leve irritante dermal.
Irritación ocular: Moderado irritante ocular.
Sensibilización cutánea: No sensibilizante dermal.

No posee antídoto específico. En caso de intoxicación, realizar tratamiento sintomático.

Riesgos ambientales:
Toxicidad para abejas: Virtualmente no tóxico
Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico
Toxicidad para peces: Ligeramente tóxico.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
CURTAIL M	CORTEVA AGRISCIENCE ARGENTINA SRL	39978	EC	5% + 43,7 %	II