1E7,E/Z9 DODECADIENIL ACETATO + N-DODECILACETATO

Marcas comerciales: RAK 2 DOBLE - RAK 2 ULTRA.

Nomenclatura Química:
1E7,E/Z9 dodecadienil acetato + n-dodecilacetato
Clasificación Química: feromonas de cadena larga para control de lepidópteros.
Acción: confusión sexual.

Uso: feromona.

Cultivo	Adversidad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Uva de vino	Polilla de la uva *(Lobesia botrana)*	125 cápsulas difusoras/ha (****)		Bajo la recomendación del técnico de BASF, se pueden usar 125 cápsulas difusoras/ha para las propiedades que tengan una experiencia superior a 2 temporadas en el uso de la técnica, y verifiquen bajas poblaciones de Lobesia botrana a través del monitoreo de huevos/larvas/pupas en el viñedo, seguimiento de adultos en trampas y evaluaciones de daño.
		175 cápsulas difusoras/ha (****) 250 cápsulas (**) difusoras/ha 350 cápsulas (*) difusoras/ha		1E7, E/Z9 DODECADIENIL ACETATO + N-DODECILACETATO debe instalarse previo al comienzo del primer vuelo de los adultos de Lobesia botrana que se produce unos días antes de la brotación de las variedades más tempranas y varía según la zona de cultivo. El momento adecuado de colocación es un factor muy importante para un control exitoso de la plaga.
Uva de mesa		175 cápsulas difusoras/ha (****) 350 cápsulas difusoras/ha (***)		

(*) Bajo condiciones normales de presión de plaga.
(**) Bajo la recomendación del técnico de BASF, se pueden usar 250 cápsulas difusoras/ha para las propiedades que tengan una experiencia superior a 2 temporadas en el uso de la técnica, y verifiquen bajas poblaciones de Lobesia botrana a través del monitoreo de huevos/larvas/pupas en el viñedo, seguimiento de adultos en trampas y evaluaciones de daño.
(***) Bajo condiciones normales de presión de plaga.
(****) Para Rak 2 Doble.

Información General:

1E7,E/Z9 DODECADIENIL ACETATO + N-DODECILACETATO es un producto elaborado para el control de Lobesia botrana en vid (de vinificar y de mesa) mediante el sistema de confusión sexual. 1E7,E/Z9 DODECADIENIL ACETATO + N-DODECILACETATO se presenta formulado como Cápsula difusora (dispenser).
Las feromonas son sustancias bioquímicas naturales producidas por insectos. Estas sustancias son emitidas por hembras receptivas para atraer a los machos. Cuando se aplica el concepto de “disrupción de la cópula”, se liberan en el ambiente compuestos sintéticos idénticos o sustancialmente idénticos a las sustancias naturales, mediante por ejemplo, dispensers de liberación lenta de vapor. Los machos se desorientan, se afecta la cópula, y como consecuencia la siguiente generación se ve considerablemente disminuida.
La sustancia activa (E, E/Z) (7,9)- 12c, es el principal componente del bouquet de feromonas que produce la hembra de Lobesia botrana

El principio activo se encuentra encerrado en una capsula difusora. La difusión producida por una distribución homogénea de las capsulas en el viñedo, genera una nube de feromona que permanentemente satura los órganos receptores del macho impidiendo la copula, la posterior descendencia y daños del cultivo.

1E7,E/Z9 DODECADIENIL ACETATO + N-DODECILACETATO contiene feromona suficiente como para liberar durante 6 meses (primavera – verano) en condiciones de campo. 1E7,E/Z9 DODECADIENIL ACETATO + N-DODECILACETATO se adapta a programas de manejo integrado de plagas (IPM) y de producción orgánica.

RECOMENDACIONES DE USO:
1 - Características del viñedo a tratar: La parcela debe estar alejada de viñedos abandonados, luces de mercurio o aislado de posibles fuentes de contaminación. El tamaño de las parcelas (forma rectangular – cuadrangular) debe superar las 4 ha, para obtener - en las condiciones enunciadas – niveles de control adecuados.

2 - Forma de colocación: la colocación de los difusores se realiza uniformemente en el viñedo sobre madera de 1 año (pitones o cargadores) a la altura en la que se formarán los futuros racimos (altura del primer alambre en espalderas). No se recomienda la colocación sobre los alambres, para evitar desplazamientos o sobrecalentamiento de las cápsulas.
Distribuir uniformemente las cápsulas colgándolas de las plantas a las alturas recomendadas. También colocar difusores en el área circundante al viñedo a tratar (bordura) en una franja de 30-40 m., en estos sectores, principalmente reforzando las zonas por donde ingresan los vientos predominantes o existen posibles fuentes de contaminación, cortinas forestales u otras plantas de vid o frutales. Se recomienda consultar al técnico de BASF sobre este punto a la hora de diseñar la colocación.

3- Momento de aplicación: 1E7,E/Z9 DODECADIENIL ACETATO + N-DODECILACETATO debe instalarse previo al comienzo del primer vuelo de los adultos de Lobesia botrana que se produce unos días antes de la brotación de las variedades más tempranas y varía según la zona de cultivo. El momento adecuado de colocación es un factor muy importante para un control exitoso de la plaga.

4 - Monitoreo de la plaga y evaluación de eficacia: es posible colocar trampas de monitoreo de feromonas con observaciones 2 veces/semana para seguimiento de adultos, sin embargo, dentro de la nube de feromonas, las mismas dejan de capturar mariposas indicando que la técnica está en funcionamiento, pero no es suficiente para garantizar que no hay daño de la plaga. Por eso se debe realizar monitoreo de daño y verificar la presencia de huevos/larvas/pupas en el viñedo quincenalmente para determinar la necesidad de algún complemento con un insecticida.
Para la primera generación se recomienda monitorear posturas y larvas sobre las brácteas de las inflorescencias mientras que en las siguientes generaciones las observaciones se realizan sobre las bayas para determinar la necesidad y el momento correcto de aplicar algún insecticida de complemento.

Restricciones de uso: Exento.
LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO DEBE CONTAR CON EL ASESORAMIENTO DE UN INGENIERO AGRÓNOMO.

Clasificación (modo o sitio de acción): no aplica.

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Protección de las vías respiratorias:
No es necesaria la protección de las vías respiratorias.
Protección de las manos: guantes de protección adecuados resistentes a productos químicos (EN 374) y también para un contacto directo y a largo plazo (recomendación: índice de protección 6; correspondiente a > 480 minutos de tiempo de permeabilidad según EN 374): por ej. de caucho de nitrilo (0.4 mm), caucho de cloropreno (0,5 mm), cloruro de polivinilo (0.7 mm), entre otros.
Protección de los ojos: gafas protectoras con protección lateral (gafas con montura) (EN 166).

Información Toxicológica:

Del producto formulado Rak 2 Ultra:

Toxicidad oral aguda (rata): DL50 > 5000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata): DL50 > 2000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata): CL50 > 5mg/l 4h
Irritación dermal: Irritante
Irritación ocular: No irritante
Sensibilización cutánea: No Sensibilizante

Del producto formulado Rak 2 Doble:
Irritación dermal: Leve irritante
Irritación ocular: Leve irritante

Primeros auxilios:
En caso de intoxicación llamar inmediatamente al médico. Retirar al afectado de la fuente de contaminación, quitarle la ropa contaminada y lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo afectadas. No suministrar nada por la boca a personas inconscientes.

Advertencia para el médico:
PRODUCTO QUE NORMALMENTE NO OFRECE PELIGRO. CLASE TOXICOLOGICA IV. CUIDADO.
Inhalación: Categoría III, CUIDADO.
Leve irritante dermal CUIDADO. Categoría IV.
Leve irritante ocular. CUIDADO. Categoría IV.
Aplicar tratamiento sintomático. Síntomas de intoxicación: no se conocen.

Riesgos ambientales: Prácticamente no tóxico en aves. Ligeramente toxico para peces. En peces no se espera exposición. Virtualmente no tóxico para abejas. Si bien hay exposición, no se esperan efectos adversos.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
RAK 2 DOBLE	BASF ARGENTINA	40643	VP	56% + 30%	IV
RAK 2 ULTRA	BASF ARGENTINA	39278	VP	56% + 30%	IV