ESFENVALERATO + BIFENTRIN + ABAMECTINA

Marcas comerciales: MATSURI.

Nomenclatura Química:
esfenvalerato: (S)-α-ciano-3-fenoxibencil (S)-2-(4-clorofenil)-3 metilbutirato.
bifentrin: 2-(metil [1,1´-bifenil]-3-il) metil 3-(2-cloro-3,3,3-trifluoruro-1-propenil)-2,2-dimetilciclopropano carboxilato.
abamectina: mezcla de:
avermectina B1a: 5-O-demetil avermectina A1a.
avermectina B1b: 5-O-demetil-25-de (1-metilpropil)-25-(1-metiletil) avermectina A1a.
Clasificación Química: piretroide + avermectina.
Acción: de contacto e ingestión.

Uso: insecticida (preventivo y curativo).

Cultivo	Adversidad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Soja	Trips *(Frankliniella schultzei)*	150 cm3/ha (*)	20	Aplicar cuando se observen 5 ninfas por folíolo.
	Isoca medidora *(Rachiplusia nu)* Oruga de las leguminosas *(Anticarsia gemmatalis)*			Aplicar cuando se alcancen los umbrales establecidos para estas plagas: Etapa vegetativa, hasta R3: Cuando se contabilicen 15-20 orugas grandes (>1.5 cm) y una defoliación entre 20 - 30%. Desde R3 hasta R7: cuando se contabilicen 10 orugas grandes (> 1,5 cm) y una defoliación del 10 %. Daños en vaina: Cuando se observe 5% de vainas dañadas Aplicar cuando se alcancen los umbrales establecidos para estas plagas: Etapa vegetativa, hasta R3: Cuando se contabilicen 15-20 orugas grandes (>1.5 cm) y una defoliación entre 20 - 30%. Desde R3 hasta R7: cuando se contabilicen 10 orugas grandes (> 1,5 cm) y una defoliación del 10 %. Daños en vaina: Cuando se observe 5% de vainas dañadas
	Arañuela roja *(Tetranychus urticae)*			Cuando en el tercio medio del cultivo se detecte el inicio de la infestación (menos de 15 arañuelas por folíolo en al menos el 30% de las hojas) En condiciones de estrés en etapas vegetativas tempranas, aplicar ni bien se detecte la presencia de la plaga.
	Chinche de la alfalfa *(Piezodorus guildinii)* Chinche verde *(Nezara viridula)* Chinche de los cuernos *(Dichelops furcatus)*	200 cm3/ha (*)		Aplicar según los umbrales establecidos por INTA. A partir de 0,4 chinches/m2, cuando el cultivo esté en estado de formación de vainas.
Papa	Pulgón verde del duraznero *(Myzus persicae)*	150 cm3/ha		Aplicar a la aparición de la plaga.
	Mosca minadora de la papa *(Liriomyza huidobrensis)*			Aplicar cuando se observen las primeras picaduras.

(*) Aplicar con aceite vegetal metilado 500 cm3/ha o SAKKON EXTREMO 200cm3/ha.

Información General:

Matsuri combina la acción de tres principios activos para lograr un eficaz control y residual sobre trips, orugas, arañuela y Chinches fitófagas en el cultivo de soja.

INSTRUCCIONES PARA EL USO:
Preparación:
Llenar el tanque de la máquina pulverizadora hasta la mitad con agua, agregar la cantidad necesaria del producto (previamente agitando el envase) completar el faltante del tanque con agua, mantener en funcionamiento el sistema de agitación.
Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:
Puede aplicarse con equipos terrestres o aéreos, considerando los siguientes parámetros en cuanto a calidad de aplicación:
Cobertura: 30-40 gotas/cm2. Tamaño de gota: 200-400 micrones. Uniformidad: 30% coeficiente de variación.

EQUIPOS, VOLUMENES Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN
Puede aplicarse con equipos terrestres ó aéreos, considerando los siguientes parámetros en cuanto a calidad de aplicación:
Cobertura: 30-40 gotas/cm2. Tamaño de gota: 200-400 micrones. Uniformidad: 30% coeficiente de variación.

Restricciones de uso:
Tiempo de reingreso al área tratada: 24 hs.

Fitotoxicidad:
No se producen casos de fitotoxicidad a las dosis recomendadas. No se producen efectos sobre los cultivos subsiguientes.

Compatibilidad:
Se recomienda realizar una prueba de compatibilidad previa. Los usos compatibles deben estar autorizados para los mismos usos.

Tratamiento de remanentes y caldos de aplicación:
A fin de evitar tener caldo remanente, deberá calcular la cantidad justa de producto a utilizar para la superficie a tratar. En caso de sobrar no se debe eliminar en cursos de agua (canales, acequias, arroyos, etc). Se deberán eliminar sobre alambrados y caminos internos a una mayor dilución, lejos de la circulación de personas y animales.
Los envases deben ser Triple Lavados o Lavados a Presión, inutilizados por perforación o compactación, y posteriormente entregar los envases en un "Centro de Almacenamiento Transitorio". Los envases luego serán eliminados mediante empresas habilitadas para tal fin. Seguir normas locales, asegurando no contaminar el ambiente.

Derrames:
Aislar el área y negar la entrada a personas que no sean necesarias, manteniéndolas fuera. Utilizar los elementos de protección personal recomendados para este producto. Evitar que el producto alcance corrientes o fuentes de agua. Hacer endicamientos de manera de confinar el derrame y proceder a adsorberlo con una sustancia adsorbente no combustible, como arcilla, arena o tierra. Recoger los desperdicios en un tambor e identificarlo adecuadamente para su disposición final.
Recurra a empresas especializadas en disposición final de residuos peligrosos.

Almacenamiento:
Almacenar en lugar cerrado, fresco, seco y lejos de la luz del sol. Almacenar en su envase original, bien cerrado, claramente identificado y lejos de semillas, alimentos y forrajes. Mantener fuera del alcance de niños, personas inexpertas y animales domésticos. Evitar temperaturas bajo 0°C y sobre 35° C.

Clasificación (modo o sitio de acción): 3 (IRAC) + 6 (IRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Carga del equipo: usar protector facial, guantes de nitrilo, camisa de mangas largas, pantalones largos y botas de goma.
Aplicación: usar guantes de nitrilo, botas de goma, camisa de mangas largas y pantalones largos con delantal descartable.

Información Toxicológica:

Del producto formulado 12,5% + 10% + 2,4%

Toxicidad oral aguda (rata): DL50 1030 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata): DL50 > 5000 mg/ kg
Toxicidad inhalatoria aguda: CL50 > 2.02 mg/l

Irritación dermal: Leve irritante
Irritación ocular: Severo irritante
Sensibilización dermal: No sensibilizante

Riesgos ambientales:
Altamente tóxico para abejas.
Prácticamente no tóxico para aves.
Extremadamente para peces y organismos acuáticos. No verter producto ni lavar envases en cursos de agua naturales ni artificiales. Dejar una distancia entre la aplicación y el curso de agua de 10 metros.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
MATSURI	SUMMIT AGRO ARGENTINA SA	39785	EC	12,5% + 10% + 2,4%	II