# FLORPYRAUXIFEN BENZYL

**Marcas comerciales**: LOYANT.

**Nomenclatura Química:**
florpyrauxifen benzyl: 2-pyridinecarboxylic acid, 4-amino-3-chloro-6-(4-chloro-2-fluoro-3- methoxyphenyl)-5-fluoro-
**Clasificación Química:** arylpicolinato.
**Acción:** sistémicao.

**Uso:** herbicida.

| Cultivo | Adversidad | Dosis | TC | Momento de Aplicación |
|---|---|---|---|---|
| Arroz | Capín *(Echinochloa colonum)* Capín *(Echinochloa crus-galli)* Capín *(Echinochloa crus-pavonis)* | 1,2 l/ha | | Aplicar en post emergencia de la maleza hasta 3 macollos. Y en post emergencia del cultivo desde 4 hojas hasta pre-floración. |
| | Brachiaria *(Urochloa platyphylla)* | | | Aplicar en post emergencia de la maleza hasta 1 macollo. Y en post emergencia del cultivo desde 4 hojas hasta pre-floración. |
| | Cyperus *(Cyperus esculentus, Cyperus rotundus, Cyperus iria)* | | | Aplicar en post emergencia de la maleza hasta 20 centímetros de altura. Y en post emergencia del cultivo desde 4 hojas hasta pre-floración. |
| | Porotillo *(Aeschynomene indica)* | | | Aplicar en post emergencia de la maleza hasta 15 centímetros de altura. Y en post emergencia del cultivo desde 4 hojas hasta pre-floración |
| | Ludwigia *(Ludwigia bonariensis)* | | | |

**Información General:**

Herbicida sistémico de acción post-emergente, recomendado para el control de malezas gramíneas, latifoliadas y ciperáceas en el cultivo de arroz, según lo indicado en las instrucciones de uso de esta etiqueta.

Herbicida hormonal auxínico perteneciente a la familia química de los arilpicolinatos selectivo para el cultivo de arroz en aplicaciones post-emergentes. Presenta acción sistémica afectando los puntos de crecimiento y alterando de esta forma diferentes procesos del metabolismo celular. Genera la muerte de las malezas alrededor de 15 a 25 días después de la aplicación del producto, dependiendo de condiciones ambientales y de manejo de agua de riego. Loyant es activo incluso en biotipos de malezas que no son controladas por otras familias químicas y/o mecanismos de acción, como ALS y ACCasa.

Instrucciones para el uso:
Preparación:
Llene el tanque de la pulverizadora con agua hasta la mitad; agregar la cantidad necesaria de producto, y agitando complete el volumen de agua necesario. En aplicaciones terrestres (con pulverizador mecánico o manual) se sugiere utilizar volúmenes de entre 80-120 litros de caldo/ha en aplicaciones dirigidas al follaje de las malezas. Es importante que el sistema de retorno y agitadores funcionen en todo momento.
Aplicar con una presión de 30 a 40 psi luego de bajar la lámina de agua dejando al menos 2/3 de la maleza objetivo expuesta. Llenar el cuadro luego de 24-48 horas después de realizada la aplicación. Se sugiere el uso de boquillas de abanico plano antideriva y una presión de no más de 30 lb/pulg2 en condiciones de vientos mayores a 5 km/h.
No se recomienda la aplicación de con vientos mayores a 10 km/hora. No necesita del agregado de ningún tipo de adyuvante para lograr los efectos descriptos anteriormente en las malezas.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:
Las aplicaciones pueden realizarse con equipos terrestres o aéreos.

Aplicaciones terrestres: usar equipos de alto volumen. Pastillas abanico plano (tipo Teejet 8002, 8003, 11002, 11003) que aseguren la cobertura del área tratada. Volumen: 80-120 litros/ha según altura y densidad de la maleza. Presión: 30-40 lb/pg2. Velocidad del equipo: no mayor a 8 km/h.
Aplicaciones aéreas: volumen: 25-40 litros/ha. El ancho de trabajo deberá asegurar una adecuada cobertura. No aplicar con vientos superiores a 10 km/hora. Evitar la deriva sobre cultivos aledaños.
Número de gotas: aplicar 20-30 gotas/cm2.

IMPORTANTE:
- Aplicar con malezas en activo crecimiento, sin manifestaciones de sintomatología de algún tipo de stress.
- La inundación del cultivo debe realizarse no más allá de los 3 días posteriores a la aplicación del tratamiento herbicida. En caso de demorar la inundación más allá del tiempo recomendado en esta etiqueta, la eficiencia del producto puede verse afectada. Los mejores resultados se logran cuando la aplicación se realiza sobre suelos húmedos o recién bañados.
- Factores ambientales adversos tales como estrés térmico, hídrico, daño causado por otros agroquímicos o suelos calcáreos, pueden alterar el metabolismo y el crecimiento de la planta, pueden impactar en el correcto funcionamiento del herbicida tanto desde el punto de vista de control de malezas como desde la selectividad al cultivo.
- No aplicar Loyant sobre variedad de arroz de tipo Japónica.
- Evitar la deriva de Loyant a cultivos sensibles como soja, alfalfa, praderas de leguminosas, girasol, tréboles, maíz, sorgo.

Restricciones de uso: período de carencia: exento (uso posicionado en post-emergencia temprana del cultivo). Evitar la deriva sobre cultivos aledaños.

Compatibilidad: puede ser utilizado en mezclas con cyhalofop, penoxsulam e imidazolinonas. No mezclar con herbicidas de contacto como paraquat o saflufenacil ni productos alcalinos. Al mezclar los productos, comprobar previamente su compatibilidad antes de agregarlos a la máquina de aplicación.

Fitotoxicidad: no se han observado niveles de daño que afecten el normal desarrollo y crecimiento del cultivo del arroz, al ser utilizado según las recomendaciones de etiqueta descriptas.

**Derrames:**
Contener el líquido derramado con algún material adsorbente inerte (tierra o arena). No usar agua. Evitar la llegada del producto a cursos o cuerpos de agua. Colocar el material de adsorción contaminado en tambores y enviar para su incineración a sitios autorizados. No incinerar a cielo abierto.

**Clasificación (modo o sitio de acción):** O (HRAC) o 4 (WSSA).

**Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:**
Guantes de nitrilo reforzado; botas de goma; camisa de mangas largas y pantalón largo para cubrir totalmente brazos y piernas; delantal y antiparras y/o protector facial.

**Información Toxicológica:**

Del producto formulado 2,5%:
Toxicidad oral aguda (rata): DL50 > 5000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata): DL50 > 5000 mg/kg.
Toxicidad inhalatoria aguda: CL50 >5,4 mg/l

Irritación dermal: Leve irritante
Irritación ocular: Moderado irritante
Sensibilización dermal: No sensibilizante

Riesgos ambientales: Virtualmente no tóxico para abejas. Prácticamente no tóxico para aves y fauna silvestre. Prácticamente no tóxico para peces y microcrustáceos. Extremadamente tóxico para algas. Evitar contaminar fuentes de agua.

| Marca | Empresa | N° Inscrip. | Form. | Conc. | C.T. |
|---|---|---|---|---|---|
| LOYANT | CORTEVA AGRISCIENCE ARGENTINA SRL | 39.532 | EC | 2,5 % | IV |