PYDIFLUMETOFEN

Marcas comerciales: CREAVIS CON TECNOLOGIA ADEPIDYN - FESTIO CON TECNOLOGIA ADEPIDYN - MIRAVIS CON TECNOLOGIA ADEPIDYN.

Nomenclatura Química:
pydiflumetofen: 3-(difluorometil)-N-metoxy-1-metil-N-[(RS)-1-metil-2-(2,4,6-triclorofenil)ethyl]-1H-pyrazol-4-carboxamida
Clasificación Química: carboxamida.
Acción: sistémica y preventiva y curativa.

Uso: fungicida.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Cebada	Mancha en red *(Drechslera teres)* Escaldadura *(Rhynchosporium secalis)* Mancha borrosa *(Bipolaris sorokiniana)* Salpicado necrótico *(Ramularia Collo-cygni)*	150-200 cm3/ha (*)	30	Aplicar preventivamente o a la aparición de los primeros síntomas de enfermedad a partir de macollaje. En caso de ser necesario, realizar una nueva aplicación con un intervalo mínimo de 15 días.
Trigo	Mancha amarilla *(Drechslera tritici repentis)* Septoria o Mancha de la hoja del trigo *(Septoria tritici)*			
Soja	Mancha marrón (Septoria glycines) Mancha ojo de rana (Cercospora sojina)	150-300 cm3/ha (*)		Realizar la aplicación en forma preventiva ante situaciones ambientales predisponentes o con la aparición de primeros síntomas.

(*) en caso de ser necesario utilizar agregar 1% de aceite mineral refinado que supere el 83%.

Se recomienda que la aplicación del producto formulado se realice en forma preventiva ante situaciones ambientales predisponentes o ante la aparición de los primeros síntomas de enfermedad, para evitar que el progreso del patógeno cause daños importantes sobre el rendimiento. Es recomendable usar el producto en mezcla con otro fungicida de diferente modo acción y/o dentro de un programa de aplicación en rotación con otros modos de acción.

Información General:

Fungicida con sistemia gradual por xilema, lo que le otorga un prolongado efecto residual para el control de enfermedades foliares, principalmente necrotróficas, en cultivos de trigo y cebada. Su ingrediente activo, pydiflumetofen, perteneciente al Grupo 7 (N-methoxy sub-group) – Inhibidores de la succinato deshidrogenasa o SDHI (FRAC), inhibe el Complejo II de la respiración donde actúa la SDH. Posee prolongada residualidad, asegurando la protección de las hojas, permitiendo al cultivo terminar su ciclo en forma óptima, con hojas verdes por más tiempo, logrando expresar el máximo potencial del cultivo.

Preparación:
Es una suspensión concentrada que debe diluirse en agua. Para una correcta preparación respetar las siguientes instrucciones:
- Verificar el buen funcionamiento del equipo y su correcta calibración antes de iniciar la aplicación.
- Agitar el producto antes de usarlo. Agregar agua limpia al tanque de la pulverizadora hasta la mitad de su capacidad y poner el sistema de agitación en funcionamiento.
- Añadir la cantidad necesaria de producto de acuerdo a la calibración realizada, directamente al tanque y sin dilución previa. Con el sistema de agitación en movimiento, verificar que el producto se disperse completamente.
- En caso de mezcla con otros productos, agregar siempre producto al tanque en primer lugar.
- Continuar agitando mientras se termina de completar el tanque con la cantidad de agua necesaria.
- Usar el producto dentro de las seis horas de haber realizado la mezcla de tanque, ya que la efectividad puede reducirse debido a la degradación del producto. Re-agitar el caldo antes de reanudar la aplicación. Utilizar siempre agua limpia.
- Por último, en caso de ser necesario, agregar 1%de aceite mineral refinado que supere el 83 % p/v (dosis de marbete correspondiente al producto a utilizar).

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:
El producto debe ser aplicado al cultivo en el volumen necesario para cubrir uniforme y satisfactoriamente el área a tratar. Se deben lograr al menos 20-30 gotas/cm2 sobre las hojas del cultivo a proteger.
Puede aplicarse con equipos terrestres de arrastre o autopropulsados, con barras provistas de picos de cono hueco o abanico plano para fungicidas, para lograr un tamaño de gota que alcance todas las partes verdes de la planta. Utilizar un volumen mínimo de agua de 100 litros/ha y presión indicada por el fabricante de las pastillas, con el objetivo de lograr una buena penetración del producto y mojado del cultivo. Corroborar que los picos y sus componentes estén en buen estado y que la barra del equipo pulverizador esté ajustada a la altura suficiente para garantizar una cobertura completa.
También puede aplicarse por avión, empleando un volumen mínimo de agua de 15 litros/ha.
Antes de iniciar cualquier tratamiento, es imprescindible verificar el correcto calibrado del equipo y el buen funcionamiento de picos (filtros y pastillas), reemplazando las partes defectuosas. Mantener el sistema de agitación en movimiento en todo momento. Evitar la superposición de franjas durante la pulverización. Tomar las medidas necesarias, para evitar la deriva del producto hacia cultivos linderos, vegetación no blanco, fuentes hídricas y áreas pobladas. Dejar una zona o franja de seguridad sin tratar y especialmente en áreas de cultivos intensivos hacer uso de cortinas protectoras. No realizar aplicaciones con altas temperaturas, baja humedad, vientos fuertes, ante probabilidades de lluvias inmediatas. Suspender las aplicaciones con vientos superiores a los 10 km/hora.

Restricciones de uso:

Periodo de carencia: dejar transcurrir los siguientes días entre la última aplicación y la cosecha: cebada y trigo: 30 días. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.
No reingresar al área tratada hasta que el producto se haya secado de la superficie de las hojas.
IMPORTANTE: No utilizar más de 400 gramos de pydiflumetofen por hectárea por año.

Prevención y manejo de resistencias
El producto pertenece al grupo 7 de los fungicidas.
Para prevenir la selección de poblaciones naturalmente resistentes a un fungicida, deben respetarse las recomendaciones de uso (dosis y momento de aplicación) detalladas en el marbete. Debe evitarse el uso de un único grupo de fungicida en la estrategia de manejo de plagas en el lote, mediante la combinación con otros fungicidas de diferente número de grupo en mezcla de tanque o aplicaciones secuenciales.
Para controlar una población resistente a un fungicida, será necesario aplicar otro producto efectivo, de diferente número de grupo. Utilizarlo a la dosis que indique el marbete para esa especie, y adoptar todas las prácticas de manejo que sean necesarias para mantener controlada esa población a lo largo del ciclo del cultivo.

Advertencia: la experiencia ha demostrado que pueden desarrollarse cepas de hongos resistentes a los fungicidas, lo que podría tener por consecuencia la falta de efectividad y la disminución del rendimiento. Para evitar la generación de resistencia, rotar con fungicidas de diferente modo de acción.

Compatibilidad:
El producto puede aplicarse en mezcla de tanque con la mayoría de los agroquímicos de reacción neutra. Antes de utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala, para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos.

Fitotoxicidad:
El producto no ha manifestado síntomas de fitotoxicidad en los cultivos registrados, siguiendo las dosis y recomendaciones que figuran en esta etiqueta.

Derrames:
Cubrir los derrames con material adsorbente (tierra o arena). Barrer el producto adsorbido y recoger en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa.

Clasificación (modo o sitio de acción): C2:7 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Para su seguridad durante la preparación y aplicación:
Utilizar ropa protectora adecuada (mameluco o pantalones y camisa larga), guantes impermeables, sombrero o casco, botas de goma, protección facial/ anteojos de seguridad. El producto no diluido puede irritar los ojos. Evitar el contacto con el pulverizado. No destapar picos o boquillas con la boca.
Para su seguridad después del tratamiento: cambiarse y lavar la ropa inmediatamente. Bañarse adecuadamente con abundante agua y jabón. Guardar el sobrante de producto en su envase original, bien cerrado.

Información Toxicológica:

Del producto formulado:
Toxicidad oral aguda(rata): DL50 2958 mg/kg
Toxicidad dermal aguda(rata): DL50 > 5000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda(rata): CL50 > 3,5 mg/l

Irritación dermal: No irritante
Irritación ocular: Leve irritante. Causa irritación moderada a los ojos.
Sensibilización dermal: No sensibilizante
No se conoce antídoto específico. Proseguir con tratamiento sintomático y de recuperación.

Riesgos ambientales:
El producto es moderadamente tóxico para peces y para organismos acuáticos. Evitar que el producto entre en contacto con ambientes acuáticos. Dejar una zona o franja de seguridad entre el área a tratar y fuentes hídricas superficiales. No contaminar el agua de riego, ni tampoco receptáculos como lagos, lagunas o diques. No contaminar fuentes de agua cuando se elimine el líquido de limpieza de los equipos de pulverización y asperjar el caldo remanente sobre campo arado o camino de tierra.
El producto es prácticamente no tóxico para aves. Evitar la presencia de las mismas en el área de aplicación e impedir que tomen contacto con el producto.
El producto es virtualmente no tóxico para abejas. Se deben respetar los cultivos y momentos de aplicación de esta etiqueta en forma estricta. Tomar la precaución de no contaminar las posibles fuentes de agua de abejas.
No contaminar forrajes, estanques ni cursos de agua. Evitar la deriva durante las aplicaciones.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
CREAVIS CON TECNOLOGIA ADEPIDYN	SYENGENTA AGRO	40716	SC	20%	III
FESTIO CON TECNOLOGIA ADEPIDYN	SYNGENTA AGRO	40127	SC	20%	III
MIRAVIS CON TECNOLOGIA ADEPIDYN	SYNGENTA AGRO	39845	SC	20%	III