INDAZIFLAM + ISOXAFLUTOLE

Marcas comerciales: MERLIN TOTAL.

Nomenclatura Química:
indaziflan: N-[(1R,2S)-2,3-dihidro-2,6-dimetil-1H-inden-1-il]-6-[(1RS)-1-fluoroetil]-1,3,5-triazina-2,4
Isoxaflutole: 5-ciclopropil-4-isoxazolyl [2-(methylsulfonyl)-4-(trifluoromethyl) phenyl] methanone
Clasificación Química: alkylazinas e ixosazoles.
Acción: sistémica (inhibe la síntesis de la celulosa y la acción de la 4Hydroxi Phenyl Piruvato Deoxidasa).

Uso: herbicida.

Cultivo	Maleza	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Caña de azúcar	Cebollín *(Cyperus rotundus)* Flor de Santa Lucía *(Commelia erecta)* Gramón *(Cynodon dactylon)* Pasto moro *(Leptochloa spp.)* Tupulo *(Sicyos polyacanthus)* Gramón *(Cynodon dactylon)* Pasto moro *(Leptochloa spp.)*	0,2-0,3 l/ha	(*)	Pre emergencia del cultivo y de las malezas Si las malezas están emergidas hasta 2 hojas, hacer mezcla de tanque con Glifosato. (**)

(*) Uso Posicionado
(**) Aplicar en combinación de tanque con Glifosato (1320 g/ha glifosato).

Información General:

Es un herbicida suelo activo de contacto para cultivos de caña de azúcar. Compuesto por dos ingredientes activos, Indaziflam e Isoxaflutole. Pertenecen a la familia de las Alkylazinas e Ixosazoles respectivamente. El primero de ellos, actúa a nivel radicular de las malezas en proceso de germinación y emergencia, bloqueando la síntesis de celulosa e impide la formación de la pared celular. El segundo ingrediente activo, inhibe la acción de la 4Hydroxi Phenyl Piruvato Deoxidasa la cual interviene en la síntesis de pigmentos carotenoides necesarios para proteger la clorofila en el proceso de fotosíntesis.

Instrucciones de uso: Llene la pulverizadora con agua hasta la mitad de su volumen, agregue la cantidad necesaria de Glifosato y del producto, directamente en el tanque y complete el llenado con agua. Es recomendable mantener los agitadores o el retorno en actividad durante la preparación del caldo y la aplicación.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:
Puede ser aplicado con las pulverizadoras convencionales de bajo volumen, ya sean de arrastre como autopropulsadas, siempre que estén provistas de un agitador adecuado. En caso de no contar con este implemento, la bomba deberá ser capaz de producir un exceso de flujo, de modo de mantener una remoción constante a través del retorno. Es importante lograr un correcto mojado y asegurarnos que llegue el herbicida al suelo, con una distribución uniforme de 30 a 40 gotas/cm2 y con un coeficiente de variación menor a un 30% entre las diferentes pastillas aspersoras.
El volumen de aplicación deberá ser de 80 a 120 litros/ha, trabajando a una presión de 35 a 45 libras/pulg2, se recomienda el uso de pastillas de abanico plano y ángulo de pastillas entre 80° y 110°. Debe evitarse toda posible deriva a cultivos cercanos sensibles al herbicida.
En caso de aplicar junto con Glifosato, utilizar el mayor volumen de aplicación en condiciones de baja humedad relativa ambiente y altas temperaturas.

Limpieza de la pulverizadora: Para evitar dañar a cultivos sensibles a este herbicida, luego de utilizar la pulverizadora es necesario eliminar los residuos del producto que pudieran haber quedado en la misma. Para ello, se recomienda seguir estos pasos:
1- Drene el tanque y enjuáguelo con agua limpia, al igual que mangueras y barras. Utilice agua a presión.
2- Drene el tanque completamente y repita el paso anterior.
3- Llene el tanque con agua limpia y agréguele lavandina a razón de 0,5 litros por cada 100 litros de agua. Haga circular esa solución por mangueras y barras durante 15 minutos.
4- Tire la solución de lavandina y repita el paso anterior.
5- Desmonte filtros y picos, y lávelos separadamente.
6- Para eliminar la solución de lavandina, enjuague con agua el tanque, mangueras y barras.

Restricciones de uso:

No aplicar únicamente el producto sobre malezas nacidas. En ese caso aplicar en combinación con glifosato.
No realizar aplicaciones por contacto directo sobre el follaje, corteza verde, raíces o frutos. Evitar aplicar con exceso de viento, ya que la deriva podría afectar a otros cultivos. Aplicar de acuerdo a las Buenas Prácticas Agrícolas.
No aplicar en presencia de heladas ni sobre suelos que presenten agua en estado de congelación.
No reingresar al área tratada durante las 24 horas siguientes a la aplicación.
En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Derrames:
Recoger el producto previa ligazón con material adsorbente (Ej.: tierra, aserrín, turba, aglutinantes, de productos químicos) e introducirlo en recipientes cerrados e identificados para su posterior destrucción.

Clasificación (modo o sitio de acción): L (HRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
En aplicaciones prolongadas y sin la debida protección puede irritar la piel. Durante la preparación y la aplicación use guantes, sombrero o casco, protector facial y ropa protectora adecuada. Igual protección deberán usar los banderilleros. No fume, no coma ni beba durante las aplicaciones. Este producto es tóxico cuando es ingerido o absorbido por la piel. Una vez finalizada la aplicación lave los elementos utilizados en la misma. Terminada la tarea, lávese con agua y jabón las partes expuestas. Quítese la ropa de trabajo y lávela antes de volverla a usar.

Información Toxicológica:

Del producto formulado al 50%
Toxicidad oral aguda (rata): DL50: >= 2.000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata): DL50: >= 2.000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (conejo): CL50: >= 1.937 mg/l

Irritación dermal (conejo): No irritante
Irritación ocular (conejo): No irritante
Sensibilización dermal (ratón): No sensibilizante

Riesgos ambientales
Ligeramente toxico para aves.
Muy toxico para organismos acuáticos. Se recomienda dejar una franja de seguridad de 5 metros entre la aplicación y el curso de agua. No aplicar directamente sobre espejos de agua ni en áreas donde existe agua libre en superficie. No contaminar fuentes de agua cuando se elimine el agua de limpieza de los equipos de pulverización.
Virtualmente no toxico para abejas.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
MERLIN TOTAL	BAYER	38.938	SC	15% + 45%	II