CARPOVIRUS

Marcas comerciales: CARPOVIRUSINE.

Nomenclatura Química:
Virus de la Granulosis de Cydia pomonella (CpGV)
Clasificación Química: biológico (no corresponde c.q.).
Acción: ingestión.

Uso: Insecticida (biológico).

Cultivo	Maleza	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Manzano Membrillero Peral	Gusano o polilla de la pera y la manzana (Cydia pomonella)	0,5 l/ha para programas de aplicaciones cada 8 días. 1,0 l/ha para programas de aplicaciones cada 14 días.	(*)	Aplicar según los servicios de alarma y/o al observar las primeras posturas y la caída de mariposas en las trampas. Los tratamientos deben coincidir con la eclosión de las larvas para obtener mortalidad elevada. Intervalo entre tratamientos: 8 días como mínimo y 14 días como máximo (**). En nogal puede aplicarse cada 10-12 días y siempre a dosis de 1,0 L/ha.
Nogal		1,0 l/ha para programas de aplicaciones cada 10-12 días		

(*) No observa período de carencia y puede usarse hasta el momento previo a la cosecha.
(**) En tratamientos sin complementación de feromonas, aplicar cada 8 días como máximo y en aplicaciones combinadas con feromonas (TCS) aplicar cada 14Uso Posicionado

Información General:

Es un producto biológico a base del virus de la granulosis de Cydia pomonella. Altamente específico, actúa sobre las larvas de primer estadio por ingestión. Es de acción lenta y la larva muere algunas horas después de la ingestión de las partículas virales. Los inertes son biodegradables. En montes frutales con daño a cosecha en la campaña anterior, superior al 10%, se recomienda combinar con productos químicos para controlar la primera generación.

Aplicar en los horarios con temperaturas menores a 25° y vientos menores a 10 km/h. Repetir en caso de ocurrir precipitaciones superiores a 45mm después de una aplicación del producto.

INSTRUCCIONES PARA EL USO: Preparación: Agregar agua hasta la mitad del tanque de la pulverizadora, poner en funcionamiento el agitador, colocar la cantidad de formulado a utilizar y mezclar hasta obtener una correcta suspensión. Homogenizar por agitación y completar con el volumen de agua correspondiente. Agitar continuamente la suspensión.

Usar la preparación en pocas horas.

EQUIPOS, VOLÚMENES Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN: Usar un equipo de turbina (hidroneumático) o de manguera. Presión: entre 200 y 300 psi (libras por pulgadas cuadradas)

El volumen deberá ser ajustado de acuerdo con las características del monte a tratar (altura de los árboles, distancia entre filas, etc.) de modo de asegurar una correcta cobertura de follaje y frutos con el virus. Asegurar la llegada del pulverizado al interior del canopeo.

RESTRICCIONES DE USO: El producto no observa ninguna restricción y puede ser utilizado hasta la cosecha.

TIEMPO DE REINGRESO AL AREA TRATADA: no hay precauciones particulares.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con insecticidas neutros. No debe usarse con productos en base a Azufre. No mezclar con Bacillus thuringiensis. Puede usarse en aplicaciones combinadas con fungicidas.

FITOTOXICIDAD: No posee.

TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACIÓN: Después de la aplicación se deben limpiar las máquinas e implementos utilizados. Los restos del caldo de aplicación o agua del lavado de los equipos y envases no deben ser arrojados a fuentes de agua y pueden aplicarse áreas perimetrales o no cultivadas.

TRATAMIENTO Y MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACÍOS: Los envases vacíos deben ser enjuagados por lo menos tres veces (triple lavado). Inutilizar los mismos perforándolos y colocarlos en un área segura para luego enviarlos a una planta para la destrucción definitiva. No quemar a cielo abierto ni enterrar.

ALMACENAMIENTO: Almacenar bajo llave, en los envases originales cerrados, en lugar seco, fuera de la exposición solar. Conservado a -18°C mantiene su actividad por 2 años y a +4°C se mantiene por 15 meses. A temperatura ambiente (+25ºC máximo) la actividad disminuye a partir de la tercera semana. Se debe descongelar a temperatura ambiente antes de su uso. No usar microondas.

Derrames:
Lavar la zona con agua clorada o solución detergente.

Información Toxicológica:

En caso de ingestión, inhalación o contacto con mucosas o heridas consultar con un médico. Si el contacto es ocular lavar con abundante agua.

ADVERTENCIAS PARA EL MÉDICO: Producto que normalmente no ofrece peligro.
Aplicar tratamiento sintomático
ADVERTENCIAS TOXICOLÓGICAS ESPECIALES: Se recomienda no exponer a los asmáticos e inmunosuprimidos al producto.
SINTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA: No se conocen. No se han presentado casos.
RIESGOS AMBIENTALES: Carece de residuos tóxicos para el ambiente y fauna auxiliar. Abejas: virtualmente no tóxico. Por su forma de uso, no se espera exposición. Peces: prácticamente no tóxico. Aves: prácticamente no tóxico.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
CARPOVIRUSINE	UPL ARGENTINA S.A.	38.935	SC	25% p/p (***)	IV

*(10^{13} GI/L estimado por titulación biológica)