METAMITRON

Marcas comerciales: ADAMA BREVIS 15 SG.

Nomenclatura Química:
metamitron: 4-Amino-4,5-dihidro-3-metil-6-fenil-1,2,4-triazin-5-ona
Clasificación Química: triazinona
Acción: sistémica

Uso: Fitorregulador (raleo de frutos)

Cultivo	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Manzano (*) Peral (**)	2-3 kg/ha	100	Para un mejor resultado, se recomienda realizar una sola aplicación cuando los frutos centrales poseen un diámetro de entre 8 y 12 mm aun cuando sea factible lograr un raleo químico eficaz con aplicaciones más tardías entre 14 y.18 mm.

(*) Manzano: cv Red Delicious ("chañar 28", Red Chief), cv Gala (Royal Gala y Galaxy), cv Granny Smith, cv Cripps Pink
(**) Peral: cv Williams

Información General:

Este producto es un inhibidor de la fotosíntesis que al aplicarse sobre frutales de pepita genera una disminución temporal en la producción de carbohidratos. Las aplicaciones en cultivos de pomáceas en las primeras semanas posteriores a la floración genera una mayor competencia entre los frutos por los fotoasimilados y provoca el raleo químico de los mismos, mejorando la calidad de la producción.

Preparación:
Limpiar a fondo el equipo de aspersión antes de usar este producto.
Llene la pulverizadora con agua hasta la mitad de su volumen, disuelva la cantidad de producto a utilizar en un recipiente menor y agréguelo al tanque de la pulverizadora procediendo a su posterior llenado con la cantidad necesaria de agua para completar el volumen. Es recomendable mantener los agitadores o el retorno en actividad durante la preparación del caldo y la aplicación

Este producto puede ser utilizado con los equipos convencionales de aplicación de alto volumen. Los caudales a aplicar dependerán del tipo de conducción que se haya hecho del monte, siempre respetando la dosis/ha indicada en el cuadro de uso y de acuerdo al cálculo del TVR. Es importante lograr un óptimo mojado de todas las partes de la planta de modo tal de promover un raleo parejo.

El producto está formulado como gránulos solubles en agua.

En virtud de que se trata de una aplicación muy técnica, no se recomienda aplicar este producto con otros productos fitosanitarios. La aplicación conjunta con otros productos podría provocar un efecto no deseado.

En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

No reingresar al área tratada hasta que el producto haya secado, idealmente se deberá esperar 24hs y un mínimo de 12hs.

Fitotoxicidad:
Luego de la aplicación del producto, pueden presentarse síntomas leves de fitotoxicidad en hojas (clorosis internervales). Dicha clorosis es temporal y no perjudica la producción del año o el retorno a floración en la siguiente temporada

Clasificación (modo o sitio de acción): C1(HRAC)

Información Toxicológica:

Producto moderadamente peligroso: Categoría II.
Toxicidad inhalatoria: categoría III.
Irritación ocular: severo irritante, categoría II, Causa daño temporal a los ojos.
Tratamiento sintomático y dar terapia de soporte.
No hay antídoto específico.

Riesgos ambientales:
Toxicidad para abejas: virtualmente no tóxico de contacto, ligeramente tóxico por ingestión
Toxicidad para aves: prácticamente no tóxico
Toxicidad para peces: ligeramente tóxico

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
ADAMA BREVIS 15 SG	ADAMA ARGENTINA SA	39.972	SG	15%	II