METRIBUZIN + METOLACLORO

Marcas comerciales: ADAMA TAILWIND

Nomenclatura Química:
metribuzin: 4-Amino-6-tert-butyl-3-methylsulfanyl-1,2,4-triazin-5-one (Sal de sodio)
metolacloro: 2-cloro-6-etil-N-(2-metoxi-1-metiletil)acet-o-tolouidina
Clasificación Química: triazinona + cloroacetamida
Acción: sistémica + residual

Uso: herbicida (pre siembra, pre emergencia)

Cultivo	Adversidad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Soja	Bejuco *(Ipomoea sp.)* Borreria *(Borreria verticilata)(*)* Capin *(Echinochloa sp.)* Cebollín *(Cyperus rotundus)* Gomphrena *(Gomphrena pulchella)* Grama carraspera *(Eleusine indica)* Pasto cuaresma *(Digitaria sanguinalis)* Pasto moro *(Leptochloa filiformis)* Rama negra *(Conyza bonariensis)* Sacha verdolaga *(Boerhavia diffusa)* Sorgo de Alepo *(Sorghum halepense)* Verdolaga *(Portulaca oleracea)* Yuyo colorado *(Amaranthus quitensis)* Yuyo colorado *(Amaranthus palmieri)*	Según tipo de suelo: 1-suelos livianos 2000 cc/ha. 2- suelos pesados 2500 cc/ha.	(**)	Pre siembra, pre emergencia de soja y de las malezas

(*) Borreria (Borreria verticilata): de semilla.
(**) Debido a que el producto se aplica en barbecho, está exento del período de carencia.

Información General:

Recomendaciones de uso: (cultivo-plaga-momento de aplicación-dosis)
Es un herbicida selectivo para el control de ciertas malezas monocotiledóneas y dicotiledóneas en pre siembra, pre emergencia de soja. Es una mezcla de los ingredientes activos metolaclor y metribuzin. Metolaclor es un inhibidor de la biosíntesis de ácidos grasos de cadena larga, previene la división celular en las malezas emergentes. Metribuzin es un inhibidor del fotosistema II que conduce a la interrupción de la fotosíntesis y en última instancia, muerte de la planta.

Preparación:
Limpiar a fondo el equipo de aspersión antes de usar el producto.
La agitación vigorosa es necesaria para mantener la uniformidad de la mezcla durante la pulverización. Enjuagar a fondo el equipo de aspersión después de cada uso y aplicar el agua de enjuague a un área previamente tratada.

Equipos, Volúmenes Y Técnicas De Aplicación:
Debe ser aplicado en el volumen necesario para cubrir uniforme y satisfactoriamente el área a tratar. Puede ser aplicada por equipo terrestre y aéreo. Utilizar un mínimo de 100 L/Ha. de mezcla de pulverización para la aplicación terrestre y 50 L/Ha. para aplicaciones aéreas. Utilizar la presión necesaria para no generar deriva y obtener 20 a 30gotas/cm^2.
Preparar solo mezcla de pulverización que es necesaria para la operación inmediata. La agitación vigorosa es necesaria para mantener la uniformidad de la mezcla de pulverización. No permita que la preparación repose durante la noche en el tanque de pulverización. Enjuague el equipo de aspersión a fondo después de cada uso.

Aplicación en Barbecho Químico antes de la siembra, de acuerdo al monitoreo de las especies a controlar. Debe ser activado por una pequeña cantidad de humedad del suelo después de la aplicación. Lluvias posteriores de 15-20 mm asegurarán la incorporación de los herbicidas a la matriz del suelo, garantizando su efectividad. En suelos con menos de 5% de materia orgánica y lluvias torrenciales en un corto periodo de tiempo, el producto puede estar expuesto a lixiviación disminuyendo su capacidad de control.
La limpieza del equipo después de la aplicación de éste producto es muy importante.

RESTRICCIONES DE USO:
No aplicar en suelos de pH 7.0 o mayores. No aplicar a cualquier suelo con materia orgánica de menos de 2%.
No se recomienda la aplicación en pre emergencia del cultivo en suelos livianos con más de 80% de arena y menos de 2% de materia orgánica.

Se recomienda dejar transcurrir un mínimo de 4-5 meses luego de la aplicación del producto para la siembra de alfalfa y cereales de invierno, 8 meses para maíz, arroz; y un mínimo de 12 meses para sorgo, girasol, maní, caña de azúcar y colza. Otros cultivos no listados aquí, consultar.

"En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia"

Compatibilidad:
Es compatible con la mayoría de los fitoterapicos. Sin embargo, la compatibilidad física debe ser probada antes de su uso.
Para determinar la compatibilidad física con otros productos, realice pruebas pertinentes.
Fitotoxicidad:
En lo que respecta a la fitocompatibilidad del producto con los cultivos estudiados, puede afirmarse que no se han observado signos de toxicidad hacia el cultivo ocasionado en su uso como pre-emergente.

Clasificación (modo o sitio de acción): C1(HRAC) o 5(WSSA) + K3(HRAC) o 15(WSSA)

Información Toxicológica:

Toxicidad oral aguda: DL50: 1098 mg/kg
Toxicidad dermal aguda: L50: > 5000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda: CL50: > 2,07 mg/l

Irritación dermal: Severo irritante dermal
Irritación ocular: Moderado irritante
Sensibilización dermal: No sensibilizante

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
ADAMA TAILWIND	ADAMA ARGENTINA SA	39.290	EC	15%+63%	II