METRIBUZIN + S - METOLACLORO

Marcas comerciales: BLONTER - ADAMA TAILWIND MAX - BOUNDARY.

Nomenclatura Química:
Metribuzin: 4-amino-6-tert-butil-4,5-dihidro-3-metiltio-1,2,4-triazin-5-ona
S-metolacloro: (S)-2-cloro-N-(2-etil-6-metil-fenil)-N-(2-metoxi-1-metil-etil)-acetamida o Mezcla (80 mín.: 20 máx.) de: (1S) – 2-cloro-6-etil-N- (2-metoxi-1-metiletil)aceto-o- toluidida, (1R)-2-cloro-6-etil-N-(2-metoxi-1-metiletil)aceto-o-toluidida.
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: triazinona + cloroacetamida.
Acción: sistémica y residual.

Uso: herbicida (pre-emergente).

Cultivo	Maleza	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Soja	Capín *(Echinochloa colonum)* Chloris *(Chloris virgata)* Pasto cuaresma *(Digitaria sanguinalis)* Pata de gallina *(Eleusine indica)* Yuyo colorado *(Amaranthus palmeri)* Yuyo colorado *Amaranthus quitensis)*	Suelos livianos (*): 1,5 cm3/ha. Suelos medianos: 2 cm3/ha. Suelos pesados: 2,5 cm3/ha.	(**)	Aplicar en pre-emergencia del cultivo y de las malezas.
Papa	Abrojo grande (*Xanthium cavanillesii*) Ataco, Amaranto *(Amaranthus sp.)* Pasto cuaresma (*Digitaria sanguinalis*) Pata de gallina (*Eleusine indica*) Quinoa, Quinoa blanca (*Chenopodium album*) Verdolaga (*Portulaca oleracea*)	Suelos livianos (*), medios y pesados: 2-2,5 L/ha		

(*) No aplicar en lomas arenosas con más de 65% de arena y/o con bajos contenidos de materia orgánica
(**) No se establece período de carencia por su uso posicionado como herbicida

Información General:

Herbicida pre-emergente para el control de *Amaranthus spp., Chloris virgata, Digitaria sanguinalis,Echinochloa colonum, Eleusine indica* en el cultivo de soja. *Eleusine indica, Digitaria sanguinalis, Amaranthus sp., Chenopodium album, Portulaca oleracea y Xanthium cavanillesii* en el cultivo de papa.
Combina la acción de dos principios activos, s-metolacloro y metribuzin. El s-metolacloro, perteneciente a la familia química de las cloracetamidas inhibe la síntesis de ácidos grasos de cadena muy larga. Se absorbe principalmente por el coleóptile y radícula en gramíneas anuales y por hipocótile y radícula en malezas de hoja ancha en germinación. El metribuzín, perteneciente a la familia química de las triazinonas, inhibe el proceso fotosintético interfiriendo en el transporte de electrones en el fotosistema II. Se absorbe principalmente por radícula.
Se recomienda el uso del producto para el control de *Amaranthus spp*., no solo por su alta eficacia en la maleza, sino también por ser una opción de prevención y manejo de resistencia por contar con dos activos de diferente modo de acción.

Preparación:
Concentrado emulsionable en agua. Para una correcta preparación, respetar las siguientes instrucciones:
- Agregar agua al tanque de la pulverizadora, hasta la mitad de su volumen.
- Poner a funcionar el sistema de agitación.
- Agregar la cantidad necesaria de producto directamente al tanque y sin dilución previa, de acuerdo a la calibración realizada.
- Completar el tanque con agua hasta el volumen final.
- Verificar que el sistema de agitación funcione en todo momento.
- Usar el producto dentro de las 24 horas de haber realizado la mezcla de tanque, ya que la efectividad puede reducirse debido a la degradación del producto.
- Re-agitar el caldo antes de reanudar la aplicación.
- Utilizar siempre agua limpia.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: el producto debe ser aplicado en el volumen necesario para cubrir uniforme y satisfactoriamente el área a tratar. Se debe lograr una cobertura de al menos 20-30 gotas/cm2.
Aplicaciones terrestres: Aplicar un volumen de 100 - 120 litros/ha, con presión de 2-2,8 bar (30-40 lb/pulg^2) y picos de abanico plano. Corroborar que picos y filtros estén en buen estado y que la barra del equipo pulverizador sea ajustada a la altura suficiente para garantizar una cobertura completa. Suspender las aplicaciones con vientos superiores a los 15 km por hora.
Antes de iniciar cualquier tratamiento, es imprescindible verificar el correcto calibrado del equipo y el buen funcionamiento de picos (filtros y pastillas), reemplazando las partes defectuosas. Mantener el sistema de agitación en movimiento en todo momento.

Evitar la superposición de franjas durante la pulverización. Evitar la deriva hacia cultivos linderos. No realizar aplicaciones con altas temperaturas, baja humedad, vientos fuertes, presencia de rocío o ante probabilidades de lluvia.

Recomendaciones de uso: el producto debe ser aplicado en pre-emergencia, antes de que emerja el cultivo y las malezas. Es importante tener en cuenta que este producto no ejercerá control si es aplicado sobre malezas emergidas.
Se debe realizar la aplicación sobre el terreno húmedo, antes o después de una lluvia o del riego. Períodos prolongados sin lluvias luego de la aplicación, pueden reducir la actividad del herbicida. En caso de nacimiento de malezas por falta de lluvias, se las debe controlar mediante una rastra rotativa o a través de la aplicación de un herbicida postemergente selectivo. Es conveniente perturbar lo menos posible el terreno tratado, para evitar que el herbicida pierda su eficacia al ser cubierto por suelo sin tratar. Sin embargo, y de considerarlo necesario, pueden hacerse labores superficiales para mullir el suelo y evitar su excesiva compactación.

Restricciones de uso:
Periodo de carencia: no se establece período de carencia por su uso posicionado como herbicida. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia. No aplicar en lomas arenosas con más de 65% de arena y/o con bajos contenidos de materia orgánica.
No reingresar al área tratada hasta que el producto se haya secado de la superficie.

Prevención y manejo de resistencias

El producto formulado pertenece a los grupos 5 y 15 de los herbicidas.
Para prevenir la selección de plantas naturalmente resistentes a un herbicida, deben respetarse las recomendaciones de uso (dosis y momento de aplicación) detalladas en el marbete. Debe evitarse el uso de un único grupo de herbicidas en la estrategia de manejo de malezas en el lote, mediante la combinación con otros herbicidas de diferente número de grupo en mezcla de tanque o aplicaciones secuenciales.
Para controlar un biotipo resistente a un herbicida, será necesario aplicar otro producto efectivo, de diferente número de grupo. Utilizarlo a la dosis que indique el marbete para esa especie, y adoptar todas las prácticas de manejo que sean necesarias para mantener controlado ese biotipo a lo largo del ciclo del cultivo.

Compatibilidad: es compatible con la mayoría de los productos del mercado, no obstante, antes de utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala, para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos.

No ha manifestado síntomas de fitotoxicidad en los cultivos registrados, siguiendo las dosis y recomendaciones que figuran en esta etiqueta. Puede provocar fitotoxicidad hacia el cultivo en suelos con altos contenidos de arena (franco-arenoso y arenoso-franco) y/o con bajos contenidos de materia orgánica.

Derrames:
Cubrir los derrames con material absorbente (tierra o arena). Barrer el producto adsorbido y recoger en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa.

Clasificación (modo o sitio de acción): 5 (HRAC) + 15 (HRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Para su seguridad durante la aplicación y preparación: utilizar ropa protectora adecuada, botas de goma, protección facial y guantes impermeables. Evitar el contacto con el pulverizado. No destapar picos ni boquillas con la boca. No comer, beber ni fumar durante el trabajo.
Para su seguridad después del tratamiento: cambiarse y lavar la ropa inmediatamente. Lavarse adecuadamente con abundante agua y jabón. Guardar el sobrante del producto en su envase original, bien cerrado.

Información Toxicológica:

Del producto formulado:
DL 50 oral aguda: > 2000 mg/kg
DL 50 dermal aguda: > 2000 mg/kg (conejo)
CL 50 Inhalación: >4,96 mg/l

No irritante dermal. Severo irritante ocular.
Sensibilizante dermal. El contacto prolongado o frecuente con la piel puede causar reacciones alérgicas en algunas personas.
No se reconoce antídoto específico. Aplicar terapia sintomática.

Riesgos ambientales:
Moderadamente tóxico para peces y organismos acuáticos.
Evitar que el producto entre en contacto con ambientes acuáticos. Dejar una zona o franja de seguridad de 1 metro entre el área a tratar y el agua libre en superficie cercana.
NO contaminar el agua de riego, ni tampoco receptáculos como lagos, lagunas y diques.
NO contaminar fuentes de agua cuando se elimine el líquido de limpieza de los equipos de pulverización y asperjar el caldo remanente sobre campo arado o camino de tierra.
Virtualmente no tóxico para abejas.

Evitar la aplicación en las horas de mayor actividad de las mismas. Si es posible, retirar las colmenas cercanas a 4 km del área de aplicación por un tiempo mínimo de 30 días, o entornar las piqueras durante la aplicación.
Prácticamente no tóxico para aves.
NO contaminar forrajes, estanques ni cursos de agua.
NO aplicar, drenar o enjuagar el equipo utilizando cerca de plantas deseables, ni en áreas donde puedan extender sus raíces, ya que pueden resultar dañadas. Evitar la deriva durante las aplicaciones.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
ADAMA TAILWIND MAX	SYNGENTA AGRO	40311	EC	14,9% + 62,8%	III
BLONTER	SYNGENTA AGRO	40729	EC	14,9% + 62,8%	III
BOUNDARY	SYNGENTA AGRO	39245	EC	14,9% + 62,8%	III

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.