ESPIROMESIFEN

Marcas comerciales: OBERON.

Nomenclatura Química:
espiromesifen: Butanoic acid, 3, 3-dimethyl- 2 -oxo- 3-(2,4,6-trimethylphenyl)-1-oxaspiro[4.4]non-3-en-4-yl ester (9CI.
4-hydroxy-3-(2,4,6-trimethylphenyl) 1-Oxaspiro[4.4]non-3-en-2-one (este es el nombre IUPAC)
Clasificación Química: ácido tetrónico.
Acción: sistémica.

Uso: acaricida y insecticida.

Cultivo	Maleza	Dosis	Momento de Aplicación
Soja	Arañuela roja *(Tetranichus urticae)*	300 a 500 cc/ha	Momento ideal de aplicación: cuando la plaga no supere el 30% de la altura total de la planta. Utilizar la menor dosis en esta situación. Aplicar la dosis mayor si la plaga ocupa entre el 50 % y el 60% de altura del cultivo.

Información General:

Espiromesifen es un insecticida y acaricida que actúa inhibiendo la enzima acetil-CoA carboxilasa que cataliza la síntesis de malonil-CoA que es un paso fundamental en la síntesis de ácidos grasos. Este nuevo modo de acción y la ausencia de resistencia cruzada con productos comerciales.

Preparación y equipos:
Llenar la mitad del tanque con agua, conectar el retorno, agregar la dosis indicada, completar el volumen total con agua. Mantener los agitadores o el retorno prendidos.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación
Evitar las horas de mayor insolación y menor humedad relativa, ya que se produce la evaporación del agua utilizada como vehículo en el caldo de aplicación.
Se recomienda no aplicar con menos de 50% de HR (Humedad Relativa). La temperatura no debe sobrepasar los 30-35 °C y vientos no mayores a 12 Km/h.
Verificar el correcto funcionamiento de los agitadores del equipo de aplicación. Es importante lograr un buen mezclado del vehículo (agua) con el producto, para que la dosis aplicada sea homogénea en toda la superficie.
Aplicaciones terrestres: El objetivo es obtener 50 gotas/ cm2, en el estrato medio del cultivo. El tamaño de gotas recomendado es entre 200 y 250 micrómetros (DVM - Diámetro Volumétrico Medio). Para determinar este número de gotas es necesario el uso de tarjetas hidrosensibles. Esta cobertura, expresada en gotas/ cm2 puede lograrse con diferentes caudales. En aplicaciones terrestes es necesario aplicar el producto con 300 cc/ha de Optimizer o 500 cc/ha de aceite agrícola mineral. Se recomienda el uso de pastillas de cono hueco en buen estado.
Aplicaciones aéreas: Utilizar caudales de 10 a 15 lts/ha, con el agregado de 1 a 1,5 lt de aceite agrícola. Se debe lograr 50 gotas/cm2, en el estrato medio del cultivo. Para determinar este número de gotas es necesario el uso de tarjetas hidrosensibles.

Compatibilidad:
Es compatible con la mayoría de los insecticidas comúnmente usados. Sin embargo se recomienda que antes de preparar mezclas de formulaciones con otros agroquímicos en tanque, se compruebe su compatibilidad física al mezclarlos en un recipiente pequeño.

Fitotoxicidad:
A las dosis recomendadas no se han manifestado síntomas de fitotoxicidad para el cultivo de soja..

Derrames:
Recoger el producto previa ligazón con material absorbente (ej: tierra, aserrín, turba, aglutinantes de productos químicos) e introducirlo en recipientes cerrados e identificados para su posterior destrucción. Luego lave con abundante agua y jabón el área contaminada.

Clasificación (modo o sitio de acción): 23 (IRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Se recomienda utilizar guantes, ropa de protección adecuada, anteojos y protección respiratoria durante la preparación y/o aplicación.

Información Toxicológica:

Toxicidad oral aguda (rata): DL50: > 2000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata): DL50: > 4000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata): CL50: > 2.759 mg/l

Irritación dermal (conejo): No irritante
Irritación mucosas (conejo): No irritante

Sensibilización dermal (cobayos): Sensibilizante

Riesgos ambientales
Toxicidad para abejas: Ligeramente tóxico
Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico
Toxicidad para peces: Extremadamente tóxico

No aplicar directamente sobre espejos de agua ni en áreas donde existe agua libre en superficie. Dejar una franja de seguridad de al menos 2 metros entre la zona tratada y el espejo de agua. Evitar derrames en cursos de agua y no contaminar fuentes de agua con el enjuague de los equipos.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
OBERON	BAYER	39409	SC	24%	III