IMIDACLOPRID + BIFENTRIN + ABAMECTINA

Marcas comerciales: BOOMER.

Nomenclatura Química:
imidacloprid: N-[1-[(6-Chloro-3-pyridyl)methyl]-4,5-dihydroimidazol-2-yl]nitramida
bifentrin: 2-methylbiphenyl-3-ylmethyl (1RS,3RS)-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate
abamectina: mezcla de:(10E,14E,16E)-(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-6′-[(S)-sec-butyl]-21,24-dihydroxy-5′,11,13,22-tetramethyl-2-oxo-(3,7,19-trioxatetracyclo[15.6.1.14,8.020,24]pentacosa-10,14,16,22-tetraene)-6-spiro-2′-(5′,6′-dihydro-2′H-pyran)-12-yl 2,6-dideoxy-4-O-(2,6-dideoxy-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranosyl)-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranoside y (10E,14E,16E)-(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-21,22-dihydroxy-6′-isopropyl-5′,11,13,22-tetramethyl-2-oxo-(3,7,19-trioxatetracyclo[15.6.1.14,8.020,24]pentacosa-10,14,16,22-tetraene)-6-spiro-2′-(5′,6′-dihydro-2′H-pyran)-12-yl 2,6-dideoxy-4-O-(2,6-dideoxy-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranosyl)-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranoside
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: neoninicotínico + piretroide + avermectina.
Acción: sistémica, de contacto e ingestión.

Uso: acaricida, insecticida.

Cultivo	Adversidad	Dosis	Momento de Aplicación
Soja	Alquiche chico (*Edessa meditabunda*) Arañuela roja (*Tetranychus urticae*) Chinche de la alfalfa (*Piezodorus guildinii*) Chinche de los cuernos (*Dichelops furcatus*) Chinche verde (*Nezara viridula*) Falsa oruga medidora (*Pseudoplusia includens*) Oruga capullera (*Helicoverpa gelotopoeon*) Oruga de las leguminosas (*Anticarsia gemmatalis*) Oruga medidora (*Rachiplusia nu*) Oruga militar tardía (*Spodoptera spp*) Picudo de la soja (*Sternechus subsignatus*) Picudo negro (*Rhissomatus subtilis*) Trips (*Thrips spp.)*	200-250 cc/ha	Arañuelas: Aplicar al inicio de infestación, cuando se encuentren 5 ninfas por hoja trifoliada. Utilizar con una incidencia menor al 50% de hojas con presencia de la plaga. Chinches: Aplicar cuando se encuentre 1 chinche/m2. Lepidopteros: Aplicar al llegar al umbral de 10 orugas menores a L3 por m2. Picudos: Comenzar la aplicación al observar 2 adultos por m2. Trips: Aplicar con un promedio de 5 ninfas por foliolo.

Información General:

Es un insecticida que actúa por contacto, ingestión y por vía sistémica. Combina la doble acción de sus principios activos. El Imidacloprid es un insecticida del grupo de los neonicotinoides que interfiere la transmisión de los estímulos nerviosos del sistema nervioso central de los insectos, Bifentrin es un insecticida piretroide que actúa por contacto e ingestión sobre lepidópteros, hemípteros, homópteros y otros órdenes de importancia agrícola. Abamectina es un acaricida-insecticida de origen natural, que actúa por ingestión y por contacto directo y de movimiento traslaminar.

INSTRUCCIONES PARA EL USO:
PREPARACIÓN:
Completar el tanque del equipo de aplicación hasta la mitad de su capacidad y agregar luego la dosis indicada. Finalmente completar la capacidad total del equipo con agua. En todo momento se deben mantener los agitadores en movimiento.
No aplicar con gasoil.

EQUIPOS, VOLÚMENES Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN:
Aplicaciones terrestres: Máquinas pulverizadoras convencionales. La presión de los picos no debe ser inferior a 2,1 Kg/cm2 (30 libras/pulgada2) y el caudal de aplicación debe ser de no menos de 100-120 litros/ha.
Es indispensable lograr una cobertura total y uniforme del lote, logrando 50-70 impactos por cm2 en la parte media del cultivo.

Aplicaciones aéreas: El volumen mínimo de aplicación es de 10-12 L/ha. Mas el agregado de 0.5% de aceite mineral.

Esperar que el rocío se seque antes de aplicar, para no diluir el producto y no disminuir la concentración aplicada. La aplicación debe realizarse con condiciones climáticas favorables. No aplicar en horas de máxima insolación. No aplicar con vientos superiores a 10 km/ha. No mezclar con gasoil.

RESTRICCIONES DE USO:
Entre la última aplicación y la cosecha deberán transcurrir por lo menos 30 días.
“En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia”

COMPATIBILIDAD:
Puede aplicarse sin inconveniente alguno en mezcla de tanque con insecticidas y funguicidas neutros de uso común.
No realizar mezclas con productos de reacción fuertemente alcalina. Para la mezcla con otros plaguicidas deben realizarse pruebas previas que demuestren la compatibilidad entre los productos y de la mezcla con el cultivo.

FITOTOXICIDAD:
No resulta fitotóxico utilizado en las condiciones indicadas en el marbete.

Derrames:
Aislar el área y negar la entrada a personas que no sean necesarias, manteniéndolas fuera. Utilizar los elementos de protección personal recomendados para este producto. Evitar que el producto alcance corrientes o fuentes de agua. Hacer endicamientos de manera de confinar el derrame y recogerlo con material absorbente (aserrín de madera, arena, tierra, etc.). Colocar en un recipiente identificado para proceder a su disposición final.

Clasificación (modo o sitio de acción): 4 (IRAC) + 3 (IRAC) + 6 (IRAC).

Información Toxicológica:

Del producto BOOMER:
ADVERTENCIAS PARA EL MEDICO: Clase II. Producto moderadamente peligroso. LEVE IRRITANTE OCULAR (CUIDADO) CATEGORIA IV. Tratamiento sintomático y dar terapia de soporte. No hay antídoto específico.

RIESGOS AMBIENTALES:
Aves: Moderadamente tóxico.
Peces: Moderadamente tóxico.
Abejas: Altamente tóxico.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
BOOMER	ADAMA ARGENTINA SA	39289	SC	30% + 7,5% + 2,1%	II

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.