FLUMIOXAZIN + CLORIMURÓN ETIL

Marcas comerciales: INTRISIC.

Nomenclatura Química:
flumioxazin: N-(7-fluoro-3,4-dihydro-3-oxo-4-prop-2-ynyl-2H-1,4 benzoxazin-6-yl)cyclohex-1-ene-1,2dicarboximide
clorimuron etil: ethyl 2-(4-chloro-6-methoxypyrimidin-2ylcarbamoylsulfamoyl)benzoate
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: N-fenil-ítalimidas + sulfonilurea.
Acción: de contacto y residual.

Uso: herbicida.

Cultivo	Adversidad	Dosis	Momento de Aplicación
Barbecho quimico soja Pre-siembra de soja	Abrojo grande (*Xanthium cavanillesii*) Albahaca silvestre (*Galinsoga parviflora*) Amaranto palma (*Amaranthus palmeri*) Borreria (*Borreria spp.*) Capín arroz (*Echinochloa crus-galli*) Chamico (*Datura ferox*) Chinchilla (*Tagetes bonariensis*) Chloris (*Chloris spp.*) Cien nudos (*Polygonum aviculare*) Cola de zorro (*Setaria spp.)* Enredadera anual (*Polygonum convolvulus*) Malva blanca (*Sphaeralcea bonariensis*) Malva cimarrona (*Anoda cristata*) Mostacilla (*Myagrum rugosum*) Nabo (*Brassica campestris*) Nabón (*Raphanus sativus*) No me olvides (*Anagallis arvensis*) Pappophorum (*Pappophorum spp.*) Pasto colorado (*Echinochloa colonum*) Pasto de cuaresma (*Digitaria sanguinalis*) Pata de gallina (*Eleusine indica*) Quinoa blanca (*Chenopodium album*) Rama negra (*Conyza bonariensis*) Saetilla (*Bidens pilosa*) Siempreviva (*Ghomphrena spp.*) Verdolaga (*Portulaca oleracea*) Yuyo colorado (*Amaranthus quitensis*)	250 g/ha	Barbecho Químico/Pre-Siembra del cultivo: Aplicaciones en PEE de malezas. Desde 30 hasta 7 días antes de la siembra del cultivo de Soja. Aplicar estrictamente antes de la emergencia de la maleza. En el caso de malezas emergidas se recomienda la limpieza previa del lote mediante la aplicación de un herbicida post-emergente de la maleza siguiendo las recomendaciones de la etiqueta.

Información General:

Es un herbicida de contacto y residual en el suelo que contiene dos sustancias activas en su formulación, flumioxazin y clorimuron etil. El flumioxazin, controla un amplio rango de malezas de hoja ancha y supresión de gramíneas anuales, sobre todo en lotes de alta infestación y con presencia de especies difíciles. Cuando el flumioxazin llega al suelo forma una delgada barrera dentro de los primeros centímetros, lo cual produce necrosis en las malezas que germinen con posterioridad. El clorimuron etil,

perteneciente al grupo químico de las sulfonilureas, actua en forma pre y post emergente, en para el control de malezas de hoja ancha y algunas gramíneas inhibiendo la división y crecimiento celular.
El producto comenzará a mostrar su acción herbicida residual una vez que haya ingresado e incorporado a la solución del suelo. Para ello es necesaria la ocurrencia un evento de lluvias de entre 20-25 mm. Luego de la incorporación del producto, el perfil del suelo deberá presentar humedad suficiente para que el herbicida permanezca en la solución del suelo y pueda ser absorbido por las raíces de las malezas.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:
Las aplicaciones pueden realizarse con equipos pulverizadores terrestres y aéreos. Para conseguir un buen resultado de la aplicación se deben lograr 30-50 gotas/cm2 de follaje. Los mejores resultados se obtienen cuando la aplicación se realiza sobre malezas en activo crecimiento y que no estén bajo efectos de sequía, enfermedades o cualquier otro factor adverso a su normal desarrollo. Evitar las aplicaciones sobre malezas con tierra sobre el follaje, ya que impide la absorción del producto. No pulverizar si se prevén lluvias durante las seis horas posteriores a la aplicación o cuando el follaje de las malezas esté mojado. No aplicar en condiciones de alta temperatura (>30°C) y baja humedad relativa (>50%).

Manejo de la deriva: Evitar la deriva de la neblina de pulverización. El potencial de deriva aumenta cuanto mayor es la velocidad del viento, y también cuando se dan condiciones muy calmas (por inversión térmica). Asimismo, cuando las condiciones ambientales al momento de la aplicación son de altas temperatura y baja humedad relativa se facilita la deriva. Las medidas elementales para minimizar este efecto son: procurar no aplicar con vientos superiores a 8-10 km/h. o inferiores a 3 km/h. (por riesgo de inversión térmica), disminuir la altura de la barra de aplicación (mínima altura que permita una pulverización uniforme) y pulverizar gotas de gran diámetro (≥200 micras); esto último se logra empleando el mayor volumen y la menor presión recomendados.

Aplicaciones en cobertura total con equipos pulverizadores terrestres debe utilizarse la dosis recomendada, diluida en agua limpia, a razón de 100-150 l/ha. Las pastillas recomendadas son las de abanico plano (Nº 80-03; 80-02; 110-02; 110-03) trabajando a una presión entre 25 y 40 lb/pulg2.

Aplicaciones aéreas se deben aplicar volúmenes totales entre 20 y 30 litros por hectárea (dosis de producto más agua); observando las precauciones habituales en cuanto al horario y altura de vuelo, tamaño de gotas y orientación de los picos y condiciones meteorológicas. Importante: No utilizar el producto cuando se prevean lluvias durante las 6 horas posteriores a la aplicación o cuando el follaje de las malezas esté mojado.

Restricciones de uso: Período de carencia: exento (uso posicionado previo a la implantación del cultivo).
“En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.
“El presente producto debe ser comercializado y aplicado dando cumplimiento a las normativas provinciales y municipales correspondientes”.

Tiempo de reingreso: no reingresar al área tratada antes de las 24 horas de la aplicación.

Máximo número de aplicaciones y dosis: No realizar más de 1 aplicación por ciclo de cultivo (250 g/ha x año).

Rotación de cultivos
El producto está destinado para el control de malezas en Barbechos Químicos de lotes destinados a soja. En la secuencia de rotación que sigue a la soja pueden sembrarse los siguientes cultivos: trigo, cebada, avena, maíz, girasol, sorgo, soja. Entre la aplicación del producto y la siembra de los siguientes cultivos que rotan con la soja deben transcurrir al menos 180 días.

Resiembras: En caso de necesidad de resiembra con anterioridad a los 180 días, solo deberá realizarse siembra de soja.

Compatibilidad: El producto es compatible con productos residuales o sistémicos formulados como concentrados solubles y concentrados emulsionables. Se ha observado un retraso en la actividad del producto en mezclas con suspensiones acuosas, suspensiones concentradas, gránulos dispersables y polvos mojables. Los productos compatibles con el producto de la referencia deben estar recomendados para los mismos usos.

No realizar ninguna mezcla con otros productos sin realizar previamente una prueba en pequeña escala, de compatibilidad física y biológica de los componentes, y de fitotoxicidad para el cultivo.

Fitotoxicidad: El producto no es fitotóxico si se respetan las indicaciones mencionadas en este rótulo.

Derrames:
Producto sin preparar: recoger con pala el producto derramado y la capa superficial de suelo afectado y colocarlos en un recipiente; cubrir con solución de lavandina (0,5 litros cada 100 litros).
Caldo de pulverización: contener y absorber el derrame con un material inerte (arena, aserrín, tierra) y recoger con pala.
En ambos casos eliminar el material impregnado que se haya recogido, mediante incineración controlada en sitios especializados para tal fin, o llevar a empresas especializadas en el tratado de este tipo de residuos.

Clasificación (modo o sitio de acción): 2 (HRAC) + 14 (HRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Carga del equipo: protector facial, guantes de goma de neoprene o nitrilo y botas de goma, camisa de mangas largas y pantalones largos o enterizos de Tyvek®.

Aplicación: protector facial, guantes de goma de nitrilo, camisa de mangas largas y pantalones largos o enterizo de Tyvek™, gorra con protección para la nuca y calzado con medias.

Información Toxicológica:

Toxicidad oral aguda (rata): DL50 > 2000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata): DL50 > 2000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata): CL50 > 5,972 mg/l

Irritación cutánea: No irritante.
Irritación ocular: Moderadamente irritante.
Sensibilizacion dermal: No sensibilizante.

Riesgos ambientales:
Abejas: Virtualmente no tóxico.
Peces: Practicamente no tóxico.
Aves: Practicamente no tóxico.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
INTRISIC	CORTEVA AGRISCIENCE ARGENTINA SRL	39272	WG	30% + 103%	III

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.