CYMOXANIL + FAMOXADONE

Marcas comerciales: EQUATION PRO.

Nomenclatura Química:
cymoxanil: 2-cyano-N-[(ethylamino)carbonyl]-2-(methoxyimino)acetamide.
famoxadone: 5-Methyl-5-(4-phenoxyphenyl)-3-(phenylamino)-2,4-oxazolidinedione
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: cianoacetamida-oxima + oxazolidina-diones.
Acción: sistémica.

Uso: fungicida.

Cultivo	Adversidad	Dosis	Momento de Aplicación
Papa	Tizón temprano (*Alternaria solani*)	500-600 g/ha	Iniciar las aplicaciones en forma preventiva cuando las condiciones sean predisponentes para el desarrollo del patógeno. Repetir cada 7 días. Se recomienda realizar 2 aplicaciones consecutivas, rotando luego con activos con diferente modo de acción y eficaces en el control de Alternaria.
	Tizón tardío (*Phytophtora infestans*)	600 g/ha	Iniciar las aplicaciones en forma preventiva cuando las condiciones sean predisponentes para el desarrollo del patógeno. Repetir cada 7 días. Se recomienda realizar 3-4 aplicaciones (máximo 2 sucesivas) rotando con activos con diferente modo de acción y eficaces en el control de Phytophthora.

Información General:

Fungicida de uso agrícola formulado como gránulos dispersables, para el control preventivo de las enfermedades detalladas en esta etiqueta en el cultivo de papa.
Combina la acción de dos principios activos, famoxadone y cymoxanil, que poseen diferentes modos de acción y actúan en puntos distintos en el metabolismo de los patógenos, siendo una excelente combinación para el manejo de resistencia. Famoxadone permanece adherido en las capas de cera de la superficie de la cutícula, evitando el lavado, mientras que el cymoxanil penetra rápidamente en el tejido de la planta. El famoxadone previene la diferenciación de los esporangios en zoosporas, inhibe la movilidad de las zoosporas y les ocasiona la lisis en cuestión de minutos.
El cymoxanil es una molécula fungicida que actúa en forma sistémica, translaminar, acropétala con acción multisitio, actuando sobre cuatro diferentes procesos metabólicos de los hongos Oomicetes, los cuales son: respiración, biosíntesis de aminoácidos, metabolismo de la uridina y permeabilidad de las membranas.
Es más eficaz cuando se aplica preventivamente o en las primeras etapas de la infección, antes que los síntomas sean visibles en las plantas.

Instrucciones para el uso
Preparación
Herbicida formulado como gránulos dispersables. Para su preparación se aconseja seguir los siguientes pasos:
1. Cargar el tanque de la pulverizadora con agua limpia o filtrada, hasta ½- ¾ de su capacidad.
2. Poner el agitador en marcha y agregar directamente al tanque de aplicación la cantidad requerida del producto según dosis de uso y superficie a tratar.
3. Mezclar enérgicamente con el agitador para dispersar completamente el producto.
4. Completar la carga de agua del tanque, y mantener el removedor o el retorno en funcionamiento para lograr la total homogeneidad del preparado.
- Se debe mantener el agitador en funcionamiento durante toda la pulverización.
- Preparar únicamente el producto estimado para aplicar en el momento. No es conveniente dejar producto preparado de un día para el otro.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación
Debe aplicarse al cultivo con el volumen necesario para lograr una buena cobertura. Se recomienda utilizar la cantidad de agua necesaria de acuerdo al estado de desarrollo del cultivo, a fin de lograr una muy buena cobertura del mismo; evitar que se produzca escurrimiento por exceso de agua.
Puede ser aplicado con equipos terrestres.
Para realizar las aplicaciones se deben utilizar caudales no inferiores a 400 litros de agua por hectárea, trabajando con una presión de 50-80 libras/pulgada2 (5,5 - 7 bar) para lograr una buena penetración del producto y mojado del cultivo.
Es recomendable una aplicación que logre una distribución uniforme de gotas en la superficie foliar y cuyo tamaño sea lo más homogéneo posible. Los picos más aptos para tal fin son los de cono hueco y doble abanico plano, que producen gotas de entre 100 y 250 micrones. Se deben lograr entre 40 y 60 impactos/cm2 de la superficie foliar.
Antes de aplicar es necesaria la calibración del equipo con agua, a velocidad y presión constantes, en un terreno de iguales características al sitio de aplicación.

Restricciones de uso
Se debe respetar el siguiente intervalo entre la última aplicación y la cosecha: Papa: 30 días.
“El presente producto debe ser comercializado y aplicado dando cumplimiento a las normativas provinciales y municipales correspondientes.”
Tiempo de Reingreso: puede reingresarse a los lotes tratados luego de transcurridas 12 horas de la aplicación. Si fuese necesario entrar antes de ese tiempo, utilizar pantalón largo y camisa de mangas largas, botas de goma con medias y guantes.

Advertencias
Fungicida exclusivamente para uso agrícola. No utilizar en cultivos ornamentales, hidropónicos o cualquier otro uso distinto de lo indicado en esta etiqueta.
No debe aplicarse si se prevén lluvias dentro de las 3 horas luego de la aplicación.
No debe aplicarse en cultivos sometidos a estrés producto de sequías, bajas temperaturas, ataque de insectos, deficiencias minerales, etc.

Rotación de cultivos
No presenta restricciones de rotación.

Derrames:
Mantener alejados a personas y animales. No fumar. Contener y absorber el derrame con un material inerte (aserrín, arena, tierra), recogerlo con pala junto con la capa superficial de suelo afectada y colocarlos en un recipiente; cubrir con solución al 1% de agua amoniacal (1 litro cada 100 litros de agua). El producto debe ser enviado a un establecimiento adecuado para su debido tratamiento.

Clasificación (modo o sitio de acción): 27 (FRAC) + 11 (FRAC)

Información Toxicológica:

Toxicidad oral aguda(rata): DL 50 1333 mg/kg
Toxicidad dermal aguda(rata): DL 50 > 5000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda(rata): CL 50 > 5,1 mg/l

Irritación dermal: Leve irritante
Irritación ocular: Moderado irritante
Sensibilización dermal: Sensibilizante

Riesgos ambientales
Toxicidad para abejas: Virtualmente no tóxico
Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico
Toxicidad para peces: Muy tóxico.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
QUATION PRO	CORTEVA AGRISCIENCE ARGENTINA SRL	39344	WG	30% + 25%	II

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.