CLORIMURÓN ETIL + SULFOMETURON METIL + FLUMIOXAZIN

Marcas comerciales: REMIGATE

Nomenclatura Química:
clorimurón etil: (etil 2-[[[[(4-cloro-6-metoxipirimidin-2-il)amino]carbonil]amino]sulfonil] benzoato)
sulfometurón metil: metil-2 [[[[(4-6 di-metil-2 -pirimidinil)amino]carbonil]amino]sulfonil] benzoato
flumioxazin: (N-(7-fluoro-3,4-dihidro-3-oxo-4-prop-2-inil-2H-1,4-benzoxazin-6-il) ciclohex-1-ene-1,2- carboxamida
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: sulfonilureas + N-fenilftalimidas
Acción: residual.

Uso: herbicida.

Cultivo	Adversidad	Dosis	Momento de Aplicación
Barbecho químico y Pre-siembra de Soja STS	Abrojo grande (*Xanthium cavanillesii)* Albahaca silvestre *(Galinsoga parviflora*) Altamisa colorada (*Descurainia argentina*) Amor seco (*Bidens pilosa*) Anagallis (*Anagallis arvensis*) Apio cimarrón (*Ammi majus*) Bolsa del pastor (*Capsella bursa pastoris*) Borreria (*Borreria spp.- Spermacoce spp.*) Capín (*Echinochloa colonum*) Capín (*Echinochloa crus-galli*) Capiquí (*Stellaria media*) Cardo (*Carduus acanthoides*) Cerraja (*Sonchus spp.*) Chamico (*Datura ferox*) Chinchilla (*Tagetes bonariensis*) Chloris (*Chloris spp.*) Cien nudos (*Polygonum aviculare*) Cola de zorro (*Setaria spp.*) Eleusine (*Eleusine indica*) Enredadera anual (*Polygonum convolvulus)* Flor de noche (*Oenothera indecora*) Gomphrena (*Gomphrena spp.*) Maíz guacho (*****) (*Zea mays*) Malva blanca (*Sphaeralcea bonariensis*) Malva cimarrona (*Anoda cristata*) Manzanilla (*Anthemis cotula*)	250 g/ha + Glifosato (dosis según formulación para este tipo de uso)	Barbecho químico y pre - siembra: Respetar 7 días entre aplicación y siembra.

	Marcela (*Gnaphalium cheiranthifolium*) Mastuerzo (*Coronopus didymus*) Mostacilla (*Myagrum rugosum*) Nabo (*Brassica campestris*) Nabón (*Raphanus sativus*) Ortiga (*Urtica urens*) Ortiga mansa (*Lamium amplexicaule*) Pappophorum (*Pappophorum spp.*) Parietaria, Ocucha (*) (*Parietaria debilis*) Pasto de cuaresma (*Digitaria sanguinalis*) Peludilla (*Gamochaeta spicata)* Pensamiento silvestre (**) (*Viola arvensis*) Perejilillo (***) (*Bowlesia incana)* Quínoa, Quínoa blanca (*Chenopodium album)* Rama negra (*Conyza spp.)* Roseta (*Cenchrus pauciflorus)* Ryegrass (*Lolium multiflorum)* Urochloa (*Urochloa plantaginea)* Verdolaga (*Portulaca oleracea)* Yuyo colorado (****) (*Amaranthus palmeri)* Yuyo colorado (****) (*Amaranthus quitensis*)		

(*) Parietaria/ocucha (Parietaria debilis): Puede tener control parcial, dependiendo de las condiciones ambientales previas a la aplicación, estado de la maleza (emergida o no emergida), tipo de suelo, rastrojo, etc.
(**) Pensamiento silvestre (Viola arvensis): Aplicar antes de la emergencia de la maleza o con la maleza emergida, en estado de roseta de hasta 5-10 cm de diámetro, previo al estado de floración.
(***) Rama negra (Conyza spp): Aplicar antes de la emergencia de la maleza o con la maleza emergida en estado de roseta de hasta 10 cm de diámetro, previo a la emisión de la vara floral.
(****) Yuyo colorado (Amaranthus quitensis/Amaranthus palmeri): Aplicar estrictamente antes de la emergencia. En el caso de malezas emergidas se recomienda la limpieza previa del lote mediante la aplicación de un herbicida post-emergente siguiendo las recomendaciones del fabricante.
(*****) Maíz guacho (Zea mays): Control pre-emergente de individuos provenientes de semillas dispersas.

Información General:

Es un herbicida de uso agrícola, para el control de malezas de hoja ancha y gramíneas anuales en barbecho químico y pre-siembra de lotes destinados a variedades de soja identificadas como STS® (tolerantes a Remigate® y Ligate®). Tiene además actividad residual que permite el control de muchas malezas que germinan después del tratamiento.
El producto una vez aplicado es absorbido principalmente por las raíces durante la emergencia de las plantas, y por raíces y follaje en plantas ya emergidas, traslocándose a las zonas de activo crecimiento, e inhibiendo el desarrollo de las malezas susceptibles. Luego de la aplicación las plantas sensibles se tornan cloróticas y los puntos de crecimiento mueren, en un período de una a tres semanas dependiendo de las condiciones ambientales y grado de susceptibilidad de las malezas.
La efectividad es máxima cuando se aplica en pre-emergencia de las malezas o sobre plantas pequeñas, en activo crecimiento y cuando siguen al tratamiento buenas condiciones de humedad y temperatura. El grado de control y duración del efecto dependen del espectro, tamaño, densidad de las malezas. Además, influyen también propiedades físicas y químicas del suelo, cantidad de lluvia caída, cobertura del suelo y condiciones ambientales previas y posteriores a la aplicación.
Debe ser aplicado en mezcla de tanque con glifosato para el control de las malezas presentes al momento del tratamiento.
El producto comenzará a mostrar su acción herbicida residual una vez que haya ingresado en el suelo. Para ello es necesaria la ocurrencia un evento de lluvias de entre 20-25 mm. Luego de la incorporación del producto, el perfil del suelo deberá presentar humedad suficiente para que el herbicida permanezca en la solución del suelo y pueda ser absorbido por las raíces de las malezas.

Puede ser aplicado con cualquier equipo terrestre provisto con un agitador mecánico adecuado, o con una bomba capaz de producir un exceso de flujo, de modo de mantener una remoción constante a través del retorno. Deberán emplearse pastillas de abanico plano.
El volumen y la presión de aplicación deberá adecuarse para lograr un buen mojado de las malezas.
Es conveniente verificar el correcto funcionamiento del equipo previo a la aplicación y calibrarlo con agua, sobre el mismo terreno en que se va a utilizar. Número de gotas: (30-40 gotas / cm2, gotas de 300 a 500 micrones).

Tamaño de Maleza
Aplicar preferentemente en pre-emergencia de la maleza o con maleza emergida pequeña en estado vegetativo (rosetas de 5-10 cm máximo, en el caso de latifoliadas, o 2-3 hojas en el caso de gramíneas). Cuando las malezas presentes en el lote superen el tamaño indicado se debe realizar una aplicación previa con un producto de actividad por contacto.
En el caso específico de yuyo colorado la actividad del producto es solamente pre-emergente de la maleza. Por lo tanto, en lotes con yuyo colorado ya emergido se deberá realizar la aplicación de un herbicida post-emergente siguiendo las recomendaciones del fabricante.
En el caso de maíz guacho, el control es básicamente de preemergencia de individuos provenientes de semillas dispersas.

Condiciones ambientales
Aplicar con buenas condiciones de humedad que permitan el activo crecimiento de las malezas. No aplicar cuando las malezas estén bajo situaciones de estrés tales como sequía, bajas temperaturas o heladas, baja fertilidad, etc. porque el control puede ser deficiente y el cultivo puede resultar afectado.
En aplicaciones otoño-invernales el control puede extenderse aproximadamente a 100-150 días, dependiendo de las temperaturas, condiciones físico químicas del suelo, régimen de lluvias, etc.
En aplicaciones primaverales el período de control se extiende 60-90 días dependiendo también de las variables mencionadas anteriormente.

ADVERTENCIAS
• No aplicar en otra circunstancia distinta de las expresamente indicadas en las recomendaciones de uso.
• No aplicar en suelos con pH superiores a 7 ya que el producto tendrá una residualidad mayor, pudiendo afectar a los cultivos que sigan en la rotación.
• En aplicaciones de preemergencia, luego de la emergencia del cultivo, no aplicar insecticidas órgano-fosforados por un lapso de 14 días desde la aplicación ya que el cultivo puede ser dañado.
• No utilizar en lotes con suelos arenosos (conteniendo más de 50% de arena), y materia orgánica menor a 1%, cualquiera sea la rotación siguiente a la soja.

Rotación de Cultivos
Está destinado para el control de malezas en barbecho químico y pre-siembra de lotes que rotan exclusivamente con sojas STS®. En la secuencia de rotación que sigue a la soja STS® pueden sembrarse los siguientes cultivos: trigo, cebada, avena, maíz, girasol, sorgo, soja. En cada caso deben observarse los siguientes períodos mínimos desde la aplicación y la siembra: trigo, cebada, avena, soja (7 meses), maíz, girasol, sorgo (11 meses).
Otros cultivos de rotación están en evaluación en ensayos de rotación complementarios.
Resiembras: En caso necesidad de resiembra en la soja siguiente a la aplicación deberá utilizarse una variedad de soja STS®.
Máximo número de aplicaciones: No realizar más de una aplicación por ciclo de cultivo.

COMPATIBILIDAD
Es incompatible con insecticidas productos de fuerte reacción alcalina. Es compatible con glifosato en sus formulaciones mas frecuentes.
Antes de utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala, para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos. Los productos compatibles a ser utilizados junto con este producto deben estar registrados para ese uso particular.

FITOTOXICIDAD
El producto no es fitotóxico para la soja STS® a las dosis y en las condiciones de aplicación recomendadas.

Derrames:
Contener y absorber el producto derramado con material inerte (tierra, arena o aserrín). A continuación, barrer y recoger el mismo en bolsas o recipientes correctamente rotulados para su posterior destrucción por empresas autorizadas para tal fin. Lavar con abundante agua y jabón el área contaminada. Evitar que el derrame contamine aguas de riego y/o de uso doméstico. En caso de que esto ocurra, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal.

Clasificación (modo o sitio de acción): 2 (HRAC) + 2 (HRAC) + 14 (HRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Carga del equipo: protector facial, guantes de goma de neoprene o nitrilo y botas de goma, camisa de mangas largas y pantalones largos o enterizo de Tyvek™.
Aplicación: protector facial, guantes de goma de nitrilo, camisa de mangas largas y pantalones largos o enterizo de Tyvek™, gorra con protección para la nuca y calzado con medias.

Información Toxicológica:

Información del producto formulado:

Toxicidad oral aguda(rata):	DL 50 > 5000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda(rata):	DL 50 > 5000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda(rata):	DL 50 > 5.4 mg/l

Irritación dermal:	Leve irritante
Irritación ocular:	Moderado irritante
Sensibilización dermal:	No sensibilizante

No existe antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.

Usar los equipos de protección indicados en la etiqueta a los efectos de evitar los potenciales efectos del producto sobre piel y ojos.

Riesgos ambientales

Toxicidad para abejas:	Virtualmente no tóxico
Toxicidad para aves:	Prácticamente no tóxico
Toxicidad para peces y crustáceos:	Prácticamente no tóxico

No aplicar, drenar o enjuagar el equipo utilizado cerca de plantas deseables, ni en áreas donde puedan extender sus raíces, ya que pueden resultar dañadas.

No contaminar cursos o espejos de agua, ni fuentes de agua de uso doméstico, al preparar o aplicar el producto, al limpiar los equipos, o al eliminar los envases o restos de producto.
Dejar una zona buffer sin aplicar de al menos 5 metros de cursos o espejos de agua.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
REMIGATE	CORTEVA AGRISCIENCE ARGENTINA SRL	40307	WG	6% + 8% + 30,7%	IV

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.