PYROXSULAM + METSULFURON METIL

Marcas comerciales: MERIT WG PACK.

Nomenclatura Química:
Parte sólida A:
pyroxsulam: N (5,7 dimetoxi[1,2,4]triazol[1,5 a]pyrimidin 2 il) 2 metoxi 4 (trifluorometil) piridin 3 sulfonamida
cloquintocet-mexyl: 2-heptil-5-cloro-8-quinolinoxiacetico.
Parte sólida B:
metsulfuron metil: (metil 2-[[[[(4-metoxi-6-metil-1,3,5 triazin-2-il)]amino] carbonil] amino] sulfonil] benzoato).
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: triazolopirimidina + sulfonilurea.
Acción: sistémica.

Uso: herbicida.

Cultivo	Adversidad	Dosis	Momento de Aplicación
Trigo	Anagallis (*Anagallis arvensis*) Apio cimarrón o falsa biznaga (*Ammi majus*) Avena negra o Cebadilla (*Avena fatua*) Capiquí (Stellaria m*edia*) Cebadilla criolla (*Bromus catarthicus o unioloides*) Enredadera anual (*Polygonum convolvulus*) Girasol guacho (*Helianthus annuus*) Nabón (*Raphanus sativus*) Quínoa (*Chenopodium spp*) Raigrás anual (*Lolium multiflorum*) Rama negra (*Conyza sumatrensis*) Sanguinaria (*Polygonum aviculare*) Viola (*Viola arvensis*)	Parte solida A: 84 gr/ha + Parte sólida B: 6,7 g/ha	Aplicar a partir de la tercer hoja, hasta fin de macollaje del cultivo. Para el control de avena guacha y cebadilla criolla se recomienda aplicar cuando las malezas tengan 2 a 3 hojas y hasta un macollo. En el caso de raigrás criollo es importante realizar la aplicación en estados iniciales de crecimiento (1 a 2 hojas) y antes del estado de inicio de macollaje. Para el control de hoja ancha aplicar cuando las mismas sean pequeñas y estén en activo crecimiento.

Información General:

Herbicida sistémico de amplio espectro (graminicida y latifolicida), selectivo para el cultivo de trigo, que controla avena guacha (Avena fatua), raigrás criollo (Lolium multiflorum) y cebadilla criolla (Bromus unioloides), así como también malezas de hoja ancha.
El producto se recomienda para aplicaciones de post emergencia temprana.
Su principio activo, pyroxsulam, se absorbe tanto en forma foliar como por raíces. Dentro de la planta es traslocado por xilema y floema y actúa sobre los tejidos meristemáticos en zonas de activo crecimiento de la planta.
Pyroxsulam es un inhibidor de la enzima acetolactato sintetasa (ALS), responsable de la reacción que permite la biosíntesis de aminoácidos esenciales para el desarrollo y el normal crecimiento de la planta.
Como consecuencia de la inhibición de esta enzima, se produce una disminución del crecimiento de la maleza y su posterior muerte. Bajo condiciones favorables para el crecimiento (de humedad y temperatura), la muerte se produce de 2 a 3 semanas de aplicado el producto. Bajo condiciones no favorables, como bajas temperaturas y falta de humedad la misma ocurre entre las 6 y 8 semanas luego de la aplicación.
El producto posee actividad residual que permite el control de algunas malezas gramíneas y de hoja ancha que germinen después del tratamiento (una vez incorporado el producto al suelo luego de una lluvia).
El producto es un "Twin Pack" de dos herbicidas formado por una parte sólida A más una parte sólida B.
Se recomienda aplicar siempre con sulfato de amonio y aceite mineral 76,6%.

Instrucciones de uso:
Preparación:
1) Llenar el tanque del pulverizador terrestre con agua limpia.
2) Activar los agitadores y abrir completamente el retorno.
3) Agregar el sulfato de amonio (2 L/100 L de agua por hectárea). Esperar 10 a 15 minutos.
4) Agregar la parte solida A
5) Agregar la parte solida B
6) Agregar Coadyuvante.

Preparar SÓLO la cantidad que se utilizará en el día. NO dejar producto preparado de un día para el otro. Si el preparado queda en reposo durante varias horas, es necesario hacer funcionar el agitador o el retorno durante algunos minutos, antes de comenzar o reiniciar la pulverización.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:
El producto debe aplicarse sobre el cultivo con el volumen necesario para cubrir uniforme y satisfactoriamente el área a tratar.
Aplicar con pulverizadora terrestre de barra. El equipo debe contar con sistema de agitación.
Volumen mínimo: 80-120 litros/ha. Presión: 35-40 lb/pulg2. Pastillas: abanico plano (8002, 8003, 11002 y 11003).
Aplicar siempre con sulfato de amonio al 2% v/v y Coadyuvante al 0.5 % v/v.
Número de gotas: Aplicar 30 a 40 gotas/cm2.
Evitar que la deriva de la neblina de la pulverización entre en contacto con cultivos susceptibles. No aplicar con vientos superiores a 8-10 km/hora.

RESTRICCIONES DE USO:
Uso posicionado: post-emergente de cultivos y malezas.
Tiempo de reingreso al área tratada: No reingresar al área tratada hasta que el producto se haya secado de la superficie de las hojas.
Aplicar cuando el cultivo y las malezas no se encuentren bajo condiciones de estrés, tales como sequía, baja fertilidad, heladas, ataques de insectos, dado que el control será deficiente y el cultivo puede resultar dañado.
Aplicar en suelos con contenido de materia orgánica mayor a 1 % y/o suelos con pH menor a 7.
El producto aplicado a las dosis y momento recomendados en etiqueta no presenta restricciones en la rotación a los cultivos de soja y maíz. En girasol se aconseja precaución por la sensibilidad de este cultivo a metsulfuron-metil.

Compatibilidad: no es compatible con insecticidas organofosforados (clorpirifos, dimetoato, etc.) y productos de fuerte reacción alcalina. No mezclar con otros productos sin realizar previamente una prueba en pequeña escala de compatibilidad física y biológica de los componentes y de fitotoxicidad para el cultivo. Los productos compatibles a ser utilizados junto con este producto deben estar registrados para ese uso particular.

Fitotoxicidad: no es fitotóxico para el cultivo de trigo a las dosis y condiciones de aplicación recomendadas. El metsulfuron-metil, bajo ciertas condiciones tales como lluvias excesivas, prolongado frío y/o heladas previas, durante o inmediatamente después de la aplicación, puede producir síntomas tales como amarillamiento y/o detención del crecimiento. Estos síntomas desaparecerán rápidamente al revertirse las condiciones ambientales adversas.

Derrames:
Contener y absorber el producto derramado con material inerte (tierra, arena o aserrín). A continuación, barrer y recoger el mismo en bolsas o recipientes correctamente rotulados para su posterior destrucción por empresas autorizadas para tal fin. Lavar con abundante agua y jabón el área contaminada. Evitar que el derrame contamine aguas de riego y/o de uso doméstico. En caso de que esto ocurra, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal.

Clasificación (modo o sitio de acción): 2 (HRAC) + 2 (HRAC).

Información Toxicológica:

Leve irritante dermal
Moderado irritante ocular
No sensibilizante dermal

Riesgos ambientales:
Ligeramente tóxico para peces y organismos acuáticos. No contaminar cursos o espejos de agua, ni fuentes de agua de uso doméstico, al preparar o aplicar el producto, al limpiar los equipos, o al eliminar los envases o restos de producto.
Prácticamente no tóxico para aves. Ligeramente tóxico para abejas.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
MERIT WG PACK	CORTEVA AGRISCIENCE ARGENTINA SRL	PACK 356	WG + WG	21,5% + 60%	III

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.