HALAUXIFEN METIL + FLUROXIPIR MEPTIL + CLOQUINTOCET MEXYL

Marcas comerciales: FIRM - PIXXARO.

Nomenclatura Química:
halauxifen metil: 4-amino-3-cloro-6-(4-cloro-2-fluoro-3-metoxifenil) piridín-2-carboxilato de metilo
fluroxipir meptil: 4-amino-3,5-dicloro-6-fluoro-2-piridiloxiacetato de 1-metilheptilo
cloquintocet-mexyl: (5-cloroquinolin-8-iloxi)acetato de 1-metilhexilo.
Clasificación Química: ácido piridincarboxílico + ácido aryl-picolinato
Acción: sistémica.

Uso: herbicida.

Cultivo	Maleza	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Pre-siembra de Soja	Rama negra (*Conyza sumatrensis)*	400 a 500 cm3/ha (*) + 2,5 L/ha Panzer® Gold (sal dimetilamina de glifosato 60,8% p/v SL)		Pre-siembra del cultivo de soja. Es importante respetar un intervalo de 14 días entre la aplicación y la siembra del cultivo de soja.
Pre-Siembra De Soja				Pre-siembra del cultivo de girasol. Se puede aplicar hasta 0 días previo a la siembra del cultivo de girasol.

(*) Utilizar la dosis de 500 cm3/ha en situaciones de alta densidad de maleza y tamaños mayores a 15 cm y hasta 20 cm de altura.

Información General:

PixxaroTM es un herbicida sistémico, de acción hormonal, recomendado para el control de rama negra en pre-siembra del cultivo de soja. PixxaroTM combina Halauxifen Metil y fluroxipir, cuando son absorbidos por las hojas y tallos se mueven hacia los tejidos meristemáticos donde produce una sobreestimulación de genes regulados por auxinas. Estos herbicidas de acción tipo auxínico estimulan procesos de crecimiento caracterizados por una división celular descontrolada, y en última instancia destrucción del floema. Los efectos en la planta pueden causar distintas sintomatologías que pueden incluir malformación de hojas, epinastias, deformaciones de raíces, necrosis de tejidos, entre otras, y finalmente la muerte de la planta.

Equipo, volúmenes y técnicas de aplicación:
Utilizar pastillas abanico plano (8002, 8003, 11002, 11003). Volúmen de aplicación: 70-120 litros/ha. Presión: 40 psi.
Agregar siempre aceite mineral al 1% v/v (1 litro cada 100 litros de agua) ó aceite vegetal metilado al 0.5% v/v (0,5 litro cada 100 litros de agua).
Velocidad del equipo: no mayor a 8 km/h.
Número de gotas: Aplicar 20 a 30 gotas/cm2.

RESTRICCIONES DE USO:
Intervalo entre aplicación y siembra del cultivo de soja: Aplicar respetando un intervalo de 14 días.

MANEJO DE RESISTENCIA:
Es un herbicida que pertenece al grupo de sitio de acción O y combina dos moléculas, fluroxipir que pertenece a la familia química de Ácidos piridín- carboxílicos, y halauxifen-metil que pertenece a la familia de Ácidos aryl-picolinatos.
Para prevenir la selección de plantas naturalmente resistentes se recomienda: Llegar a siembra con lotes limpios, respetar las recomendaciones de uso (dosis y momento de aplicación, número máximo de aplicaciones por ciclo) detalladas en el marbete, realizar rotación de herbicidas con diferentes sitios de acción durante el barbecho y a lo largo del ciclo del cultivo, realizar rotación de cultivos, limpiar adecuadamente las herramientas, maquinarias y vehículos, limpiar las áreas no cultivadas y monitorear periódicamente la evolución de las malezas en los lotes y sembrar semillas de buena calidad, de origen conocido y libre de propágulos de malezas.

COMPATIBILIDAD:
Es compatible con Haloxyfop-P-metil 54% p/v EC (Galant® HL), Haloxyfop-P-metil 93,5% p/v EC (Galant® Max) y Cletodim. Antes de utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala, para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos. Los productos compatibles a ser utilizados junto con PixxaroTM deben estar registrados para ese uso particular.

FITOTOXICIDAD:
No ha manifestado síntomas de fitotoxicidad en soja, siguiendo las dosis y recomendaciones que figuran en esta etiqueta en aplicaciones de pre-siembra (14 días antes de la siembra).

Derrames:
Contener el líquido derramado con algún material adsorbente inerte (tierra o arena). No usar agua. Evitar la llegada del producto a cursos o cuerpos de agua. Colocar el material de adsorción contaminado en tambores cerrados e identificados y enviar para su disposición final a sitios autorizados de acuerdo a la legislación local vigente. No incinerar a cielo abierto.

Clasificación (modo o sitio de acción): O (HRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Guantes de nitrilo reforzado. Botas de goma. Camisa de mangas largas y pantalón largo para cubrir totalmente brazos y piernas. Delantal. Antiparras y/o protector facial.

Información Toxicológica:

Toxicidad oral aguda (rata): DL 50: = 5000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata): DL 50: > 5000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda CL 50 > 5,57 mg/l

Irritación dermal: Leve irritante
Irritación ocular: Moderado Irritante
Sensibilización dermal: Sensibilizante
Antídoto: no posee antídoto específico.

Riesgos ambientales: virtualmente no tóxico para abejas. Prácticamente no tóxico para aves. Ligeramente tóxico para peces y organismos acuáticos. Evitar contaminar fuentes de agua.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
FIRM	CORTEVA AGRISCIENCE ARGENTINA SRL	41544	EC	1,7% + 36% + 1,6%	III
PIXXARO	CORTEVA AGRISCIENCE ARGENTINA SRL	40386	EC	1,7% + 36% + 1,6%	III