IPCONAZOLE + METALAXIL + CARBOXIN

Marcas comerciales: RANCONA TRIO.

Nomenclatura Química:
Ipconazole: (1RS, 2SR, 5RS;1RS, 2SR, 5SR)-2-(4-chlorobenzyl)-5- isopropyl- 1- (1H-1,2,4-triazol-1-ymethyl)cyclopentano
Metalaxil: methyl N-(methoxyacetyl)-N-(2,6-xylyl)DL-alaninate
Carboxin: 5,6 -dihydro-2-methyl-1,4 -oxathi-ine-3-carboxanilide
Clasificación Química: triazoles + acilalaninas + oxatin-carboxamidas
Acción: sistémica y de contacto

Uso: fungicida (para tratamiento de semillas)

Cultivo	Adversidad	Dosis	TC	Momento de aplicación
Maní	Damping off (*Fusarium spp.)* Hongos de la semilla *(Aspergillus spp.; Rhizopus spp.)*	400 cm3 cada 100 kg de semillas	NC (*)	Tratamiento de semilla previo a la siembra
Soja	Damping off *(Penicillium spp.; Fusarium spp.)* Hongos de la semilla (*Cercospora kikuchii.; Alternaria spp.; Aspergillus spp.)*	300 cm3 cada 100 kg de semillas		
Trigo	Damping off (*Fusarium spp.)* Hongos de la semilla *(Alternaria spp*, *Cladosporium spp*, *Dreschlera spp.)*			
Cebada	Damping off (*Fusarium spp.)* Hongos de la semilla *(Alternaria spp*, *Cladosporium spp*, *Dreschlera spp.)*			
	Carbón volador *(Ustilago nuda*)	300-400 cm3 cada 100 kg de semillas		

(*) No corresponde periodo de carencia por tratarse de un producto de uso posicionado como terápico de semillas. No debe pastorearse o alimentarse ganado hasta transcurridas siete semanas desde la siembra.

Información General:
Es un fungicida de acción sistémica y de contacto formulado como suspensión concentrada para el tratamiento de semillas de maní, soja, cebada y trigo. El metalaxil, actúa a nivel de la síntesis de ácidos nucleicos. El ipconazole, ejerce acción preventiva (protectora) y curativa por alterar la biosíntesis de la membrana celular de los hongos. El carboxin, interfiere en el proceso respiratorio de los hongos. Es absorbido por las raíces y translocado a través de la plántula para ejercer control de un amplio espectro de enfermedades presentes en el suelo y en las semillas.
Es un producto formulado para ser usado con equipos específicos para tratamiento de semilla, de esta manera se logran los mejores resultados de aplicación. Cuando no se disponga de este tipo de equipamiento puede utilizarse un tambor rotativo de eje excéntrico u otro sistema mecánico de aplicación. Debe tenerse en cuenta que la distribución homogénea del producto es fundamental para la obtención de un resultado satisfactorio. No se recomienda el mezclado en el cajón de la sembradora.

El volumen de dilución a utilizar para el tratamiento de 100 kg de semilla, incluyendo la dosis de Rancona Trio®, deberá ser:

MANÍ: 750 cm3 volumen de dilución Total (dosis de producto formulado + agua)**
SOJA: 500 cm3 volumen de dilución Total (dosis de producto formulado + agua)**
TRIGO: 750 - 1000 cm3 volumen de dilución Total (dosis de producto formulado + agua)
CEBADA: 750 – 1000 cm3 volumen de dilución Total (dosis de producto formulado + agua)

** En el caso de que se utilicen Inoculantes o Bioestimulantes se puede remplazar parte del agua, siempre respetando el volumen total de dilución recomendado para cada cultivo.

No corresponde periodo de carencia por tratarse de un producto de uso posicionado como terápico de semillas. No debe pastorearse o alimentarse ganado hasta transcurridas siete semanas desde la siembra. Se debe tener especial cuidado con el manejo de semilla tratada.

Derrames:
En caso de derrame del producto, crear una barrera de contención del derrame. Señalizar la zona afectada, prohibir el acceso a personas ajenas, niños y animales. Cubrir el producto derramado con cal y luego con un material absorbente (arena, tierra, aserrín etc.). Barrer, recoger con una pala, y colocar en recipientes cerrados e identificados para su posterior destrucción por empresas autorizadas. No quemar a cielo abierto. Seguidamente, proceder a lavar con detergente y un poco de agua el área contaminada. Evitar que contaminen el agua de riego y/o consumo.

Clasificación (modo o sitio de acción): 3 (FRAC) + 4 (FRAC) + 7 (FRAC)

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:

Durante la preparación y aplicación usar equipo de protección adecuado (mameluco de manga larga, guantes impermeables, botas de goma y protección facial). No comer, beber o fumar durante el tratamiento. Finalizado el tratamiento, lavarse adecuadamente con agua y jabón.

Información Toxicológica:

DL 50 oral aguda en ratas: >5000 mg/kg.
DL 50 dermal aguda en rata: >5000 mg/kg.
Cl 50 inhalatoria aguda en rata: >5,10 mg/L.

Leve irritante dermal.
Leve Irritante ocular.
No Sensibilizante dermal.

Riesgos ambientales:
Toxicidad para abejas: Ligeramente tóxico.
Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico.
Toxicidad para peces: Ligeramente tóxico.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
RANCONA TRIO	UPL ARGENTINA S.A.	40183	FS	0,45% + 1,2% + 12,4%	IV