MANCOZEB + AZOXISTROBINA + PROTIOCONAZOLE

Marcas comerciales: GOLDLEAF.

Nomenclatura Química:
Mancozeb: etilen-bis-ditiocarbamato de manganeso coordinado con iones zinc
Azoxistrobina: metil E-2-(2-(6-(2-cianofenoxi) pirimidin-4-iloxi) fenil)-3-metoxiacrilato
Protioconazole: (RS)-2-[2-(1-clorociclopropil)-3-(2-clorofenil)-2-hidroxipropil]-2,4-dihidro-1,2,4-triazol-3-tiona
Clasificación Química: ditiocarbamato + estrobilurina + triazol
Acción: de contacto y sistémica

Uso: fungicida

Cultivo	Adversidad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Soja	Mancha marrón (*Septoria glycines*)	1,75 Kg/Ha	35	Aplicar a partir de R3 hasta R6 cuando se observen los primeros síntomas en la planta.
Cebada	Mancha en Red *(Drechslera teres)*			Aplicar cuando se observen los primeros síntomas siempre que las condiciones climáticas favorezcan el desarrollo de las enfermedades.
Trigo	Mancha Amarilla (Dreschlera tritici) Roya amarilla (Puccinia striiformis)	1,75 a 2 Kg/Ha		Aplicar cuando se observen los primeros síntomas siempre que las condiciones climáticas favorezcan el desarrollo de las enfermedades. Utilizar la dosis mayor en cultivares más susceptibles.

Información General:

Fungicida multisitio cuyos componentes tienen acción de contacto, sistémica, preventiva, curativa, erradicante y antiesporulante; recomendado para el cultivo de Soja, Trigo y Cebada. El Mancozeb, actúa en diferentes puntos, induciendo una inhibición enzimática múltiple, lo que disminuye el riesgo de desarrollo de resistencia. La Azoxistrobina actúa inhibiendo el sistema respiratorio de los hongos, resultando especialmente eficaz para impedir la germinación de esporas y el desarrollo inicial del patógeno y además, le aporta mayor residualidad al producto. Por su parte el Protioconazole, que pertenece al grupo de los triazoles, tiene acción sistémica y de contacto, controlando tanto las enfermedades que son diseminadas vía semilla, como aquellas presentes en el suelo. Permite un buen establecimiento del cultivo y controla aquellas enfermedades que desde la semilla provocan una disminución en el stand de plantas. Está especialmente recomendado para su uso en rotación con otros fungicidas, a fin de minimizar el riesgo de apariciones de biotipos naturalmente resistentes.

Preparación: Preparar la cantidad requerida y adicionar al tanque de la pulverizadora a medio llenar y luego completar a volumen total. Verificar que el sistema de agitación funcione desde el vertido del producto al tanque hasta el final de la aplicación. Utilizar el producto el mismo día de su preparación.

Puede aplicarse con máquinas terrestres de alto volumen, entre 150 – 200 litros/ha, provistas de pastillas abanico plano y una presión de 40-50 lb/pg2. Velocidad de equipo: no mayor a 8 km/h. Suspender los tratamientos con vientos superiores a 10 km/hora. Debe lograrse una cobertura de 50-70 gotas/cm2.

RESTRICCIONES DE USO: No aplicar cuando se prevean lluvias durante las 24 horas posteriores a la aplicación, ya que se perjudicaría la eficacia del producto.

No aplicar cuando los vientos superen los 10 Km/h. Evitar su uso durante las horas de mayor insolación y alta temperatura. No mezclar con productos de reacción alcalina como Caldo Bordelés y Polisulfuro de Calcio.

Entre la última aplicación y la cosecha se debe dejar transcurrir como mínimo un período de 35 días.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de los fungicidas y coadyuvantes disponibles en el mercado excepto con productos altamente ácidos o alcalinos. Sin embargo, antes de hacer una mezcla en el tanque, prepárela a pequeña escala para observar si se producen posibles reacciones indeseables.

Derrames:
Sólido: recoger con pala el producto derramado y la capa superficial del suelo afectado, colocar en bolsas, identificar debidamente y enviar a un centro de incineración debidamente habilitado. Caldo de pulverización: contener y absorber con aserrín, arena o tierra, barrer y luego colocar en bolsas o recipientes bien identificados para enviar a una planta de incineración debidamente habilitada.

Clasificación (modo o sitio de acción): M3 (FRAC) + 11 (FRAC) + 3 (FRAC)

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Este producto debe ser manipulado por personas debidamente instruidas para su empleo. Usar guantes plásticos, antiparras, overol y máscara. Evitar su inhalación o ingestión, el contacto con la piel y la contaminación de los alimentos. No beber, comer o fumar durante el trabajo. Mantener el producto en los envases originales, bien cerrados y correctamente etiquetados. Almacenar en lugar fresco, seco, bajo llave, lejos de los niños, animales, comida y alimento de animales. Durante el transporte asegurarse que los envases estén sanos y los rótulos fijos.

Información Toxicológica:

DL 50 oral aguda en ratas: >5000 mg/kg.
DL 50 dermal aguda en rata: >2000 mg/kg.
Cl 50 inhalatoria aguda en rata: >5,735 mg/L.

Leve irritante dermal.
Moderado Irritante ocular.
No Sensibilizante dermal.

Riesgos ambientales:
Toxicidad para abejas: Moderadamente tóxico.
Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico.
Toxicidad para peces: Moderadamente tóxico
.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
GOLDLEAF	UPL ARGENTINA S.A.	40560	WG	52,5 % + 3,75 % + 3,75 %	III