MANCOZEB + AZOXISTROBINA + TEBUCONAZOLE

Marcas comerciales: TRIDIUM.

Nomenclatura Química:
Mancozeb: etilenbis(ditiocarbamato) de manganeso con sal de zinc
Azoxistrobina: metil E-2-(2-(6-(2-cianofenoxi)pirimidin-4-iloxi)fenil)-3-metoxiacrilato
Tebuconazole: (R,S)-1-p-clorofenil-4,4-dimetil-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil-pentan-3-ol)
Clasificación Química: ditiocarbamato + metoxiacrilato + triazol
Acción: de contacto y sistémica

Uso: fungicida

Cultivo	Adversidad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Cebada	Mancha en red (*Drechslera teres*)	1,75 a 2 Kg/Ha	30	Aplicar cuando se observen los primeros síntomas siempre que las condiciones climáticas favorezcan el desarrollo de las enfermedades. Utilizar la dosis mayor en cultivares más susceptibles.
Trigo	Mancha amarilla (*Drechslera tritici*) Roya amarilla (*Puccinia striiformis*) Roya anaranjada (*Puccinia recondita*)		35	

Información General:
Es una mezcla de fungicidas de acción por contacto, sistémica, preventiva y antiesporulante recomendado para los cultivos de Trigo y Cebada. El mancozeb, actúa en diferentes puntos, induciendo una inhibición enzimática múltiple, lo que disminuye el riesgo de desarrollo de resistencia. La azoxistrobina actúa inhibiendo el sistema respiratorio de los hongos, resultando especialmente eficaz para impedir la germinación de esporas y el desarrollo inicial del patógeno y además, le aporta mayor residualidad al producto. El tebuconazole, inhibe la multiplicación del hongo, otorgándole al producto el efecto curativo necesario. Está especialmente recomendado para su uso en rotación con otros fungicidas, a fin de minimizar el riesgo de apariciones de biotipos naturalmente resistentes.

Preparar la cantidad requerida de producto y adicionar al tanque de la pulverizadora a medio llenar y luego completar a volumen total. Verificar que el sistema de agitación funcione desde el vertido del producto al tanque hasta el final de la aplicación. Utilizar el producto el mismo día de su preparación. Puede aplicarse con máquinas terrestres de alto volumen, entre 150 – 200 litros/ha, provistas de pastillas abanico plano y una presión de 40-50 lb/pg2. Velocidad de equipo: no mayor a 8 Km/h. Suspender los tratamientos con vientos superiores a 10 km/hora. Debe lograrse una cobertura de 50-70 gotas/cm2.
No aplicar cuando se prevean lluvias durante las 24 horas posteriores a la aplicación, ya que se perjudicaría la eficacia del producto. No aplicar cuando los vientos superen los 10 Km/h. Evitar su uso durante las horas de mayor insolación y alta temperatura.

Entre la última aplicación y la cosecha se debe dejar transcurrir como mínimo un período de 30 días para el cultivo de cebada y 35 días en el cultivo de trigo.

“En el caso que los vegetales o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y atenerse a las normas vigentes.”

Pertenece al grupo M3, 11 y 3 de los fungicidas. Para prevenir la selección de enfermedades fúngicas naturalmente resistentes a un fungicida, deben respetarse las recomendaciones de uso (dosis y momento de aplicación) detalladas en el marbete. Aunque la aparición de biotipos fúngicos resistentes al Mancozeb es muy poco probable, dada su acción multi-sitio, debe evitarse el uso exclusivo de un único grupo de fungicidas en la estrategia de manejo de enfermedades en el lote.

Tiempo de reingreso al área tratada: No reingresar al área tratada hasta que el producto se haya secado de la superficie.
Es compatible con la mayoría de los fungicidas y coadyuvantes disponibles en el mercado excepto con productos altamente ácidos o alcalinos. Sin embargo, antes de hacer una mezcla en el tanque, prepárela a pequeña escala para observar si se producen posibles reacciones indeseables. Los productos compatibles deben estar registrados para los mismos usos mencionados en esta etiqueta. No mezclar con productos de reacción alcalina como Caldo Bordelés y Polisulfuro de Calcio.

Derrames:
Sólido: recoger con pala el producto derramado y la capa superficial del suelo afectado, colocar en bolsas, identificar debidamente y enviar a un centro de incineración debidamente habilitado. Caldo de pulverización: contener y absorber con aserrín, arena o tierra, barrer y luego colocar en bolsas o recipientes bien identificados para enviar a una planta de incineración debidamente habilitada.

Clasificación (modo o sitio de acción): M3 (FRAC) + 11 (FRAC) + 3 (FRAC)

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:

Este producto debe ser manipulado por personas debidamente instruidas para su empleo. Usar guantes plásticos, antiparras, overol y máscara.
Evitar su inhalación o ingestión, el contacto con la piel y la contaminación de los alimentos. No beber, comer o fumar durante el trabajo. Mantener el producto en los envases originales, bien cerrados y correctamente etiquetados. Almacenar en lugar fresco, seco, bajo llave, lejos de los niños, animales, comida y alimento de animales. Durante el transporte asegurarse que los envases estén sanos y los rótulos fijos.

Información Toxicológica:

DL50 oral aguda: >5000 mg/kg.
DL50 dermal aguda: > 2000 mg/kg.
CL 50 inhalatoria aguda: >5,339 mg/L

Leve irritante dermal
Moderado irritante ocular
No sensibilizante dermal

Riesgos ambientales:
Toxicidad para abejas: Ligeramente tóxico.
Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico.
Toxicidad para peces: Moderadamente tóxico.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
TRIDIUM	UPL ARGENTINA S.A.	39888	WG	59,7% + 4,7% + 5,6%	III