2,4 D – MICRO EMULSIÓN

Marcas comerciales: JASPEK ME - RAMEX ELITE

Nomenclatura Química:
2,4 D: ácido 2,4 diclorofenoxiacético
Clasificación Química: ácido fenoxi-carboxílico.
Acción: sistémica.

Uso: Herbicida (post-emergente).

Cultivo	Adversidad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Barbecho	Cerraja *(Sonchus oleraceus)* Escoba amarilla *(Flaveria bidentis)* Yuyo Colorado *(Amarantus quitensis)* Mastuerzo *(Coronopus didymus)*	1,0-1,7 L/ha	Exento	Pulverizar cuando las malezas se encuentren a principios de su desarrollo vegetativo y creciendo vigorosamente.
	Bolsa de pastor (*Capsella bursa-pastoris*)	1,0 L/ha		
	Arrancamoños (*Xanthium spinosum*) Chamico (*Datura ferox*) Quínoa, Quínoa blanca (*Chenopodium album*) Rama negra (*Conyza sumatrensis*) Verdolaga (*Portulaca oleracea*)	0,8-1,2 L/ha+ 2,0 L/ha glifosato sal potásica 66,2% SL		

Información General:

Herbicida sistémico, hormonal, usado en el control de malezas de hoja ancha en barbecho. La susceptibilidad de la maleza al producto está directamente relacionada al estado de crecimiento de esta, debiendo aplicarse las dosis mayores cuando más avanzado esté el crecimiento de la misma.

Está especialmente formulado como una micro emulsión, tecnología que le proporciona ultra baja volatilidad. Siendo el mismo un herbicida que cumple con las BPA y el cuidado del medio ambiente.

Instrucciones para el uso:

Preparación: Se recomienda emplear agua limpia o filtrada para preparar el caldo del herbicida. Agregar dicha agua al tanque de la pulverizadora, previamente calibrada, hasta la mitad del volumen a utilizar. Poner en funcionamiento el sistema de agitación. Añadir la cantidad de formulado requerida directamente al tanque y sin disolución previa, de acuerdo con la calibración realizada. Corroborar que el producto se disuelva correctamente. Mientras se continúa agitando, completar el tanque con agua hasta el volumen final.

Compatibilidad:
No presenta incompatibilidad con productos ácidos ni con productos alcalinos, pudiendo aplicarse en mezcla de tanque con la mayoría de los agroquímicos. Antes de utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala, para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos.
Importante: Verificar que el sistema de agitación funcione en todo momento.

Se sugiere aplicar con condiciones ambientales adecuadas: velocidad del viento menor a 15 km/h (y mayor a 4 km/h para lograr mejor penetración y cobertura del blanco), temperatura menor a 30°C y con valores del ΔT entre 2 y 8. Trabajar con la mínima altura de botalón compatible con una buena uniformidad y calidad de aplicación, que no comprometa la exoderiva en función a las condiciones climáticas vigentes al momento de aplicación. No aplicar ante riesgo de inversión térmica. Cuando no se pueda asegurar la mitigación de la exoderiva, se sugiere no pulverizar cuando el viento sople hacia cultivos sensibles (*) adyacentes al lote a pulverizar, cursos de agua y/o en cercanía de áreas residenciales. Cumplir con las regulaciones provinciales y/o municipales sobre áreas de no aplicación y buffer (amortiguación).

(*) Se consideran cultivos sensibles (girasol, algodón, poroto, soja no tolerante al 2,4 D, alfalfa y otras leguminosas forrajeras, hortalizas, tabaco, vid, maní, papa, forestales y ornamentales en general, entre otros).

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: Puede aplicarse con equipos pulverizadores manuales y equipos terrestres provistos de un agitador mecánico o de una bomba que permita mantener una remoción constante a través del retorno, utilizando un volumen mínimo de agua de 60 - 80 l/ha, a una velocidad de 8 a 10 km/h. Con equipos aéreos se debe utilizar entre 15 a 25 litros por hectárea *. (*) Recomendación para el producto RAMEX

Lavado de equipos: Limpiar el equipo utilizado inmediatamente luego de la aplicación. Respetar las siguientes instrucciones: Vaciar completamente el equipo. Enjuagar el tanque, mangueras y picos con agua limpia. Preparar una solución limpiadora de un litro de lavandina cada 200 litros de agua. Usar suficiente cantidad de solución limpiadora como para lavar la totalidad del equipo.

De estar disponible, usar lavadora a presión con la solución limpiadora, para lavar el interior del tanque. Poner en marcha el sistema de agitación y hacer recircular esta solución por al menos 15 minutos. Todos los remanentes visibles deben ser eliminados del equipo de aplicación antes de un nuevo uso, ya que podrían producirse efectos no deseados en los cultivos u áreas tratadas posteriormente. Retirar los picos y pastillas y lavarlos separadamente, después de realizar los pasos precedentes. Eliminar el líquido utilizado en sitios donde no exista riesgo de contaminación de aguas superficiales ni subterráneas.

Restricciones de uso:
Periodo de carencia: Exento.

En caso de que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

No realizar aplicaciones aéreas**. (**) Para el producto JASPEK ME

TIEMPO DE REINGRESO AL AREA TRATADA: No reingresar al área tratada hasta que el producto se haya secado de la superficie de las hojas.

Fitotoxicidad: No ha manifestado síntomas de fitotoxicidad siguiendo las recomendaciones indicadas en esta etiqueta.

Derrames:
Aislar el área y restringir la entrada innecesaria de operarios. Utilizar los elementos de protección personal recomendados para este producto. Cubrir los derrames con material absorbente (tierra o arena). Barrer el producto absorbido y recoger en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento.

Clasificación (modo o sitio de acción): O (HRAC) o 4 (WSSA).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Evitar el contacto con la piel, ojos y ropas. Luego de la aplicación, lavarse con agua y jabón las partes expuestas al contacto del producto. Durante la preparación y aplicación, usar ropa protectora adecuada, botas y guantes de goma, máscara y antiparras.

Información Toxicológica:

Para el producto JASPEK ME:
Oral aguda en ratas LD50: 1030 mg/kg (ratas).
Dermal aguda en ratas DL50 > 5000 mg/kg de peso corporal (ratas).
Inhalación en ratas CL50: 1,95mg/L de aire.

Para el producto JASPEK ME:
Irritación dermal: No irritante.
Irritación ocular: Severo irritante.
Sensibilizante dermal: No sensibilizante.

Para el producto RAMEX ELITE:
Irritación dermal: No irritante.
Irritación ocular: Moderado irritante.
Sensibilizante dermal: No sensibilizante.

Riesgos ambientales:

Para el producto JASPEK ME:
Toxicidad para abejas: Virtualmente no tóxico.
Toxicidad para aves: Ligeramente tóxico
Toxicidad para organismos acuáticos y peces: Moderadamente tóxico.

Para el producto RAMEX ELITE:
Toxicidad para abejas: Ligeramente tóxico.
Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico
Toxicidad para organismos acuáticos y peces: Ligeramente tóxico.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
JASPEK ME	ATANOR S.C.A	40206	ME	30%	II
RAMEX ELITE	SUMMIT AGRO ARGENTINA	40174	ME	30%	II