TIAMETOXAM + FIPRONIL

Marcas comerciales: KURANTO.

Nomenclatura Química:
tiametoxam: (EZ)-3-(2-cloro-1,3-tiazol-5-ilmetil)-5-metil-1,3,5-oxadiazinan-4- ilideno(nitro)amina
fipronil: 5-amino-1-(2,6-dicloro-α,α,α-trifluoro-p-tolil)-4-trifluorometilsulfinilpirazol-3-carbonitrilo
Clasificación Química: neonicotinoide y fenilpirazol
Acción: contacto e ingestión.

Uso: insecticida formulado para Tratamiento de semillas

Cultivo	Adversidad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Soja	Picudo Grande (*Sternechus subsignatus*) Picudo Negro (*Rhyssomatus subtilis*)	200-250 cm^3/100 kg de semilla	NC (*)	Se debe aplicar sobre las semillas a tratar en forma de dilución (slurry)

(*) No corresponde periodo de carencia por tratarse de un producto de uso posicionado como terápico de semillas. No debe pastorearse o alimentarse ganado hasta transcurridas siete semanas desde la siembra.

Información General:
Insecticida formulado para el Tratamiento de Semillas de Soja que combina dos principios activos con características complementarias. Un neonicotinoide que le otorga al producto un gran poder de volteo y un fenil pirazol que le da gran acción residual. Actúa por contacto e ingestión, afectando el sistema nervioso central de los insectos.

INSTRUCCIONES PARA EL USO:
Preparación: La semilla que se destina al tratamiento con el producto debe ser previamente ventilada para la eliminación de restos vegetales, polvo, etc, y debe tener buena energía y poder germinativo. Poner especial cuidado en la dosificación cuando se inician los tratamientos.
El producto se debe aplicar sobre las semillas a tratar en forma de dilución (slurry). Para una correcta preparación de la dilución respetar las siguientes instrucciones:
- Agregar agua al recipiente en donde se preparará la mezcla, hasta la mitad del volumen total a preparar.
- Añadir luego la cantidad necesaria del producto, según la cantidad de semillas a tratar. Mezclar y corroborar la adecuada dilución del producto.
- Completar con agua hasta el volumen total de dilución.
- Mantener la agitación durante todo el tiempo de uso. La dilución debe ser usada dentro de las 24 horas luego de preparada. Usar siempre agua limpia.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: Para obtener una buena protección del cultivo, es indispensable distribuir el producto homogéneamente, asegurando que cada semilla quede cubierta adecuadamente.
Puede ser aplicado en cualquier equipo de tratamiento continuo pueden utilizarse máquinas de tratamiento continuo (sinfín), máquinas del tipo hormigonera o tambores rotativos de eje excéntrico.

Pertenece a los grupos 4A y 2B de los insecticidas. Para prevenir la selección de poblaciones naturalmente resistentes a un insecticida, deben respetarse las recomendaciones de uso (dosis y momento de aplicación) detalladas en el marbete. Debe evitarse el uso de un único grupo de insecticidas en la estrategia de manejo de plagas en el lote, mediante la combinación con otros insecticidas de diferente número de grupo en mezcla de tanque o aplicaciones secuenciales. Para controlar una población resistente a un insecticida, será necesario aplicar otro producto efectivo, de diferente número de grupo. Utilizarlo a la dosis que indique el marbete para esa especie, y adoptar todas las prácticas de manejo que sean necesarias para mantener controlada esa población a lo largo del ciclo del cultivo.

COMPATIBILIDAD:
Antes de utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala, para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos.

FITOTOXICIDAD:
El producto no es fitotóxico para los cultivos para los que se recomienda su uso si se siguen las indicaciones de marbete.

Derrames:

Cubrir los derrames con material absorbente (tierra o arena). Barrer el producto absorbido y recoger en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa.

Clasificación (modo o sitio de acción): 4A (IRAC), 2B (IRAC)

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Usar guantes plásticos, antiparras, overol y máscara. Evitar su inhalación o ingestión, el contacto con la piel y la contaminación de los alimentos. No beber, comer o fumar durante el trabajo. Mantener el producto en los envases originales, bien cerrados y

correctamente etiquetados. Almacenar en lugar fresco, seco, bajo llave, lejos de los niños, animales, comida y alimento de animales. Limpiar el equipo aplicador, el lugar de trabajo y de almacenamiento de semilla tratada. Evitar contacto con la semilla tratada.

Información Toxicológica:

DL50 Oral aguda en ratas: 550 mg/Kg
DL50 Dermal aguda en ratas: > 2000 mg/Kg
CL 50 Inhalatoria en ratas: 2,291 mg/L

Riesgos ambientales
Toxicidad para aves: Producto ligeramente tóxico
Toxicidad para peces: Producto moderadamente tóxico
Toxicidad para abejas: Producto altamente toxico.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
KURANTO	UPL ARGENTINA S.A.	40964	FS	35% + 17,5%	II