ISOCYCLOSERAM

Marcas comerciales: IMPLASH CON TECNOLOGÍA PLINAZOLIN – TEKARIUM CON TECNOLOGÍA PINAZOLIN – VERTENTO CON TECNOLOGÍA PLINAZOLIN – VIRANTRA CON TECNOLOGÍA PLINAZOLIN.

Nomenclatura Química:
isocycloseram: 4-[(5RS)-5-(3,5-dichloro-4-fluorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-4,5-dihydro-1,2-oxazol-3-yl]-N-[(4RS)-2-ethyl-3-oxo-1,2-oxazolidin-4-yl]-2-methylbenzamide.
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: isoxazolina
Acción: contacto e ingestión

Uso: Acaricida, Insecticida

Cultivo	Adveridad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Algodon	Trips *(Caliothrips phaseoli)* Trips *(Frankliniella schultzei)*	50 cm3/ha + aceite mineral 0.25 % v/v (mínimo 83% ingrediente activo)	21	Aplicar en plantas de no menos de 4 hojas, cuando se supere el umbral de 2 trips/planta.
	Picudo del algodonero *(Anthonomus grandis)*	60-100 cm3/ha		Aplicar al detectar la presencia de la plaga en las trampas. Realizar 2 a 3 aplicaciones separadas 7-10 días. Utilizar la dosis más alta cuando se observe alta presión.
Cebolla	Trips *(Thrips tabaci)*	75 -100 cm3/ha + aceite mineral 0.25 % v/v	14	Aplicar al inicio de infestación, cuando se detecten los primeros focos de plagas en el cultivo. Repetir el tratamiento a los 7-10 días de la primera aplicación.
Mani	Arañuela roja común *(Tetranychus urticae)* Trips *(Caliothrips phaseoli)*	50 – 75 cm3/ha + aceite mineral 0.25 % v	30	Aplicar al inicio de infestación, cuando se detecten los primeros focos de plagas en el cultivo. Utilizar La dosis más alta registrada cuando se detecte alta incidencia de plaga.
Manzanas Peras	Arañuela roja común *(Tetranychus urticae)* Arañuela roja europea *(Panonychus ulmi)* Carpocapsa *(Cydia pomonella)* Piojo de San José *(Quadraspidiotus perniciosus)*	15 - 20 cm3/100 litros de agua + aceite mineral 1 – 2 % v/v	120 - 135	Aplicar a Yema Hinchada / Botón Rosado. En caso de alta presión utilizar las dosis altas del producto y aceite con un mínimo de 83 % v/v de ingrediente activo. Realizar solo 1 aplicación por ciclo de cultivo. Volumen de aplicación máximo para la dosis de 15 cm3/hl: 1500 l/ha. Volumen de aplicación máximo para la dosis de 20 cm3/hl: 1200 l/ha
Papa	Minador de la hoja *(Liriomyza huidobrensis)*	100 -150 cm3/ha	7	Aplicar al inicio de infestación, en presencia de las primeras galerías en la parte inferior de la planta. Usar la dosis más alta en caso de haber daño manifiesto. En caso de ser necesario agregar aceite al 0.25% v/v. No realizar más de dos aplicaciones por ciclo del cultivo. Entre generaciones de la plaga rotar con productos de distinto modo de acción.
	Trips *(Frankliniella occidentalis)* Trips *(Thrips tabaci)*			Aplicar al observar los primeros indicios de infestación, con un alto volumen de agua y alta presión. Repetir la aplicación cuando sea necesario. Se recomienda la adición de aceite mineral o vegetal al 0,25% v/v en situación de alta presión. Evitar el escurrimiento. No realizar más de 2 aplicaciones por ciclo del cultivo.
Pimiento	Acaro blanco *(Polyphagotarsonemus latus)*	15 cm3/100 litros de agua.	1	Aplicar al observar los primeros indicios de infestación, con un alto volumen de agua y alta presión. Repetir la aplicación cuando sea necesario. Se recomienda la adición de aceite mineral o vegetal al 0,25% v/v en situación de alta presión. Evitar el escurrimiento. No realizar más de 2 aplicaciones por ciclo del cultivo.
	Trips *(Frankliniella occidentalis)*	20-30 cm3/100 litros de agua + 0.25% v/v de aceite mineral refinado con mínimo 83% p/v		Aplicar con un umbral de 0,5 trips/flor. No realizar más de 2 aplicaciones por ciclo del cultivo. Solo aplicar en el sector donde se encuentran las flores. Volumen de aplicación máximo para la dosis de 20 cm3/ hl: 1000 l/ha. Volumen de aplicación máximo para la dosis de 30 cm3/ hl: 650 l/ha
Soja	Picudo negro de la vaina *(Rhyssomatus subtilis)*	50 - 75 cm3/ha	30	Aplicar a inicio de la infestación
	Trips *(Caliothrips phaseoli)*	50 cm3/ha		Aplicar al detectar un promedio de 5 ninfas por folíolo en el estrato medio/inferior. En caso de ser necesario agregar aceite mineral a dosis de 250 cm3/ha.
	Arañuela roja común *(Tetranychus urticae)*			Aplicar al inicio de infestación, cuando se encuentren 5 arañuelas por folíolo en al menos el 30% de las hojas.

				En caso de ser necesario agregar aceite mineral a dosis de 250 cm3/ha.
	Oruga de las leguminosas *(Anticarsia gemmatalis)* Oruga medidora *(Rachiplusia nu)*	75 - 100 cm3/ha		Aplicar cuando se encuentren 10 larvas pequeñas por metro lineal. Recurrir a la dosis mayor con alta presión de orugas y cuando existe riesgo de reinfestación.
	Alquiche chico *(Edessa meditabunda)* Chinche de la alfalfa *(Piezodorus guildinii)* Chinche de los cuernos *(Dichelops furcatus)* Chinche verde *(Nezara viridula)*			Aplicar, de acuerdo a los umbrales establecidos por INTA, a partir de 0,4 chinches por metro lineal, desde que la soja se encuentre en estado de formación de vainas (a partir de R3). Lograr buena penetración de gotas dentro del canopeo (al menos 50-70 gotas/cm2 en la parte media de la planta) para lograr una buena eficacia del producto. Asegurarse que la plaga esté expuesta a la hora de aplicar para lograr mayores % de control
	Oruga del yuyo colorado *(Spodoptera cosmioides)*			Desde 5 orugas > 1,5 cm por metro de surco y más de 10% de daño al follaje.
Tomate	Acaro del bronceado del tomate *(Aculops lycopersici)* Arañuela roja *(Tetranychus urticae)*	15 cm^3/100 litros de agua	1	Aplicar al observar los primeros indicios de infestación, con un alto volumen de agua y alta presión. Repetir la aplicación cuando sea necesario. Se recomienda la adición de aceite mineral o vegetal al 0,25% v/v en situación de alta presión. Evitar el escurrimiento. No realizar más de 2 aplicaciones por ciclo del cultivo.
	Trips *(Frankliniella occidentalis)*			Aplicar con un umbral de 0,5 trips/flor. No realizar más de 2 aplicaciones por ciclo del cultivo. Solo aplicar en el sector donde se encuentran las flores. Volumen de aplicación máximo para la dosis de 20 cm3/ hl: 1000 l/ha. Volumen de aplicación máximo para la dosis de 30 cm3/ hl: 650 l/ha
Tabaco	Trips (Thrips tabaci)	100 cm3/ha	-	Aplicar al detectar la presencia de la plaga. Realizar 2 aplicaciones separadas 14 días

Información General:
Período de carencia: Entre la última aplicación del producto y la cosecha deben transcurrir los siguientes días, según el cultivo, Soja: 30 días; Papa: 7 días; Tomate: 1 día; Pimiento: 1 día; Algodón: 21 días; Pera: 120 días; Manzana: 135 días; Maní: 30 días; Cebolla: 14 días. Tabaco: exento, Pera:120 días, Manzana: 135 días.

Para los cultivos de Pera y Manzana, el número máximo de aplicaciones por ciclo de cultivo es uno (1). Para el resto de los cultivos, el número máximo de aplicaciones por ciclo de cultivo es dos (2).

En caso de que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse los límites máximos de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

No reingresar al área tratada hasta que el producto se haya secado de la superficie de las hojas.
El uso repetido del producto y de insecticidas pertenecientes al grupo 30 IRAC contra sucesivas generaciones de insectos objetivo podría resultar en la selección de insectos resistentes al insecticida. Como resultado de ello, podría haber parcial o total pérdida del control de la población de insectos. Todos los insecticidas del grupo 30 comparten el mismo modo de acción, con lo que es de suponer que la resistencia que ha evolucionado a un insecticida dentro de un grupo podría también afectar a otros insecticidas que pertenezcan al mismo grupo.

Para prevenir o retrasar la selección de poblaciones naturalmente resistentes a insecticidas, deben respetarse las recomendaciones de uso (dosis y momento de aplicación) detalladas en el marbete y utilizar los insecticidas como parte de una estrategia de manejo de resistencia a insectos (IRM, por sus siglas en inglés) que considere lo siguiente:
- Para tratar sucesivas generaciones de una plaga no se debe utilizar insecticidas pertenecientes a un mismo grupo.
- Cuando sea posible incorporar métodos alternativos de control para el control de plagas como parte de un programa de manejo integrado de plagas (MIP).
- Debe evitarse el uso de un único grupo de insecticidas en la estrategia de manejo de plagas en el lote, mediante la combinación con otros insecticidas de diferente número de grupo en mezcla de tanque o aplicaciones secuenciales.
- Para controlar una población resistente a un insecticida, será necesario aplicar otro producto efectivo, de diferente número de grupo. Utilizarlo a la dosis que indique el marbete para esa especie, y adoptar todas las prácticas de manejo que sean necesarias para mantener controlada esa población a lo largo del ciclo del cultivo.

Aditivos**:** En caso de ser necesario agregar aceite mineral según las recomendaciones de uso. Para la adición del aceite, se recomienda verter la dosis necesaria del producto en el agua limpia del tanque, agitar y luego agregar el aceite considerando las recomendaciones específicas para cada cultivo.

Derrames:

Cubrir los derrames con material absorbente (tierra o arena). Barrer el producto absorbido y recoger en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa.

Clasificación (modo o sitio de acción): 30 (IRAC)

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Este producto es nocivo si es ingerido o absorbido por la piel. Evitar todo contacto con la piel, ojos y ropa.
Para su seguridad durante la preparación y aplicación: Utilizar ropa protectora adecuada (mameluco o camisa manga y pantalón largos, casco o gorro) guantes impermeables, protección facial y botas de goma. No comer, beber, ni fumar durante el manipuleo del producto. Evitar el contacto con el pulverizado. No destapar picos ni boquillas con la boca.
Para su seguridad después del tratamiento: Cambiarse y lavar la ropa inmediatamente. Lavarse adecuadamente con abundante agua y jabón. No ingresar al área tratada sin ropa protectora hasta que los depósitos de la aspersión se hayan secado.

Información Toxicológica:

Del producto formulado:
Toxicidad oral aguda: >5000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda: >5000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda: > 5 mg/L
Irritación dermal: No irritante
Irritación ocular: Leve irritante
Sensibilización dermal: Sensibilizante dermal

El contacto prolongado o frecuente con la piel puede causar reacciones alérgicas en algunas personas.
No se conoce antídoto específico. Aplicar terapia sintomática.

Toxicidad para abejas: moderadamente tóxico
Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico
Toxicidad para organismos invertebrados acuáticos: Extremadamente tóxico
Toxicidad para peces: Prácticamente no tóxico

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
TEKARIUM CON TECNOLOGÍA PINAZOLIN	SYNGENTA AGRO	40669	SC	40%	IV
VIRANTRA CON TECNOLOGÍA PINAZOLIN	SYNGENTA AGRO	40620	SC	40%	IV
IMPLASH CON TECNOLOGIA PLINAZOLIN	SYNGENTA AGRO	41354	SC	40%	IV
VERTENTO CON TECNOLOGÍA PLINAZOLIN	SYNGENTA AGRO	41410	SC	40%	IV

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.