MEFENTRIFLUCONAZOLE + PYRACLOSTROBIN + FLUXAPYROXAD

Marcas comerciales: BELYAN.

Nomenclatura Química:
(2RS)-2-(4-(4-chlorophenoxy)-2-(trifluoromethyl)phenyl)- 1-(1 H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol
methyl {2-[1-(4-chlorophenyl)pyrazol-3-yloxymethyl]phenyl}(methoxy)carbamato
3-(difluoromethyl)-1-methyl-N-(3',4',5'-trifluorobiphenyl-2-yl)pyrazole-4 carboxamide
Clasificación Química: triazol + estrobilurina + carboxamida
Acción: sistémica y mesostémica.

Uso: Fungicida.

Cultivo	Adversidad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Soja	Mancha marrón *(Septoria glycines)* Mancha púrpura de la semilla, Tizón de la hoja *(Cercospora kikuchii)* Roya asiática de la soja *(Phakopsora pachyrhizi)*	0.6-0,7 l/ha	30	Para Roya asiática realizar la aplicación al inicio de floración (R1) de observarse los primeros síntomas de la enfermedad. Caso contrario para esta o el resto de las enfermedades aplicar preventivamente desde R3 (inicio de formación de vainas) hasta R5.4 (50% llenado de granos). Los mayores controles de las enfermedades y los mayores aumentos en los rendimientos se logran aplicando en estadios reproductivos tempranos.

Notas al cuadro de uso: (*) aplicar con coadyuvante DASH MSO Max (esteres metílicos de ácidos grasos de aceite vegetal) 0,25 l/ha

Información General:

Está compuesto por tres ingredientes activos: mefentrifluconazole, fungicida con propiedades sistémicas, pyraclostrobin y fluxapyroxad, con propiedades mesosistémicas y de amplio espectro de control.

Mefentrifluconazole pertenece al grupo de los inhibidores de la biosíntesis del ergosterol (DMI). Posee en su estructura Isopropanol, que le confiere propiedades de alta acción biológica sobre el sitio de acción diferenciándose de los Triazoles convencionales.
Fluxapyroxad inhibe la enzima succinato deshidrogenasa (SDHI), la cual desempeña un papel fundamental en la respiración del hongo en el complejo II del transporte de electrones de la mitocondria e interrumpe el suministro de componentes básicos moleculares para el crecimiento de la célula.
Pyraclostrobin pertenece al grupo de las Estrobilurinas y actúa sobre un amplio grupo de hongos. Afecta la respiración del hongo mediante la interrupción de la cadena de transporte de electrones dentro de la mitocondria en el complejo III (QoI).
Por lo tanto es una excelente herramienta para un manejo anti- resistencia.

Este fungicida combina tres importantes fungicidas que le confieren alta contundencia sobre el control de enfermedades porque suprime todo el desarrollo y crecimiento del patógeno. Además, contiene pyraclostrobin, el cual ejerce diversos efectos fisiológicos benéficos para la productividad y calidad de los cultivos demostrando un desempeño tecnológico adicional al efecto fungicida.

Derrames:
Recoger el producto previa ligazón con material adsorbente (Ej. tierra, aserrín, turba, aglutinados de productos químicos) e introducirlo en recipientes cerrados e identificados para su posterior destrucción. La destrucción debe realizarse en un sitio autorizado, de acuerdo a la legislación local vigente.

Clasificación (modo o sitio de acción): 3 (FRAC) + 11 (FRAC) + 7 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Usar máscara, guantes de vinilo, botas de goma, mameluco o delantal extralargo durante la preparación y aplicación.

Información Toxicológica:

Clase toxicológica III. Producto ligeramente peligro. CUIDADO. Toxicidad inhalatoria: Categoría III. CUIDADO. No irritante dermal. Moderado irritante ocular, No sensibilizante dermal. Aplicar tratamiento sintomático.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Grado/Conc.	C.T.
BELYAN	BASF ARGENTINA	41130	SC	13.3% + 17.8% + 8.9%	III