EXTRACTO DE QUILLAY

Nomenclatura Química:
Quillaja Saponaria
Tipo de producto: biológico.
Clasificación Química: biológico (no corresponde c.q.)
Acción: de contacto.

Uso: coadyuvante y nematicida.

Cultivo	Adversidad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Vid	Nematodo del nudo de la raíz (*Meloidogyne incognita*)	25 l/ha	NA	Las aplicaciones deben realizarse una vez iniciado el crecimiento radicular activo. Si los niveles de poblaciones son de medios a altos repetir la aplicación en postcosecha para mantener baja la población de nemátodos 1 a 2 aplicaciones en el ciclo de cultivo en etapas de crecimiento radicular
Tomate	Falso nematodo del nudo de la raíz (*Nacobbus aberrans*)	10 l/ha		Realizar la primera aplicación inmediatamente después del trasplante. 3 Aplicaciones cada 10 días

Coadyuvante: La dosis recomendada es de 50 cm3/ hl.

Información General:

Extracto de Quillay es un nematicida y coadyuvante. Actúa principalmente por contacto. El modo de acción del extracto de Quillay sobre los nematodos se explica por las alteraciones internas en la estructura de los ácidos grasos o lípidos en la cavidad pseudocelómica del nematodo. Como coadyuvante logra una acción mojante uniforme sobre el cultivo a tratar proporcionando un aumento en la eficacia de los agroquímicos mejorando así las condiciones de dispersabilidad, humectación y permeabilidad.

Por sus características de producto natural no deja residuos a cosecha tampoco requiere de tolerancias y está indicado para integrar Programas de Manejo Integrado de Cultivos (MIP)

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:
Uso como nematicida: Se puede realizar la aplicación vía sistema de riego por goteo inyectando el producto en el menor tiempo posible, también puede ser aplicado vía drench con una solución de agua a una concentración mínima de 5 L de producto/1.000 L de agua. Se debe aplicar la cantidad de mezcla necesaria en cada planta para entregar la dosis de producto por ha tratada. Siempre debe ser aplicado sobre suelo regado (capacidad de campo).
Uso como coadyuvante: Se recomienda la aplicación con los mismo equipos y volúmenes indicados para los productos fitosanitarios con los que será mezclado. Debe utilizarse para mejorar la aplicación de fitosanitarios sobre cultivos.

Preparación de la mezcla:
Agitar el envase antes de abrirlo. Disolver el producto en agua agregando el producto al tanque casi lleno para minimizar la formación de espuma.

Derrames:
Recoger el líquido derramado con un material absorbente como arena, aserrín o tierra y recolectar el material en containers cerrados e identificados para su posterior incinerado. Luego manguerear el área de derrame por un período prolongado evitando contaminar aguas superficiales y/o profundas. En caso de emergencias (Argentina) llamar al 02320 491510 al 13 ó 03402 490007 al 09.

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Durante la preparación de la solución y aplicación use guantes, botas de goma y ropa protectora adecuada (chaqueta y pantalón largo).

Información Toxicológica:

Clase IV. Productos que normalmente no ofrecen peligro
Clase Inhalatoria: III. Cuidado.
No irritante dermal. No sensibilizante dermal.
Moderado irritante ocular. Cuidado. Categoría III: causa irritación moderada en los ojos.

No hay formulaciones comerciales inscriptas por las empresas asociadas a CASAFE para este producto.
Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.