FLORPYRAUXIFEN BENZYL + CYHALOFOP BUTIL

Marcas comerciales: XEVELO.

Nomenclatura Química:
Florpyrauxifen benzyl: 2-pyridinecarboxylic acid, 4-amino-3-chloro-6-(4-chloro-2-fluoro-3- methoxyphenyl)-5-fluoro
Cyhalofop butil: butil-(R)-2-[4-(4-ciano-2-fluorofenoxi) fenoxi] propionato.
Clasificación Química: arilpicolinato, ariloxi-fenoxipropionato.
Acción: sistémica.

Uso: herbicida.

Cultivo	Adversidad	Dosis	Momento de Aplicación
Arroz	Junquillo (*Cyperus iria*)	2 a 2,5 l/ha	plicar en post emergencia de la maleza hasta 20 centímetros de altura. Momento de aplicación del cultivo: Aplicar en post emergencia del cultivo desde 4 hojas hasta pre-floración.
	Brachiaria (*Urochloa platyphylla*) Pasto de cuaresma (*Digitaria sanguinalis*)		Aplicar en post emergencia de la maleza hasta 2 macollo. Momento de aplicación del cultivo: Aplicar en post emergencia del cultivo desde 4 hojas hasta pre-floración.
	Capín (*Echinochloa colonum*) Capín (*Echinochloa crus-galli*) Capin (*Echinochloa crus-pavonis*) Eleusine (*Eleusine indica*)		Aplicar en post emergencia de la maleza hasta 3 macollos. Momento de aplicación del cultivo: Aplicar en post emergencia del cultivo desde 4 hojas hasta pre-floración.

Importante
Aplicar con malezas en activo crecimiento, sin manifestaciones de sintomatología de algún tipo de stress.
La inundación del cultivo debe realizarse no más allá de los 3 días posteriores a la aplicación del tratamiento herbicida. En caso de demorar la inundación más allá del tiempo recomendado en esta etiqueta, la eficiencia del producto puede verse afectada. Los mejores resultados se logran cuando la aplicación se realiza sobre suelos húmedos o recién bañados.
Factores ambientales adversos tales como estrés térmico, hídrico, daño causado por otros agroquímicos o suelos calcáreos, pueden alterar el metabolismo y el crecimiento de la planta, pueden impactar en el correcto funcionamiento del herbicida tanto desde el punto de vista de control de malezas como desde la selectividad al cultivo.
No aplicar sobre variedad de arroz de tipo Japónica.
Evitar la deriva de a cultivos sensibles como soja, alfalfa, praderas de leguminosas, girasol, tréboles, maíz, sorgo.

Información General:

Herbicida sistémico de acción postemergente, perteneciente a la familia química de los arilpicolinatos y ariloxifenoxi-propionatos selectivo para el cultivo de arroz, recomendado para el control de malezas gramíneas, latifoliadas y ciperáceas, según lo indicado en las instrucciones de uso de esta etiqueta.
Presenta acción sistémica afectando los puntos de crecimiento y alterando de esta forma diferentes procesos del metabolismo celular. Genera la muerte de las malezas alrededor de 15 a 25 días después de la aplicación del producto, dependiendo de condiciones ambientales y de manejo de agua de riego. Es activo incluso en biotipos de malezas que no son controladas por otras familias químicas y/o mecanismos de acción como ALS.
Las aplicaciones pueden realizarse con equipos terrestres o aéreos.
Número de gotas: Aplicar 20-30 gotas/cm2.

Copatibilidad: Puede ser utilizado en mezclas con penoxsulam e imidazolinonas. No mezclar con herbicidas de contacto como Paraquat o Saflufenacil ni productos alcalinos.
Antes de utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala, para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos.

Fitotoxicidad: No se han observado niveles de daño que afecten el normal desarrollo y crecimiento del cultivo del arroz, al ser utilizado según las recomendaciones de etiqueta descriptas.

Restricciones de uso:
Período de carencia: 90 días. Evitar la deriva sobre cultivos aledaños.
En caso de que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.
Tiempo de reingreso al área tratada: Dejar transcurrir 12 horas después de la aplicación para ingresar al área tratada. En caso de necesitar hacerlo con anticipación, realizar el ingreso con el equipo de protección personal adecuado.

Derrames:
Contener y absorber el producto derramado con material inerte (tierra, arena o aserrín). A continuación, barrer y recoger el mismo en bolsas o recipientes correctamente rotulados para su posterior destrucción por empresas autorizadas para tal fin. Lavar con abundante agua y jabón el área contaminada. Evitar que el derrame contamine aguas de riego y/o de uso doméstico. En caso de que esto ocurra, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal.

Clasificación (modo o sitio de acción): 1 (WSSA) + 4 (WSSA)

Información Toxicológica:
Toxicidad oral aguda DL50 > 2.000 mg/kg.
Toxicidad dérmica aguda DL50 > 5.000 mg/kg. Leve irritante dermal. No sensibilizante dermal
Toxicidad inhalatoria CL50 > 5.47 mg/L de aire.
Moderado irritante ocular

Riesgos ambientales:
Toxicidad para peces y organismos acuáticos: Moderadamente tóxico. CL50 96 hs > 5.09 mg/L
Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico. DL50 dosis única > 2.895 mg/kg
Toxicidad para abejas: Virtualmente no tóxico. Oral DL50 > 164 µg/abeja. De contacto DL50 > 300 µg/abeja
No contaminar cursos o espejos de agua, ni fuentes de agua de uso doméstico, al preparar o aplicar el producto, al limpiar los equipos, o al eliminar los envases o restos de producto.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
XEVELO	CORTEVA AGRISCIENCE ARGENTINA SRL	40748	EC	16,9% + 1,27%	III