HALAUXIFEN METIL + CLOPIRALID

Marcas comerciales: KORVETTO.

Nomenclatura Química:
Halauxifen metil: 4-amino-3-cloro-6-(4-cloro-2-fluoro-3-metoxifenil) piridín-2-carboxilato de metilo
Clopyralid: ácido 3,6-dicloropiridín - 2- carboxílico
Clasificación Química: ácido aryl-picolinato, ácido piridincarboxílico.
Acción: sistémica.

Uso: herbicida.

Cultivo	Adversidad	Dosis	Momento de Aplicación
Barbecho quimico	Rama negra (*Conyza sumatrensis*)	450 a 600 cm3/ha (*) + 2 L/ha Panzer Gold (sal dimetilamina de glifosato 60,8% p/v SL)	Es importante respetar un intervalo de 60 días entre la aplicación y la siembra de cultivos susceptibles como algodón, girasol, soja, papa.

(*) utilizar la dosis de 600 cm3/ha en situaciones de alta densidad de maleza y tamaños mayores a 10 cm y hasta 20 cm de altura.

Información General:

Herbicida sistémico, de acción hormonal, recomendado para el control de rama negra en barbecho químico. Cuando es absorbido por las hojas y tallos se mueve hacia los tejidos meristemáticos donde produce una sobreestimulación de genes regulados por auxinas. Estos herbicidas de acción tipo auxínico estimulan procesos de crecimiento caracterizados por una división celular descontrolada, y en última instancia destrucción del floema. Los efectos en la planta pueden causar distintas sintomatologías que pueden incluir malformación de hojas, epinastias, deformaciones de raíces, necrosis de tejidos, entre otras, y finalmente la muerte de la planta.
Número de gotas: Aplicar 20 a 30 gotas/cm2.

Restricciones de uso:
Intervalo entre aplicación y siembra de los cultivos susceptibles como algodón, girasol, soja, papa: respetar un intervalo de 60 días.
Periodo de carencia: Exento, uso posicionado.

Tiempo de reingreso al área tratada: Dejar transcurrir 12 horas después de la aplicación para ingresar al área tratada. En caso de necesitar hacerlo con anticipación, realizar el ingreso con el equipo de protección personal adecuado.
En caso de que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Compatibilidad: es compatible con Haloxyfop-P-metil 54% p/v EC (Galant® HL), Haloxyfop-P-metil 93,5% p/v EC (Galant® Max) y Cletodim 24% p/v EC. Antes de utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala, para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos

Fitotoxicidad: No ha manifestado síntomas de fitotoxicidad, siguiendo las dosis y recomendaciones que figuran en esta etiqueta

Derrames:
Contener y absorber el producto derramado con material inerte (tierra, arena o aserrín). A continuación, barrer y recoger el mismo en bolsas o recipientes correctamente rotulados para su posterior destrucción por empresas autorizadas para tal fin. Lavar con abundante agua y jabón el área contaminada. Evitar que el derrame contamine aguas de riego y/o de uso doméstico. En caso de que esto ocurra, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal.

Clasificación (modo o sitio de acción): 4 (WSSA).

Información Toxicológica:
Toxicidad oral aguda DL50 => 2.000 mg/kg peso vivo
Toxicidad dérmica aguda DL50 > 2.000 mg/kg peso vivo. Moderado irritante dermal. No sensibilizante dermal
Toxicidad inhalatoria CL50 > 5.79 mg/L.
No se esperan efectos adversos por una única exposición al polvo, puede causar irritación de las vías respiratorias superiores.
Severo irritante ocular

Riesgos ambientales:
Toxicidad para peces y organismos acuáticos: Ligeramente tóxico. CL50 96 hs = 22 mg/L
Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico. DL50 dosis única = 2.000 mg/kg
Toxicidad para abejas: Virtualmente no tóxico. Oral DL50 > 129 µg/abeja. De contacto DL50 > 250 µg/abeja.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
KORVETTO	CORTEVA AGRISCIENCE ARGENTINA SRL	40596	SC	0,51% + 12,21%	III