HALAUXIFEN METIL

Marcas comerciales: ELEVORE - FLASH – TOPSTAR FUSION.

Nomenclatura Química:
4-amino-3-cloro-6-(4-cloro-2-fluoro-3-metoxifenil) piridín-2-carboxilato de metilo.
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: arilpicolinato.
Acción: sistémica.

Uso: herbicida.

Cultivo	Adversidad	Dosis	Momento de Aplicación
Pre-siembra de Soja	Rama negra (*Conyza sumatrensis*)	Elevore 120 cm3/ha + Panzer Gold 2,5 L/ha + Aceite vegetal metilado 0,5 a 1 % v/v	Pre-siembra del cultivo de soja. Es importante respetar un intervalo de 7 días entre la aplicación y la siembra del cultivo de soja.
Pre-siembra de Girasol			Pre siembra: del cultivo de girasol. Se puede aplicar hasta 0 días previo a la siembra del cultivo de girasol

Información General:

Es un herbicida sistémico recomendado para el control de Rama negra (*Conyza sumatrensis)* en presiembra del cultivo de soja. Formulado a base del ingrediente activo Halauxifen metil, primer miembro de una nueva familia química de herbicidas auxínicos (arilpicolinatos).

Instrucciones de uso: Número de gotas: Aplicar de 20 a 30 gotas/cm2.

Restricciones de uso: debe ser aplicado en el suelo, en presiembra del cultivo de soja, respetando un intervalo de 7 días previo a la siembra. En general, para todos los casos, las malezas deben estar en activo crecimiento y debe haber buena humedad en el suelo. No aplicar con vientos superiores a 10 km/hora, y en suelos clasificados como arenosos, con contenido de Materia Orgánica menor al 1%.

Periodo de carencia: Soja: Uso posicionado

Tiempo de reingreso al área tratada: Dejar transcurrir 12 horas después de la aplicación para ingresar al área tratada. En caso de necesitar hacerlo con anticipación, realizar el ingreso con el equipo de protección personal adecuado

Compatibilidad: compatible con los productos con los que se recomienda la mezcla de tanque. No está recomendado en mezcla de tanque con herbicidas de contacto tales como paraquat, saflufenacil y glufosinato para el control de rama negra (pueden aplicarse en un lapso de 7 a 10 días posteriores de aplicado este herbicida)

Fitotoxicidad: Dejar transcurrir 7 días entre la aplicación y la siembra del cultivo de soja. Permite rotaciones con los cultivos de maíz, maní, girasol, sorgo, y trigo, cebada y demás cereales de invierno.

Derrames:
Contener y absorber el producto derramado con material inerte (tierra, arena o aserrín). A continuación, barrer y recoger el mismo en bolsas o recipientes correctamente rotulados para su posterior destrucción por empresas autorizadas para tal fin. Lavar con abundante agua y jabón el área contaminada. Evitar que el derrame contamine aguas de riego y/o de uso doméstico. En caso de que esto ocurra, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal.

Clasificación (modo o sitio de acción): 4 (HRAC).

Información Toxicológica:
Toxicidad dermal aguda: DL50 > 2.000 mg/kg. No sensibilizante dermal. No irritante dermal
Toxicidad oral aguda: DL50 > 2.000 mg/kg. La ingestión accidental de pequeñas cantidades no se espera que produzcan daño.
Toxicidad inhalatoria CL50 > 5.68 mg/L.
No se esperan efectos adversos por una única exposición al polvo, puede causar irritación de las vías respiratorias superiores.
Leve irritante ocular , irritación moderada

Riesgos ambientales:
Toxicidad para peces y organismos acuáticos: Prácticamente no tóxico. CL50 96 hs > 120 mg/L
Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico. DL50 dosis única >> 2.000 mg/kg
Toxicidad para abejas: Virtualmente no tóxico. Oral DL50 > 200 µg/abeja. De contacto DL50 > 200 µg/abeja.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
ELEVORE	CORTEVA AGRISCIENCE ARGENTINA SRL	40776	SC	6,87%	III

FLASH	CORTEVA AGRISCIENCE ARGENTINA SRL	41460	SC	6,87%	III
TOPSTAR FUSION	CORTEVA AGRISCIENCE ARGENTINA SRL	41470	SC	6,87%	III

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.