FLUMIOXAZIN + TERBUTILAZINA

Marcas comerciales: SAKE - SUMYZIN T-MAX.

Nomenclatura Química:
Flumioxazin: N-(7-fluoro-3,4-dihidro-3-oxo-4-prop-2-inil-2H-1,4-benzoxazin-6-il)ciclohex-1-en-1,2- dicarboximida
Terbutilazina: 2-tert-butilamino-4-etilamino-6-cloro-1,3,5-triazina
Clasificación Química: N-Fenilftalamida + 1,3,5 triazina.
Acción: residual, sistémica.

Uso: herbicida (Pre-emergente).

Cultivo	Adversidad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Maiz	Capín (*Echinochloa crus-galli*) Pata de ganso (*Eleusine indica*) Rama negra (*Conyza spp.)* Yuyo colorado (*Amaranthus spp.)*	2-2,5 L/ha	**	Aplicar previo a la emergencia de las malezas y del cultivo (10-15 días antes)
Barbecho De Maiz	Capín * (*Echinochloa colona*) Chloris * (*Chloris elata*) Nabo (*Brassica rapa*) Pasto de cuaresma * (*Digitaria sanguinalis*) Pata de ganso * (*Eleusine indica*) Rama negra (*Conyza spp*.) Yuyo colorado (*Amaranthus spp*.)	1,4-2,5 L/ha		Barbecho corto a maíz : Previo a la emergencia de las malezas.
Barbecho Quimico largo	Nabo (*Brassica rapa)* Ocucha (*Parietaria debilis*) Rama negra (*Conyza spp.)* Ryegrass (*Lolium spp.)*	2,5 L/ha		Barbecho químico largo: Previo a la emergencia de las malezas.
Trigo		1,7 L/ha		Presiembra del cultivo (10-15 días antes de la siembra).

* El control satisfactorio de Capín (Echinochloa colona), Pasto cuaresma (Digitaria sanguinalis), Pata de ganso (Eleusine indica) y Chloris (Chloris elata) es realizado aplicando SAKE, en la mezcla con 1,3 L/ha de METOLACLORO SUMMIT AGRO (metolacloro 96% p/v EC). Las dosis sin metolacloro tendrán un control parcial, pero con supresión de la emergencia de la maleza.
** No se establece período de carencia por su uso posicionado como herbicida.

Información General:

Es un herbicida pre-emergente, residual para el control de malezas gramíneas y latifoliadas en el cultivo de maíz. Actúa a través de las primeras hojas, así como también por las semillas germinadas de las malezas e impide su crecimiento por varios meses. Para obtener los resultados esperados, es importante una adecuada preparación de la cama de siembra, una buena humedad superficial del suelo en el momento de la aplicación y lluvias posteriores para facilitar la incorporación del herbicida en los primeros 2 o 3 centímetros del suelo.

Derrames:
Utilizar los elementos de protección personal recomendados para este producto. Cubra el derrame con un material inerte no combustible (tierra, arena, etc.) para que no se extienda. Recoja el barrido en recipientes e identificarlos adecuadamente. Evite que el derrame llegue a alcantarillas o fuentes de agua en general. Recurra a empresas especializadas en disposición final de residuos peligrosos.

Clasificación (modo o sitio de acción): E (HRAC) o 14(WSSA) + C1(HRAC) o 5(WSSA).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Usar ropa protectora adecuada procurando que la misma esté siempre limpia, evitando emplear la que se hubiera contaminado por uso anterior. Durante la preparación y aplicación utilizar guantes, careta, sombrero, y botas de goma.

Información Toxicológica:

Para el formulado SAKE:

Toxicidad oral aguda (ratas): DL 50 = 1030 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (ratas): DL 50 > 5000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda: CL50 > 2.00 mg/L de aire
Sensibilización de la piel: No sensibilizante
Mutagénesis: No mutagénico.

Antídoto: no se registra antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.

Riegos Ambientales:

Toxicidad para abejas: Virtualmente no tóxico
Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico
Toxicidad para peces: Ligeramente tóxico

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
SAKE	SUMMIT AGRO ARGENTINA SA	40965	SC	3% + 45%	II
SUMYZIN T-MAX	SUMMIT AGRO ARGENTINA SA	40689	SC	3,8% + 50%	II