ACETAMIPRID + PIRIPROXIFEN

Marcas comerciales: ASSAIL XLT.

Nomenclatura Química:
Acetamiprid: (E)-N1-[(6-cloro-3 piridil) metil] -N2-ciano-N1- metilacetamidina
Piriproxifen: 4-fenoxifenil (RS)-2-(2-piridiloxi) propil éter
Clasificación Química: neonicotinoide + juvenoides.
Acción: de contacto, residual, sistémica.

Uso: insecticida.

Cultivo	Adversidad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Manzanas	Chicharrita amarilla (*Edwardsiana crataegi*)	50 ml/hl	7	Aplicar el producto al observar presencia de ninfas en 5% de las hojas. Repetir el tratamiento según recomendación de su ingeniero agrónomo.
	Piojo de San José (*Quadraspidiotus perniciosus*)			Realizar el tratamiento al inicio de migración de ninfas
	Carpocapsa (*Cydia pomonella*)			Realizar los tratamientos de acuerdo al servicio de alarma o bien en base a los planes de cura previamente establecidos.
Peras	Psílido del peral (*Cacopsylla pyricola*)		28	Aplicar el producto al observar la presencia de las primeras ninfas y sea evidente la producción de melaza.
	Piojo de San José (*Quadraspidiotus perniciosus*)			Realizar el tratamiento al inicio de migración de ninfas
	Carpocapsa (*Cydia pomonella*)			Realizar los tratamientos de acuerdo al servicio de alarma o bien en base a los planes de cura previamente establecidos.

Información General:

Acetamiprid presenta una acción rápida y de efecto residual prolongado; tiene acción sistémica y translaminar (sistémica dentro de las hojas) y es absorbido muy bien por el follaje (aplicación foliar). Actúa sobre los organismos nocivos por ingestión y por contacto. Actúa sobre el sistema nervioso central de los insectos, como un análogo de la acetilcolina (Ach), que es un transmisor químico natural de los impulsos nerviosos. Ataca una proteína receptora de la acetilcolina (Ach) en la membrana postsináptica.
Pyriproxifen es un insecticida que actúa como un regulador bioracional del crecimiento de los insectos, desarrollado a partir de la hormona juvenil natural (JH). Pyriproxifen genera un desequilibrio del balance hormonal que impide a los insectos pasar al próximo estadio de su ciclo biológico. De esta manera, el insecto permanece en el estadio que estaba hasta agotar sus reservas. Es por esto que cuanto más temprano se interfiera el desarrollo del ciclo biológico del insecto, más efectivos serán los tratamientos.

Derrames:
En caso de derrames, cubra el producto con un material absorbente (arena, tierra, aserrín). Barrer y recoger con una pala el material impregnado, colocar en un recipiente debidamente identificado. Guardarlo para su posterior disposición, dar aviso al personal técnico de la empresa para determinar su destino. Para neutralizar el producto utilice una solución al 5% de soda cáustica o al 20% de bicarbonato de sodio.

Clasificación (modo o sitio de acción): 4A (IRAC) + 7C (IRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
sar ropa protectora adecuada procurando que la misma esté siempre limpia, evitando emplear la que se hubiera contaminado por uso anterior. Durante la preparación y aplicación utilizar guantes, careta, sombrero, y botas de goma. Lavarse meticulosamente después de manipular el producto.

Información Toxicológica:

Para el formulado ASSAIL XLT:
Toxicidad oral aguda (ratas): DL 50 >3129 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (ratas): DL 50 > 5000 mg/kg
Sensibilización de la piel: No sensibilizante
Mutagénesis: No mutagénico.

Antídoto: no se registra antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.

Riesgos ambientales:
Toxicidad para abejas: Ligeramente tóxico.
Toxicidad para aves: Moderadamente tóxico.
Toxicidad para peces: Ligeramente tóxico.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
ASSAIL XLT	SUMMIT AGRO ARGENTINA SA	40992	EW	7% + 6%	III