FLUDIOXONIL + PYDIFLUMETOFEN

Marcas comerciales: MIRAVIS PRIME CON TECNOLOGÍA ADEPIDYN.

Nomenclatura Química:
fludioxonil: 4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile
pydiflumetofen: 3-(difluoromethyl)-N-methoxy-1-methyl-N-[(RS)-1-methyl-2-(2,4,6 trichlorophenyl)ethyl]-1H-pyrazole-4-carboxamide
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: fenilpirrol + carboxamida.
Acción: sistémica y de contacto.

Uso: fungicida.

Cultivo	Adversidad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Tomate	Cladosporiosis (*Fulvia fulva*) Mancha gris de la hoja (*Stemphyllium sp*) Moho gris o Botrytis (*Botrytris cinerea*) Tizón del tomate (*Alternaria spp)*	100-120 cc cada 100 litros de agua. 800 a 1200 (*) (**)	1	Aplicar preventivamente bajo condiciones predisponentes o ante la aparición de la enfermedad. Utilizar la dosis más baja en situaciones preventivas y dosis superiores en presencia de primeros síntomas. Si las condiciones favorables persisten, aplicar luego de 10 días. No realizar más de dos aplicaciones durante el ciclo del cultivo.
Vid	Moho gris o Botrytis (*Botrytis cinerea*)	1-1,2 Ltrs/ha	21	Se recomienda realizar aplicaciones preventivas a partir de la floración. En caso de ser necesario realizar una segunda aplicación con un intervalo mínimo de 14 días. Asegurar una buena cobertura del área de flores y/o racimos. Utilizar la dosis más baja en situaciones preventivas y la dosis más alta a la aparición de primeros síntomas. No realizar más de dos aplicaciones por año. No utilizar volúmenes de agua mayores a 1500 lt/ha.

Se recomienda que la aplicación se realice en forma preventiva ante situaciones ambientales predisponentes o ante la aparición de primeros síntomas de enfermedad, para evitar que el progreso del patógeno cause daños importantes sobre el rendimiento.
(*) Estimado en base a un caldo de aplicación de 800 a 1000 litros por hectárea. Dichos volúmenes de agua deben ajustarse según tamaño de planta para lograr una buena cobertura.
(**) En caso de ser necesario agregar 0.025 a 0,5 de aceite vegetal que supere el 83% p/v.

Información General:

El producto es un fungicida que posee acción sistémica y de contacto. Actúa inhibiendo el crecimiento de Moho gris o Botrytis (*Botrytis cinerea*) durante las fases de germinación de esporas, elongación del tubo germinativo y crecimiento micelial en el cultivo de vid. En el cultivo de tomate controla Moho gris o Botrytis (*Botrytris cinerea*), Tizón del tomate (*Alternaria spp*), Mancha gris de la hoja (*Stemphyllium sp*) y Cladosporiosis (*Fulvia fulva*).

Combina la acción de un nuevo principio activo pydiflumetofen, del grupo químico de las carboxamidas, con fludioxonil, del grupo químico de los fenilpirroles. La mezcla de ambos principios activos determina una acción combinada, bloqueando el proceso respiratorio y la interferencia del proceso de regulación osmótica de las membranas celulares de los hongos. Estas cualidades, aseguran un amplio espectro de control, reduciendo el riesgo de aparición de cepas resistentes.

El pydiflumetofen es un fungicida de amplio espectro, perteneciente al Grupo 7 – Inhibidores del succinato deshidrogenasa o SDHI (FRAC), el cual inhibe el Complejo II de la respiración donde actúa la SDHI. No posee resistencia cruzada con triazoles o estrobirulinas, por lo cual la mezcla con estos grupos químicos es recomendada para un mejor manejo de resistencia. Pydiflumetofen se adsorbe rápidamente a los tejidos vivos de la planta, quedando retenido mayoritariamente en las capas cerosas, lo que le otorga prolongada residualidad.

El fludioxonil es un fungicida de efecto preventivo, perteneciente al Grupo 12 – Fenipirroles (FRAC), ejerce su acción fungicida a través de la interferencia del proceso de regulación osmótica de las membranas celulares de los hongos, provocando la ruptura de las células.

Preparación:
Es una suspensión concentrada que debe diluirse en agua. Para una correcta preparación, respetar las siguientes instrucciones:
- Verificar el buen funcionamiento del equipo y su correcta calibración antes de iniciar la aplicación.
- Agitar el producto antes de usarlo.
- Agregar agua limpia al tanque de la pulverizadora hasta la mitad de su capacidad y poner el sistema de agitación en funcionamiento.
- Añadir la cantidad necesaria del producto de acuerdo con la calibración realizada, directamente al tanque y sin dilución previa. Con el sistema de agitación en movimiento, verificar que el producto se disperse completamente.
- Continuar agitando mientras se termina de completar el tanque con la cantidad de agua necesaria.
- Usar dentro de las seis horas de haber realizado la mezcla de tanque, ya que la efectividad puede reducirse debido a la degradación del producto. Re-agitar el caldo antes de reanudar la aplicación.

Equipos, Volúmenes y técnicas de aplicación:
Debe aplicarse sobre el cultivo en el volumen necesario para lograr una buena cobertura. Se deben lograr una buena aplicación sobre los racimos y/o hojas del cultivo a proteger. Utilizar la cantidad de agua necesaria, de acuerdo con el estado de desarrollo

del cultivo, a fin de lograr una excelente cobertura del mismo, evitando que se produzca escurrimiento por exceso de agua. Para equipos terrestres en cultivo de vid, no utilizar volúmenes menores a 400 lts/ha ni mayores a 1500 litros/ha. En el cultivo de tomate, utilizar volúmenes entre 800 litros/ha a 1000 litros/ha. Dichos volúmenes de agua deben ajustarse según tamaño de planta para lograr una buena cobertura.

Antes de iniciar cualquier tratamiento, es imprescindible verificar el correcto calibrado del equipo y el buen funcionamiento de picos (filtros y pastillas), reemplazando las partes defectuosas. Mantener el sistema de agitación en movimiento en todo momento. Evitar la superposición de franjas durante la pulverización. Tomar las medidas necesarias, para evitar la deriva del producto hacia cultivos linderos, vegetación no blanca, fuentes hídricas y áreas pobladas. No realizar aplicaciones con altas temperaturas, baja humedad, vientos fuertes, presencia de rocío o ante probabilidades de lluvias inmediatas. Suspender las aplicaciones con vientos superiores a los 10 km/hora.

Restricciones de uso:
Período de carencia: Dejar transcurrir los siguientes días entre la última aplicación y la cosecha: vid: 21 días, tomate:1 día. En caso de que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Importante: No utilizar más de 400 gramos de pydiflumetofen por hectárea por año.
Prevención y manejo de resistencias: Pertenece al grupo 12 y 7 de los fungicidas.
Para prevenir la selección de poblaciones naturalmente resistentes a un fungicida, deben respetarse las recomendaciones de uso (dosis y momento de aplicación) detalladas en el marbete. Debe evitarse el uso de un único grupo de fungicida en la estrategia de manejo de plagas en el lote, mediante la combinación con otros fungicidas de diferente número de grupo en mezcla de tanque o aplicaciones secuenciales.
Para controlar una población resistente a un fungicida, será necesario aplicar otro producto efectivo, de diferente número de grupo. Utilizarlo a la dosis que indique el marbete para esa especie, y adoptar todas las prácticas de manejo que sean necesarias para mantener controlada esa población a lo largo del ciclo del cultivo.

No reingresar al área tratada hasta que el producto se haya secado de la superficie de las hojas.

Advertencia: La experiencia ha demostrado que pueden desarrollarse cepas de hongos resistentes a los fungicidas, lo que podría tener por consecuencia la falta de efectividad y la disminución del rendimiento. Dado que Syngenta Agro S.A. no puede prever el desarrollo de una resistencia, la empresa no asume responsabilidad alguna por cualquier daño o pérdida resultante de la falta de actividad del producto contra estas posibles cepas resistentes.

Compatibilidad:
Puede aplicarse en mezcla de tanque con la mayoría de los agroquímicos de reacción neutra. Antes de utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala, para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos.

Fitotoxicidad:
No ha manifestado síntomas de fitotoxicidad en los cultivos registrados, siguiendo las dosis y recomendaciones que figuran en esta etiqueta.

Derrames:
Cubrir los derrames con material absorbente (tierra o arena). Barrer el producto absorbido y recoger en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa.

Clasificación (modo o sitio de acción): 12 (FRAC) + 7 (FRAC)

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Este producto es nocivo si es ingerido o absorbido por la piel. Evitar todo contacto con la piel, ojos y ropa.
Para su seguridad durante la preparación y aplicación: Utilizar ropa protectora adecuada (mameluco o pantalones y camisa de manga larga), guantes impermeables, protección facial y botas de goma. No comer, beber, ni fumar durante el manipuleo del producto. Evitar el contacto con el pulverizado. No destapar picos ni boquillas con la boca.
Para su seguridad después del tratamiento: Cambiarse y lavar la ropa inmediatamente. Lavarse adecuadamente con abundante agua y jabón. Guardar el sobrante del producto en su envase original, bien cerrado.

Información Toxicológica:

Toxicidad oral aguda: DL 50 (Rata, macho y hembra): > 5.000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda: DL 50 (Rata, macho y hembra): > 2.000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda: CL 50 (Rata, macho y hembra): > 2.6 mg/l

Irritación dermal: No irritante
Irritación ocular: Leve irritante
Sensibilización dermal: No sensibilizante

Es muy tóxico para peces y para organismos acuáticos. Evitar que el producto entre en contacto con ambientes acuáticos. Dejar una zona o franja de seguridad entre el área a tratar y fuentes hídricas superficiales. No contaminar el agua de riego, ni tampoco

receptáculos como lagos, lagunas o diques. No contaminar fuentes de agua cuando se elimine el líquido de limpieza de los equipos de pulverización y asperjar el caldo remanente sobre campo arado o camino de tierra.
Es prácticamente no tóxico para aves. Evitar la presencia de estas en el área de aplicación e impedir que tomen contacto con el producto.
Es no tóxico para abejas. Se deben respetar los cultivos y momentos de aplicación de esta etiqueta en forma estricta. Tomar la precaución de no contaminar las posibles fuentes de agua de abejas.
No contaminar forrajes, estanques ni cursos de agua. Evitar la deriva durante las aplicaciones.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
MIRAVIS PRIME CON TECNOLOGÍA ADEPIDYN	SYNGENTA AGRO	40686	SC	25% + 15%	III

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.