AMICARBAZONE

Marcas comerciales: DINAMIC 70 WDG.

Nomenclatura Química:
4-amino-N-(1,1-dimetiletil)-4,5-dihidro-3-(1-metiletil)-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-1-carboxamida.
Clasificación Química: triazolinona
Acción: de contacto, sistémica

Uso: herbicida

Cultivo	Adveridad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Caña de azúcar (Soca)	Túpulo (Sicyos polyacanthus)	1500- 1750 g/ha	180	En pre-emergencia o post-emergencia temprana de Tupulo (Sicyos polyacanthus) en Caña soca aplicado entre post cosecha y brotación temprana del cultivo (brotes desarrollados menores a 45-60 cm)
	Amor seco *(Bidens pilosa)* Ataco (*Amaranthus hybridus*) Bejuco, Campanilla (*Ipomoea purpurea*) Caminadora, Pica pica (*Rottboellia exaltata*) Chufa (*) (*Cyperus esculentus*) Comelina (*Commelina benghalensis*) Enredadera anual (*Polygonum convolvulus*) Merremia (*Merremia aegyptia y merremia cissoides*) Pie de gallina/grama carraspera (*Eleusine indica*) Quínoa, Quínoa blanca (*Chenopodium album*) Rama negra (*Conyza bonariensis*) Rama negra (*Conyza sumatrensis*)	Suelo liviano a medio (franco arenoso a franco limoso): 1000 – 1500 g/ha Suelo pesado (franco arcilloso a franco limo arcilloso): Hasta 2000 g/ha		En pre-emergencia y/o post-emergencia temprana del cultivo (30 a 60 cm de altura) En pre-emergencia de las malezas y post-emergencia temprana de Rama negra (cotiledones hasta 4 hojas) (**).
Caña de azúcar (Caña planta)	Amor seco (*Bidens spp*.) Campanilla (*Ipomoea spp*.) Cyperus (*) (*Cyperus spp*.) Flor de Santa Lucía (*Commelina spp*.) Polygonum (*Polygonum spp*) Quinoa o Ajara (*Chenopodium spp*) Rama negra (*Conyza spp*.) Sicyos (*) (*Sicyos spp*) Yuyo colorado, Ataco (*Amaranthus spp*.)	Suelos de textura Franco a Franco arenosa (Contenido de arena menor al 50%): 750 g/ha Suelos de textura Franco limosa a Franco limo arcillosa: 1000 g/ha		Pre-emergencia temprana del cultivo de caña planta feno fases 1 y 2 y pre-emergencia de la maleza.
Maíz	Amor seco (*Bidens pilosa*) Briza (*Poa annua*) Chamico (*Datura ferox*) Colas de zorro (*Setaria verticilata*) Comelina (*Commelina benghalensis*) Enredadera anual (*Polygonum convolvulus*) Enredadera (*Ipomoea spp*.)	Suelo liviano (Franco arenoso): 320 a 400 g/ha Suelo de textura media (franco-arenoso a franco-arcillo arenoso): 400 a 500 g/ha arcillo - arenoso a franco: 500 a 600 g/ha Suelo pesado (franco arcilloso a franco limo arcilloso): 500 a 700 g/ha	90	Barbecho químico: previo a la siembra del cultivo de Maíz En pre-emergencia del cultivo aplicado inmediatamente posterior a la siembra En pre-emergencia de las malezas y postemergencia temprana de Coniza (cotiledones hasta 4 hojas) (**)

	Quínoa, Quínoa blanca (*Chenopodium album*) Rama negra (*Conyza bonariensis*) Rama negra (*Conyza sumatrensis*) Verdolaga (*Portulaca oleracea*) Yuyo colorado (*Amaranthus palmeri*) Yuyo colorado (*Amaranthus quitensis*)			
Soja	Rama negra (*Conyza bonariensis*) Rama negra (*Conyza sumatrensis*) Yuyo colorado (*Amaranthus hybridus*) Yuyo colorado (*Amaranthus quitensis*)	Suelo de textura media (franco a franco- limoso): 320 g/ha Suelo pesado (franco arcilloso a franco limo arcilloso): 400 g/ha	120	Barbecho químico intermedio en rotación al cultivo de soja (45 días antes de la siembra) En pre-emergencia de las malezas y post-emergencia temprana de Rama negra (cotiledones hasta 4 hojas) (**).

(*) Solo Supresión (control parcial).
(**) Para aplicaciones sobre malezas emergidas agregue siempre un Coadyuvante siliconado o Aceite vegetal metoxilado o parafínico según recomendaciones del fabricante

Información General:

Es un herbicida perteneciente al grupo químico de las triazolinonas, selectivo en aplicación pre-emergente y postemergente en cultivo de caña de azúcar y solamente pre-emergente en el cultivo de maíz, para el control de malezas de hoja ancha y gramíneas. Cuando es aplicado en pre-emergencia de las malezas, éste es absorbido por el sistema radicular y se transloca vía xilema, por el flujo transpiratorio.

Si es aplicado en post-emergencia, en algunas malezas como Rama negra, ejerce su acción de contacto sobre el follaje de las malezas produciendo clorosis y posterior necrosis del tejido.

Este herbicida perteneciente al grupo químico de las triazolinonas, es un inhibidor del fotosistema II.

INSTRUCCIONES PARA EL USO:

Preparación: Llenar el tanque hasta la mitad de su capacidad con agua, luego adicionar la dosis requerida de Amicarbazone (diluida previamente en un poco de agua) manteniendo siempre los agitadores en marcha y en caso de mezcla con otro herbicida compatible, agregarlo a continuación y finalmente completar el tanque con el volumen de agua total. Utilizar agua de buena calidad durante la aplicación y ajustar el pH entre 5,5 y 6,5. En condiciones de alta temperatura y/o baja humedad relativa se recomienda el uso de coadyuvantes y/o aceites con función adherente, dispersante, penetrante y antievaporante (por ejemplo, Coadyuvante siliconado a razón de 25-50 ml cada 100 litros de agua o Aceite vegetal metoxilado o parafínico al 0,5% o 500 ml cada 100 litros de agua). Si las condiciones de alta temperatura y baja humedad relativa son extremas no es recomendable aplicar.

No lavar el equipo de aplicación en estanques, fuentes, ríos y otros cuerpos de agua. Evite la contaminación del agua superficial.

CULTIVOS ROTACIONALES:

Pueden re-sembrarse maíz y caña de azúcar sin inconvenientes después de una aplicación.

Puede sembrarse soja 90 días después de una aplicación (según la textura del suelo). En suelos muy livianos y con poca materia orgánica no es conveniente resembrar soja hasta 120 días después

MANEJO DE RESISTENCIA: Es recomendable rotar o combinar con herbicidas con un modo de acción diferente pero igualmente efectivo en las malezas objetivo, para reducir la probabilidad de selección de biotipos resistentes.

TIEMPO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: No reingresar al área tratada antes de las 12 horas de una aplicación.

TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACIÓN: Los envases vacíos o con pequeños remanentes deben ser enjuagados tres veces con agua, para extraer todo el producto (TRIPLE LAVADO). Volcar el líquido de lavado en el tanque de la pulverizadora antes de su aplicación. Esparcir el agua de lavado debajo de alambrados o en las banquinas, siempre y cuando se encuentren alejados de viviendas, centros poblados y lugares de tránsito frecuente de personas.

Los envases que queden con producto remanente por una utilización parcial de su contenido deben ser cerrados con la correspondiente tapa y almacenados de acuerdo a las indicaciones que se especifican en ítem “Almacenamiento”.

ALMACENAMIENTO:

Consérvese únicamente en el recipiente de origen, cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, seco y ventilado y lejos de alimentos y/o forrajes. No use o almacene cerca de fuentes de calor o donde exista llama abierta. Evitar fuentes de ignición. Mantenga los envases bien cerrados. No reutilice los envases vacíos.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: El producto puede aplicarse con equipo de pulverización terrestre o aéreo. La distribución del pulverizado debe ser uniforme, debiendo aplicarse con un caudal de 100-150 l/ha por vía terrestre y un mínimo de 25 l/ha por avión.

Presión de la bomba: 40 - 75 lb / pulgada cuadrada, según tamaño y densidad de las malezas, equipado con boquillas de abanico plano 110020 o 110030 y picos espaciados 35 cm entre sí.

Evitar la superposición en la aplicación.

Derrames:
Retirar el producto derramado con material absorbente (aserrín, turba, aglutinante químico, etc.) y colocarlo en contenedores cerrados para su posterior eliminación en una planta autorizada. Evitar que el producto entre en contacto con aguas superficiales o subterráneas.

Clasificación (modo o sitio de acción): C1 (HRAC) o 5 (WSSA)

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Mezclar el producto al aire libre. Evitar su inhalación, el contacto con la piel u ojos y la contaminación de alimentos. Utilizar ropa protectora adecuada, botas de goma, protección facial, antiparras y guantes impermeables. No contaminar fuentes de agua. Finalizado el tratamiento higienizarse correctamente. No comer, beber o fumar durante la preparación de mezcla y aplicación.

Durante la preparación y aplicación del producto usar ropa protectora , delantal , mameluco, ,mangas largas, botas, máscaras protectoras con filtros apropiados, gafas, etc. Evitar contacto directo con el producto. Después de la aplicación higienizarse y lavar la ropa para su posterior uso.

Información Toxicológica:

TOXICIDAD PARA AVES: Ligeramente tóxico.
TOXICIDAD PARA PECES: Prácticamente no tóxico. No contaminar fuentes de agua.
Dejar una zona “buffer” entre la línea de aplicación y el espejo de agua de 10 metros.
TOXICIDAD PARA ABEJAS: Virtualmente no tóxico.

Oral en ratas DL50: > a 2000 mg /kg (Clase III: Ligeramente peligroso)
Cutánea en ratas DL50: > 5000 mg/kg (Clase IV. Producto que normalmente no ofrece peligro)
Inhalatoria aguda en ratas CL50 > a 2,03 mg/L para ambos sexos (Clase III. Cuidado)

No irritante dermal (conejos)
Irritación ocular: producto moderado irritante
Sensibilización cutánea: no sensibilizante dermal (cobayos).

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
DINAMIC 70 WDG	UPL ARGENTINA S.A.	39179	WG	70%	III