EPYRIFENACIL

Marcas comerciales: EMPERA.

Nomenclatura Química:
Epyrifenacil: Etil [(3-{2-cloro-4-fluoro-5-[3-metil-2,6-dioxo-4-(trifluorometil)-3,6-dihidropirimidin-1(2H)-il]fenoxi}piridin-2l)oxi]acetato
Clasificación Química: N-Fenilftalamida
Acción: sistémica y de contacto.

Uso: herbicida (barbecho y pre-siembra)

Cultivo	Adveridad	Dosis	Momento de Aplicación
Barbecho y Pre-Siembra de Soja, Maíz, y Algodón	Bachiaria (*Urochloa panicoides)* Capín (*Echinochloa colona*) Chloris (*Chloris virgata*) Pasto de cuaresma (*Digitaria sanguinalis*) Pata de ganso (*Eleusine indica*) Yuyo colorado (*Amaranthus hybridus*)	600 ml/ha + Glifosato eq. ac. 1080 g/ha (*)	Aplicar en barbecho químico, previo a la siembra (de acuerdo con el intervalo recomendado para cada cultivo)*** y en post emergencia de las malezas.

* Adicionar Aceite vegetal metilado al 0,5 % v/v
** Malezas que controla: Yuyo colorado (Amaranthus hybridus): hasta 10 cm Cloris (Chloris virgata); Pasto cuaresma (Digitaria sanguinalis), Capín (Echinochloa colona); Pata de ganso (Eleusine indica) y Brachiaria (Urochloa panicoides): hasta 3 macollos
*** Entre las aplicaciones y la siembra deben transcurrir: a. Para el cultivo de Soja: 7 días b. Para el cultivo de Maíz: 7 días c. Para el cultivo de Algodón: 7 días

Información General:
Es un herbicida no selectivo de contacto y con acción sistémica vía xilema y floema. Controla malezas de hoja ancha y gramíneas anuales difíciles. Empera está formulado en base al ingrediente activo Epyrifenacil, formulado como un concentrado emulsionable (EC) para aplicaciones en post-emergencia de malezas.
Se absorbe rápidamente por la parte aérea de las plantas mono y dicotiledóneas y se transloca vía xilema y floema. En el interior de la planta actúa inhibiendo la protoporfirinógeno oxidasa (PPO) en el cloroplasto, induciendo la acumulación masiva de porfirinas y aumentando la cantidad de radicales libres, provocando así, la peroxidación lipídica de la membrana y consecuentemente la muerte celular, lo que conduce a la pérdida irreversible de su función y estructura. Debido a estas características y velocidad de acción, es un potente herbicida quemante para malezas en la aplicación previa a la siembra de cultivos de soja, maíz y algodón.
Está recomendado en mezcla con Glifosato para el control de malezas en barbecho químico y hasta días antes de la siembra, en sistemas de siembra directa o labranza cero, en los cultivos extensivos de soja, maíz y algodón. La combinación de con Glifosato genera una sinergia en el quemado de tejidos verdes y su translocación a otros órganos dando como resultado un control contundente en malezas mono y dicotiledóneas de difícil control. Además del complemento en la eficacia, esta combinación de herbicidas también es una herramienta en el manejo anti-resistencia de malezas, por tratarse de herbicidas con distinto modo de acción.

Para áreas con sospecha de gramíneas resistentes al glifosato: Para el manejo y prevención de la resistencia y complementación del control de infestaciones de gramíneas, se recomiendan herbicidas graminicidas (HRAC-1) registrados, de acuerdo con las recomendaciones de dosis y uso descriptas en la etiqueta del producto seleccionado.

Para áreas con sospecha de malezas de hoja ancha resistentes al glifosato: Para el manejo y prevención de la resistencia y como complemento en el control de infestaciones de malezas de hoja ancha, se recomiendan herbicidas auxínicos (HRAC-4), de acuerdo con las recomendaciones de dosis y uso descriptas en la etiqueta del producto seleccionado.

Al momento de la aplicación las malezas no deben exceder los tamaños recomendados, (**) con una cobertura tal que permita el mojado completo de las mismas, además las malezas deben encontrarse en activo crecimiento.

No realizar aplicaciones en las siguientes condiciones:

- Malezas sobrevivientes de algún tratamiento químico/mecánico previo (rustificadas, viejas o rebrotadas).
- Malezas con presencia estructuras de reserva como estolones, rizomas, xilopodios, etc.
- Malezas afectadas por condiciones climáticas como sequías, heladas, etc.
- Malezas cubiertas por tierra o dañadas.

Derrames:
La carga del equipo debe realizarse sobre una plataforma de carga impermeable que contenga los posibles derrames y deriven a un tanque, o sobre una Cama Biológica. En caso de suceder un derrame, no fumar en las inmediaciones. Contener y absorber el derrame con un material inerte (Arena o tierra) y recoger con pala, juntamente con la capa superficial de suelo afectado. Colocar el material impregnado en un recipiente. Disponer de acuerdo con la normativa legal vigente.

Clasificación (modo o sitio de acción): 14 (HRAC)

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Evitar su inhalación, el contacto con la piel y la contaminación de los alimentos. No pulverizar contra el viento. Usar guantes y botas de goma, careta y antiparras, sombrero y ropa adecuada. Idénticas precauciones deberán tomar los banderilleros. No comer, beber o fumar durante su aplicación. Concluida la tarea, lavarse prolijamente con agua abundante las partes del cuerpo expuestas al contacto con el producto. Lave los elementos empleados en la preparación y aplicación del producto.

Información Toxicológica:

Del producto formulado (5,5%):
Toxicidad oral aguda: DL50: > 2000 mg/kg.
Toxicidad dermal aguda: DL50: > 2000 mg/kg.
Toxicidad inhalatoria aguda: CL50: 5 mg/l.

Irritación dermal: Severo irritante
Irritación ocular: Severo irritante
Sensibilización dermal: Sensibilizante dermal

Riesgos ambientales:
Toxicidad para abejas: Virtualmente no tóxico
Toxicidad para aves: Prácticamente no toxico
Toxicidad para peces: Moderadamente tóxico.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
EMPERA	SUMITOMO CHEMICAL ARGENTINA S.A.	41662	EC	5,5%	III

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.